

# POLINOMOK VERSUS VÉGES BLASCHKE-SZORZATOK

Szakdolgozat

PIGLER DONÁT

Matematika BSc

Témavezető:

KÓS GÉZA

adjunktus



# Tartalomjegyzék

Bevezetés	1
1. Függvénytan az egységkörlemezen	2
1.1. A Schur-osztály geometriája	2
1.1.1. Poincaré-metrika	4
2. Polinomok versus véges Blaschke-szorzatok	11
2.1. Egyértelműségi tétel	11
2.2. Fatou-tétel	12
2.3. Karakterizáció a megoldások számával	14
2.4. Approximáció	17
2.5. Kritikus pontok helyzete, Gauss-Lucas-tétel	20
2.6. Karakterizáció a kritikus pontokkal	23
2.6.1. A $d$ topologikus tér	25
2.6.2. A távolság-arány függvény	27
2.7. Faktorizációs tételek	30
2.7.1. Monodrómia-csoport	31
2.7.2. Polinomok faktorizációs tételei	34
2.7.3. Blaschke-szorzatok faktorizációs tételei	35
3. Kitekintés	42
Irodalomjegyzék	44

# Bevezetés

Azt feltételezzük, hogy Joseph Leonard Walsh volt az első matematikus, aki a véges Blaschke-szorzatokra, mint az egységkörlemez polinomjaira tekintett, és 1952-ben meghatározó jelentőségű eredményt publikált egy nevezetes összefüggésről e két terület között ([21]). Ezek után népszerűvé vált ez a perspektíva, és a cikket számos más analógia feltárása követte. A dolgozatom célja ezen párhuzamok közül az általam legmeghatározóbbnak tartottak összegyűjtése, és a véges Blaschke-szorzatokra vonatkozó megfelelőinek bizonyítása.

A dolgozat első fejezetét a párhuzam kiinduló ötletének megalapozására szenteltem, vagyis megmutatom, hogy miért tekinthetünk a véges Blaschke-szorzatokra úgy, mint a hiperbolikus sík "polinomjaira", azaz irányítástartó egybevágósági transzformációk szorzataira. A második fejezet áll a nevezetes párhuzamok véges Blaschke-szorzatokra vonatkozó tételeinek bizonyításából. Az utolsó rövid kitekintés pedig azt támasztja alá, hogy van értelme bizonyos esetekben a két terület problémáit közösen tekinteni, mert amíg némely kérdéseknél a polinomok egyszerűbb algebrája, addig másoknál a véges Blaschke-szorzatok geometriai tulajdonságai visznek előrébb a megoldásban.

Az összehasonlítás kiinduló ötletét, illetve az egyes párhuzamokat javarészt [13] adta, a véges Blaschke-szorzatok elméletéhez pedig [7] nyújtott megfelelő alapot. Ezenkívül az egyes tételek bizonyításában [9], [14], [16], [17], [21] és [22] voltak segítségemre.

Ezúton is szeretnék köszönetet mondani Kós Gézának, hogy az előző félévben tartott komplex függvénytan előadásaival felkeltette a téma iránt az érdeklődésemet, illetve hogy később ezt a témát javasolta nekem feldolgozásra és elvállalta a témavezetést.

# 1. fejezet

## Függvénytan az egységkörlemezen

Ebben a fejezetben felvezetésként a dolgozat törzséhez az egységkörlemez geometriáját és a körlemezen holomorf függvényeket fogjuk megvizsgálni. Egyben arra is választ adunk, hogy miért is tekinthetjük a véges Blaschke-szorzatokat bizonyos értelemben az egységkörlemez polinomjainak, vagyis irányítástartó egybevágósági transzformációik szorzatának.

### 1.1. A Schur-osztály geometriája

A dolgozat során a következő jelölések lesznek érvényben:

$$D = \{z \in \mathbb{C} : |z| < 1\} \quad (1.1.1)$$

$$\bar{D} = \{z \in \mathbb{C} : |z| \leq 1\} \quad (1.1.2)$$

$$T = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\} \quad (1.1.3)$$

1.1.1. de nció. Az

$$f : D \rightarrow \bar{D} \quad (1.1.4)$$

holomorf függvények halmazát Schur-osztálynak nevezzük. Jelölés  $\mathcal{S}$ .

A következő, a komplex függvénytanból is jól ismert tétel a későbbi elmélet kulcsfontosságú állítása lesz, mivel ez a reguláris tananyag része, ezért bizonyítás nélkül közlöm.

1.1.2. tétel (Schwarz-lemma) Ha  $f \in \mathcal{S}$  és  $f(0) = 0$ , akkor

(1)  $|f'(0)| \leq 1$ ;

(2)  $|f(z)| \leq |z|$ ;

(3) Ha fentiek valamelyikében egyenlőség teljesül, akkor  $f(z)$  egy nulla körüli forgatás:  $f(z) = cz$ , valamilyen  $|c| = 1$ -gyel.

A szakdolgozat során számtalanszor fogunk utalni  $D$  konform leképezéseire, ezeket a továbbiakban röviden csak  $D$  automor zmusainak fogjuk hívni, és a

$$\text{Aut}(D) = \{f : D \rightarrow D : f \text{ konform}\} \quad (1.1.5)$$

jelölést használjuk. A körlemez két kiemelt jelentőségű automor zmusához külön jelölést vezetünk be:

$$a = \frac{a-z}{1-\bar{a}z}; \quad a \in D; \quad (1.1.6)$$

amelyet szokás Blaschke-függvénynek mondani, és

$$b_a(z) = \frac{\bar{a} - z}{1 - \bar{a}z}; \quad a \in D; \quad (1.1.7)$$

amely egy nulla körüli forgatásnak felel meg. Könnyű számolással adódik, hogy

$$b_a \circ b_a = \text{id}_D; \quad (1.1.8)$$

illetve

$$b_a^{-1} = b_a; \quad (1.1.9)$$

Tehát  $b_a$  injektív a  $D$  körlemezben, azt, hogy valójában automorfizmus is, a következő észrevétel támasztja alá:

$$|b_a(z)| = \frac{|a - z|}{|1 - \bar{a}z|} = \frac{|a - z|}{|z - \bar{a}|} = 1; \quad z \in D; \quad (1.1.10)$$

Ismét csak kimondva közöljük a komplex függvénytanból jól ismert tételt:

1.1.3. tétel.

$$\text{Aut}(D) = \{f_a(z) = \frac{a - z}{1 - \bar{a}z}; \quad a \in D\}$$

Láttuk, hogy a Schwarz-lemma csak abban az esetben alkalmazható, ha a Schur-függvény helybenhagyja. Ennek a feltételnek az elhagyásával a tétel általánosabban is kimondható, illetve később majd a tételben szereplő algebrai kifejezések geometriai megragadásához is alapot teremtünk.

1.1.4. tétel (Schwarz-Pick). Legyen  $f \in \text{Aut}(D)$  és  $w, z \in D$ , ekkor

$$\frac{|f(z) - f(w)|}{|1 - \overline{f(w)}f(z)|} \leq \frac{|z - w|}{|1 - \bar{w}z|}; \quad (1.1.11)$$

és

$$\frac{|f'(z)|}{1 - |f(z)|^2} \leq \frac{1}{1 - |z|^2}; \quad (1.1.12)$$

Továbbá a következők ekvivalensek:

- (a) Létezik olyan különböző  $w, z \in D$ , amelyre (2:1:20)-ben egyenlőség teljesül.
- (b) Minden különböző  $w, z \in D$ -re (2:1:10)-ben egyenlőség teljesül.
- (c) Létezik olyan  $z \in D$ , amelyre (2:1:11)-ben egyenlőség teljesül.
- (d) Minden  $z \in D$ -re (2:1:11)-ben egyenlőség teljesül.
- (e)  $f \in \text{Aut}(D)$ :

Bizonyítás. Válasszunk egy  $w \in D$  számot. Ha  $|f(w)| = 1$ , akkor a maximum-elv miatt  $f$  konstans, így az egyenlőségek (és egyenlőségek) automatikusan teljesülnek. Ha  $w \in D$ , akkor ismét csak a maximum-elv miatt  $f(D) = D$ . De niáljuk a

$$g(z) = \frac{f(z) - f(w)}{1 - \overline{f(w)}f(z)} \quad (1.1.13)$$

függvényt. Vegyük észre, hogy  $g(0) = 0$ , tehát alkalmazhatjuk a Schwarz-lemmát. A Schwarz-lemma (a) és (b) része pontosan a tételbeli két egyenlőségnek felel meg erre  $g$ -re.

Ha (a)-(d) állítások valamelyike teljesül, akkor a Schwarz-lemma (c) része miatt  $g(z) = cz$  valamilyen  $c \in \mathbb{T}$ -re, vagyis a tétel (e) állítása automatikusan teljesül. Megfordítva, ha  $f \in \text{Aut}(D)$ , akkor  $g \in \text{Aut}(D)$  és  $g(0) = 0$ , vagyis  $g$  forgatás a Schwarz-lemma (c) része miatt, erre teljesülnek az (2:1:10) és (2:1:11) egyenlőségek.  $\square$

### 1.1.1. Poincaré-metrika

A hagyományos felépítéstől eltérően én a metrika felől fogom a kétdimenziós hiperbolikus geometriát megközelíteni. Ennek a furcsa "rákszerű" felvezetésnek az oka az, hogy így egyszerűbben megragadható lesz az egységkörlemez automorfizmusainak és végül a véges Blaschke-szorzatoknak, mint geometriai transzformációknak a szerepe. Ehhez először de niáljunk egy segédmetrikát.

1.1.5. de nícíó. Jelölje  $\rho$  a pszeudohiperbolikus-metrikát amelyet a következőképpen de niálunk:

$$\rho(z; w) = \frac{z - \bar{w}}{1 - \bar{z}w}; \quad \text{ahol } z, w \in D; \quad (1.1.14)$$

Ha feltételezzük hogy ez valóban metrika, látjuk, hogy mivel  $|1 - \bar{z}w| > 2$ , a hagyományos euklideszi metrikához képest

$$\frac{1}{2}d(z; w) \leq \rho(z; w); \quad (1.1.15)$$

Továbbá  $D$  bármely  $K$  kompakt halmazán az ekvivalencia is teljesül, hiszejj  $|1 - \bar{z}w|$ -re létezik alsó korlát, vagyis

$$\rho(z; w) \leq C_K d(z; w); \quad (1.1.16)$$

valamilyen  $K$ -tól függő  $C_K$  konstanssal. Ahogy az lenni szokott, a metrikusság igazolásához csak a háromszög egyenlőtlenség nem nyilvánvaló. Ennek belátását nem sokkal, de elhalasztjuk, addig tegyük fel, hogy  $\rho$  valóban metrikát határoz meg. A Schwarz-Pick-tétel ezzel a jelöléssel máris egy kicsit más értelmet nyer:

$$\rho(f(z); f(w)) \leq \rho(z; w); \quad f \in \text{Aut}(D); \quad z, w \in D; \quad (1.1.17)$$

és egyenlőség csak akkor áll fenn, ha  $f \in \text{Aut}(D)$ .

1.1.6. de nícíó. Egy racionális törtfüggvényt Möbius-transzformációnak nevezünk, ha a következő alakot ölti:

$$\frac{az + b}{cz + d}; \quad \text{ahol } a, b, c, d \in \mathbb{C} \text{ és } ad - bc \neq 0; \quad (1.1.18)$$

Ezek a függvények bijekciók  $\text{Aut}(D) = \text{PSL}(2; \mathbb{C})$  Riemann-gömbön. A függvény szempontjából az  $a, b, c, d$  számok egy konstanssal való szorzása érdektelen, így feltehetjük, hogy  $ad - bc = 1$ , ekkor könnyen látható, hogy Möbius-transzformációk csoportja izomorf a  $\text{PSL}(2; \mathbb{C})$ -vel. Közismert, hogy a Möbius-transzformációk a köregyeneseket (köröket vagy egyeneseket) köregyenesekbe képezik, és szögtartók. Másrészt azt is látjuk, hogy az  $\rho$  függvény egy Möbius-transzformáció, tehát az  $r$  sugarú  $0$  középpontú körlemez  $\rho$  szerinti képe vagy szintén egy (euklideszi) körlemez vagy egy félsík. Azonban tudjuk, hogy  $\rho \in \text{Aut}(D)$ , ezért a  $B(0; r)$  ( $r \in (0; 1)$ )  $0$  középpontú  $r$  sugarú körlemez képe szintén  $D$ -beli körlemez lesz. Legyen

$$B_\rho(z_0; r) = \{z \in D : \rho(z_0; z) < r\}; \quad r \in (0; 1) \quad (1.1.19)$$

a  $\rho$  metrika szerint  $r$  sugarú  $z_0$  középpontú körlemez. Az előző észrevételeink és az  $\rho^2 = \rho$  összefüggés alapján tehát  $B_\rho(z_0; r) = \rho^{-1}(B(0; r))$  szintén egy  $D$ -beli körlemez. No, de melyik pontosan?

Írjuk fel kicsit másként  $B_\rho(z_0; r)$ -t, polár koordinátákkal.

$$B_\rho(z_0; r) = \left\{ \frac{z_0 + se^{i\theta}}{1 + \bar{z}_0 se^{i\theta}} : s \in [0; r]; \theta \in [0; 2\pi) \right\} \quad (1.1.20)$$

Így

$$\mathbb{B}_d(z_0; r) = \frac{z_0 - re^i}{1 - \bar{z}_0 re^i} : \quad 2 [0; 2] \quad (1.1.21)$$

képezi a határoló körvonalat. Másrészt használjuk fel, hogy

$$\frac{z_0 - re^i}{1 - \bar{z}_0 re^i} - \frac{1 - r^2}{1 - r^2 |z_0|^2} z_0 = \frac{(re^i - r^2 z_0)(|z_0|^2 - 1)}{(1 - \bar{z}_0 re^i)(1 - r^2 |z_0|^2)} = \frac{1 - |z_0|^2}{1 - r^2 |z_0|^2} r \quad (1.1.22)$$

Ebből következik, hogy  $\mathbb{B}_d(z_0; r)$  pszeudohiperbolikus körlemez egy olyan euklideszi körlemez, amelynek a középpontja

$$o = \frac{1 - r^2}{1 - r^2 |z_0|^2} z_0; \quad (1.1.23)$$

és a sugara

$$R = \frac{1 - |z_0|^2}{1 - r^2 |z_0|^2} r \quad (1.1.24)$$

Ahogy a 1.1.23 képlete is mutatja, a  $[0; z_0]$  szakaszra esik, tehát a legnagyobb abszolút értékű pont a  $\mathbb{B}_d(z_0; r)$  körlemez határán a

$$z_{\max} = o + R \frac{z_0}{|z_0|} = \frac{|z_0| + r}{1 + r |z_0|} \frac{z_0}{|z_0|}; \quad (1.1.25)$$

a legkisebb abszolút értékű pedig

$$z_{\min} = o - R \frac{z_0}{|z_0|} = \frac{|z_0| - r}{1 - r |z_0|} \frac{z_0}{|z_0|}; \quad (1.1.26)$$

Mindebből következik, hogy

$$\frac{|z_0| - r}{1 - r |z_0|} \leq |z| \leq \frac{|z_0| + r}{1 + r |z_0|}; \quad \text{ha } z \in \mathbb{B}_d(z_0; r); \quad (1.1.27)$$

1.1.7. lemma. Ha  $z; w \in D$ , akkor

$$\frac{z - w}{1 - \bar{z}w} \in \mathbb{B}_d(z; |w|); \quad (1.1.28)$$

és

$$\frac{|z| - |w|}{1 - |z||w|} \leq \frac{|z - w|}{|1 - \bar{z}w|} \leq \frac{|z| + |w|}{1 + |z||w|}. \quad (1.1.29)$$

Bizonyítás.

$$\rho(z; z(w)) \stackrel{\text{Schwarz-Pick}}{=} \rho_z(z; w) = \rho(0; w) = |w|; \quad (1.1.30)$$

ezért igaz, hogy  $z(w) \in \mathbb{B}_d(z; |w|)$ , illetve az elz (1.1.27) megállapításból  $|z| = z$  és  $r = |w|$  behelyettesítésével következik az állítás.  $\square$

1.1.8. állítás. Ha  $a; b; c \in D$ , akkor

$$\frac{\rho(a; c) \rho(b; c)}{1 - \rho(a; c)\rho(b; c)} \leq \rho(a; b) \leq \frac{\rho(a; c) + \rho(b; c)}{1 + \rho(a; c)\rho(b; c)}. \quad (1.1.31)$$

Bizonyítás. Csak az alsó becslést bizonyítjuk, a felső ugyanúgy megy. A Schwarz-Pick-tétel miatt az alsó egyenlőség ekvivalens a

$$\frac{\rho_z(a); z(c)}{1 - \rho_z(a); z(c)} \leq \frac{\rho_z(b); z(c)}{\rho_z(b); z(c)} \leq \rho_z(a); z(b) \quad (1.1.32)$$

egyenlőséggel. Legyen most  $c = z$ , ekkor

$$\frac{|c(a)| - |c(b)|}{1 - |c(a)||c(b)|} \leq \rho_c(a); c(b); \quad (1.1.33)$$

ennek teljesülését azonban éppen az elz lemmában láttuk be.  $\square$

A tétel triviális következménye, hogy valóban metrika, hiszen teljesül, hogy

$$\rho(a; b) = \rho(a; c) + \rho(b; c); \quad a, b, c \in D: \quad (1.1.34)$$

Tehát  $(D; \rho)$  metrikus tér. A következő állítással azt fogjuk belátni, hogy ez a metrikus tér szemben a hagyományos euklideszi metrikával ellátott  $D$ -vel teljes is.

1.1.9. tétel.  $(D; \rho)$  teljes.

Bizonyítás. Ha  $(z_n) \subset D$  egy Cauchy-sorozat  $\rho$  szerint), akkor elég nagy  $n$ -re benne van egy pseudohi-berbolikus körlemezben. Azonban ez egyben egy euklideszi körlemez is, tehát  $(z_n)$  része  $D$  egy  $K$  kompakt részhalmazának, vagyis (1.1.16) miatt  $(z_n)$  Cauchy az euklideszi metrika szerint is  $K$ -n.  $K$  teljes az euklideszi metrika szerint, tehát  $(z_n)$ -nek létezik határértéke az euklideszi metrika szerint. Ez a határérték azonban a metrikák ekvivalenciája miatt immár  $\rho$  szerint is határértéke lesz  $(z_n)$ -nek.  $\square$

1.1.10. de nció. A

$$\rho(z; w) = \log \frac{1 + \rho(z; w)}{1 - \rho(z; w)}; \quad z, w \in D \quad (1.1.35)$$

függvényt Poincaré-metrikának hívjuk.

Ez valóban metrika. Ismét csak a háromszög egyenlőtlenség nem nyilvánvaló, azonban az előkészületek után ez is könnyen adódik. Írjuk át a 1.1.8 állítás

$$\rho(a; b) = \frac{\rho(a; c) + \rho(b; c)}{1 - \rho(a; c)\rho(b; c)} \quad (1.1.36)$$

egyenlőtlenségét a következő alakra

$$\frac{1 + \rho(a; b)}{1 - \rho(a; b)} = \frac{1 + \rho(a; c)}{1 - \rho(a; c)} \frac{1 + \rho(b; c)}{1 - \rho(b; c)} \quad (1.1.37)$$

Logaritmálva:

$$\log \frac{1 + \rho(a; b)}{1 - \rho(a; b)} = \log \frac{1 + \rho(a; c)}{1 - \rho(a; c)} + \log \frac{1 + \rho(b; c)}{1 - \rho(b; c)} \quad (1.1.38)$$

Tehát  $\rho$ -re teljesül a háromszög-egyenlőtlenség.

$(D; \rho)$  tehát metrikus tér, továbbá mivel a

$$p(t) = \log \frac{1+t}{1-t}; \quad t \in [0; 1); \quad (1.1.39)$$

függvény szigorúan monoton növekvő, illetve  $\lim_{t \rightarrow 0^+} p(t) = 0$ , ezért a  $(D; \rho)$  és  $(D; p)$ -beli Cauchy-sorozatok és konvergens sorozatok megegyeznek. Az  $(D; p)$  is teljes metrikus tér.

A (2.1.17) után a Schwarz-Pick-tételt újra felírhatjuk, most már a Poincaré-metrika felől értelmezve:

1.1.11. tétel (Schwarz-Pick). Ha  $f \in S$ ,  $z, w \in D$ , akkor

$$\rho(f(z); f(w)) \leq \rho(z; w); \quad (1.1.40)$$

és egyenlőség csak abban az esetben áll fenn, ha  $f \in \text{Aut}(D)$ .

Vagyis a Poincaré-metrika szerint a Schur-osztálybeli függvények mind kontrakciók, ráadásul az izometriák pontosan az automorfizmusok. Erre a megállapításra még visszatérünk a következő fejezet elején.



1.1.12. de nicio. Legyen  $D$  egy szakaszonként folytonosan differenciálható egyszerű görbe. Ekkor hiperbolikus hossza

$$l(\gamma) = \int \frac{2|dz|}{1 - |z|^2} \quad (1.1.41)$$

Innentől mindig egy szakaszonként  $C^1$  egyszerű görbét jelöl.

Szokás a differenciálgeometriában a vonalintegrálban szereplő  $\frac{2}{1-|z|^2}$ -hez hasonló pozitív, nem eltérő, kétszer folytonosan differenciálható függvényeket szintémetrikának hívni, hiszen a

$$l(\gamma) = \int (z) |dz| \quad (1.1.42)$$

hossz értelmezésén keresztül egy metrikát származtatnak. Az euklideszi metrikát például a 1 metrika származtatja, hiszen az euklideszi távolság két pont között az összekötő görbék közül a legrövidebb úttal bíró görbe hossza e két pont között, amely görbe az egyenes, így a távolság  $|z_1 - z_2|$ . A hiperbolikus esetben ez tehát a  $(z) = \frac{2}{1-|z|^2}$ . Azt várjuk, hogy ez a Poincaré-metrikát fogja származtatni, és ez valóban így is van. Ehhez előbb belátunk két segédállítást.

1.1.13. állítás. Ha  $D$  és  $f: D \rightarrow D$ , akkor

$$l(f(\gamma)) = l(\gamma); \quad (1.1.43)$$

azaz a hiperbolikus hossz invariáns a konform leképezésekre nézvést.

Bizonyítás. Mivel a hiperbolikus hossz de nicioja láthatóan invariáns a forgatásokra nézve, ezért elegendő, ha egy tetszőleges  $D$ -re belátjuk, hogy  $l(f(\gamma)) = l(\gamma)$ . A Schwarz-Pick (1.1.4) tételből következik, hogy

$$|f'(w)| \leq \frac{1 - |f(w)|^2}{1 - |w|^2}; \quad z \in D; \quad (1.1.44)$$

Ezért

$$l(f(\gamma)) = \int_{\gamma \circ f^{-1}} \frac{2|dz|}{1 - |z|^2} = \int_{\gamma} \frac{2|f'(w)| |dw|}{1 - |f(w)|^2} \leq \int_{\gamma} \frac{2|dw|}{1 - |w|^2} = l(\gamma); \quad (1.1.45)$$

□

1.1.14. lemma.  $[0; r]$  a legrövidebb hiperbolikus útvonal  $0$  és  $r$  között ( $r \in (0; 1)$ ). Továbbá

$$l([0; r]) = \log \frac{1+r}{1-r} = 2 \operatorname{arctanh} r; \quad (1.1.46)$$

Bizonyítás. Először lássuk be ez utóbbit:

$$l([0; r]) = \int_0^r \frac{2}{1-t^2} dt = \int_0^r \frac{1}{1-t} dt + \int_0^r \frac{1}{1+t} dt = \log(1-r) + \log(1+r) = \log \frac{1+r}{1-r}; \quad (1.1.47)$$

Ha most egy tetszőleges  $\gamma$ -t  $r$ -rel összekötő szakaszonként  $C^1$  egyszerű görbe, akkor homotóp  $[0; r]$  szakasszal, tehát a Cauchy alaptétel miatt

$$l(\gamma) = \int_{[0; r]} \frac{2}{1-z^2} dz = \int_{[0; r]} \frac{2}{1-z^2} dz = \int_{[0; r]} \frac{2}{1-|z|^2} |dz| = l([0; r]); \quad (1.1.48)$$

□

Most már általánosan is kimondható, hogy a  $(z) = \frac{2}{1-|z|^2}$  metrika a Poincaré-metrikát származtatja.

1.1.15. tétel. Két  $a, b \in D$  különböző pontot összekötő görbék közül a legrövidebb úttal bíró a következőképpen parameterezhető:

$$\frac{a - a(b)t}{1 - \bar{a} a(b)t}; \quad t \in [0; 1]; \quad (1.1.49)$$

Másrészt  $a$  és  $b$  hiperbolikus távolsága  $(a; b)$ .

Bizonyítás. Ha  $a$  és  $b$  különböző pontok  $D$ -ben, akkor

$$f(z) = \frac{j_a(b)j_a(z)}{a(b)} \quad (1.1.50)$$

könnyen láthatóan az egységkörlemez egy automorfizmusa, továbbá  $f(a) = 0$  és  $f(b) = j_a(b)$ . Most használjuk fel az előző két állítást, így azt kapjuk, hogy  $a$ -t és  $b$ -t összekötő görbék között a legrövidebb úttal rendelkező az  $f^{-1}([0; j_a(b)])$ -vel megadott. Így tehát a görbe parameterezése:

$$f^{-1}(t j_a(b)) = a + \frac{j_a(b)j_a(z)}{a(b)} = a(t a(b)) = \frac{a - a(b)t}{1 - \bar{a} a(b)t}; \quad t \in [0; 1]; \quad (1.1.51)$$

$f \in \text{Aut}(D)$ , ezért a Schwarz-Pick-tétel és a 1.1.13 állítás miatt

$$d([0; j_a(b)]) = d(f^{-1}(0); f^{-1}(j_a(b))) = (a; b); \quad (1.1.52)$$

□

Mostantól a Poincaré-metrikát származtató  $(z) = \frac{2}{1 - |z|^2}$  síkfüggvény és a Poincaré-metrika között elnevezésben nem fogunk különbséget tenni, a kontextusból azonban világosan kivehető lesz, hogy mire gondolunk.

Ezek után már megadhatjuk a tételben szereplő parametrizáció segítségével két különböző pontot összekötő hiperbolikus szakaszt a rajtuk keresztülmenő hiperbolikus egyenes fogalmát.

1.1.16. definíció.  $a, b \in D$  különböző pontok, a

$$h(t) = \frac{a - \frac{a-b}{\bar{a}b}t}{1 - \bar{a} \frac{a-b}{\bar{a}b}t} \quad (1.1.53)$$

parametrizációval megadott görbét  $t \in [0; 1]$  esetén  $a$  és  $b$ -t összekötő hiperbolikus szakaszt  $t < \frac{1}{\bar{a}b}$  esetén pedig  $a$ -n és  $b$ -n átmenő hiperbolikus egyenes parameterezi.

A hiperbolikus egyenesre tett megszorítás azt garantálja, hogy  $h(t) \in D$ .

Mik lesznek tehát a hiperbolikus egyenesek?  $a$  és  $b$  közötti hiperbolikus szakasz  $[a; j_a(b)]$  euklideszi szakasz  $a$  szerinti képeinek felel meg.  $[0; j_a(b)]$  szakaszon fekvő euklideszi egyenes merőlegesen metszi az egységkörvonalat, így  $a \in \text{Aut}(D)$  szögértéke és azon tulajdonsága miatt, hogy a köregyeneseket köregyenesekbe képezi (hiszen, Möbius-transzformáció),  $a$ -n és  $b$ -n átmenő hiperbolikus egyenes egy az egységkörvonalat metsző kör vagy egyenes lesz (1.1.13 állítás). Vagyis a Poincaré-metrika elvezetett minket a várt kétdimenziós hiperbolikus geometriai modellhez, a Poincaré-féle körmodellhez, amely modell pontjai az egységkörlemez pontjai, az egyenesek pedig az egységkörvonalra merőleges egyenesek, illetve körvonalak egységkörlemezrel való metszetei.

A Poincaré-metrikával ellátott egységkörlemeznek még egy a későbbiekben (ld. 3.6.2. fejezet) fontos tulajdonságát szeretnénk belátni, mielőtt rátérünk a dolgozat fő témájára. Ehhez érdemes a di erenciál-geometria egy-két fogalmát tisztázni.

1.1.17. de n ci . Ha  $f : D_1 \rightarrow D_2$  holomorf f ggv ny ( $D_1, D_2 \subset \mathbb{C}$ )  s egy metrika  $D_2$ -n, akkor a metrika  $f$  szerinti pullbackj nek mondjuk a

$$(f^*g)(z) = g(f(z))f'(z); \quad z \in D_1 \quad (1.1.54)$$

f ggv nyt.

Vil gos, hogy, ha  $D_1$  szakaszonk nt  $\mathbb{C}^1$ , akkor helyettesit ses integr l ssal ad dik, hogy

$$f^*g = g \circ f : \quad (1.1.55)$$

 rdekess  akkor v lik a pullback vizsgálata, amikor  $D_1 = D_2$ , vagyis  ssze tudjuk hasonlítani bizonyos  rtelemben a metrik t a pullbackj vel. Jel lj k  $d(z; w)$ -vel a  $z$ -t  $w$ -vel  sszek t  g rb k k z l a legr videbb szerinti t vols ggal rendelkező hossz t e pontok k z tt. Ekkor, ha  $f : D \rightarrow D$  holomorf f ggv ny  s olyan metrika  $D$ -n, amelyre teljes l, hogy

$$(f^*g)(z) = g(z); \quad z \in D; \quad (1.1.56)$$

akkor az el bbi meg llapításaink alapján

$$f^*g = g; \quad (1.1.57)$$

vagyis speci lisan

$$d(f(z); f(w)) = d(z; w); \quad z, w \in D; \quad (1.1.58)$$

Teh t  $f$  egy kontrakció a  $f^*g$  által sz rmaztatott  $d$  metrika szerint.

Visszat rve a  $g(z) = \frac{2}{1-|z|^2}$  Poincar -metrik hoz  s a  $D$  tartom nyra, imm r az  j fogalmakkal a Schwarz-Pick-t tel  gy is megadhat :

$$(f^*g)(z) = g(z); \quad z \in D; \quad (1.1.59)$$

amelyb l ezen meggondol sokb l direkte k vetkezik a 1.1.11 t tel.

1.1.18. de n ci . Egy metrika g rb let nek nevezz k  s  $\Delta$ -vel jel lj k a k vetkező f ggv nyt:

$$\Delta(z) = \frac{\log |z|}{2(z)}; \quad (1.1.60)$$

ahol  $\Delta = \frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial y}$  a Laplace-oper tor.

Vezess k be a k vetkező jel l st, amelyet a szakirodalomban Wirtinger deriv ltaknak h v:

$$\frac{\partial}{\partial z} = \frac{1}{2} \left( \frac{\partial}{\partial x} - i \frac{\partial}{\partial y} \right);$$

$$\frac{\partial}{\partial \bar{z}} = \frac{1}{2} \left( \frac{\partial}{\partial x} + i \frac{\partial}{\partial y} \right);$$

Ekkor a Laplace oper tor fel rhat  a k vetkező alakban

$$\Delta = 4 \frac{\partial}{\partial z \partial \bar{z}}; \quad (1.1.61)$$

A k vetkező meg llapításunk szint n a  $(D; \Delta)$  t r di erenci lgeometriai tulajdons g r l  r lkodik.

1.1.19. állítás. A Poincaré-metrika görbülete a konstans 1.

Bizonyítás.

$$\log (z) = 4 \frac{\partial \bar{\partial}}{\partial z \bar{\partial}} \log \frac{2}{1 + |z|^2} = \frac{\partial \bar{\partial}}{\partial z \bar{\partial}} \log \frac{2}{1 + z\bar{z}} = 4 \frac{\partial \bar{\partial}}{\partial z \bar{\partial}} \frac{z}{z\bar{z}} = \frac{4}{(1 + z\bar{z})^2} = 2(z) \quad (1.1.62)$$

Vagyis valóban

$$= \frac{\log (z)}{2(z)} = 1: \quad (1.1.63)$$

□

Ez egy későbbi bizonyítás kapcsán még el fog kerülni.

## 2. fejezet

# Polinomok versus véges Blaschke-szorzatok

Az előző fejezetben láttuk, hogy a Poincaré-féle körlemez irányítástartó izometriái pontosan a körlemez automorfizmusai, vagyis a  $z \mapsto \frac{z - a}{1 - \bar{a}z}$  alakú függvények, valamilyen  $a \in \mathbb{D}$  és  $a \neq 1$ -re.

2.0.1. Definíció. A

$$B(z) = \prod_{i=1}^n \frac{z - b_i}{1 - \bar{b}_i z}; \quad b_i \in \mathbb{D}; \quad n \in \mathbb{N}; \quad (2.0.1)$$

függvényeket véges Blaschke-szorzatoknak nevezzük.

Az előző megállapítás szerint tehát a véges Blaschke-szorzatok a Poincaré-körmodell irányítástartó egybevágósági transzformációinak szorzatai, csakúgy mint a komplex síkon a polinomok. Tehát a transzformációk felől nézve bátran mondhatjuk, hogy a körmodell "polinomjai" a véges Blaschke-szorzatok. Nemcsak innen nézve mondhatjuk. Ebben a fejezetben azt fogom belátni, hogy a komplex síkon értelmezett polinomok és az egységkörlemezen értelmezett véges Blaschke-szorzatok között számos analógia vonható. A fejezet célja tehát, hogy egyfajta szótárt biztosítson az olvasónak a polinomok és a véges Blaschke-szorzatok között és lehetőséget teremtsen a két terület közötti kooperációra. Ezek az összefüggések természetesen nem véletlenül adódnak. Az előbb említett geometriai szemléleten túl, a háttérben meghúzódik a Riemann-felületeken értelmezett nem konstans perfekt (vagyis amelyeknél a kompakt halmazok képe kompakt) holomorf leképezések elmélete is (az elmélet részletes tárgyalásához ld. [5])

Előrebocsátom, hogy mivel a dolgozat elsősorban a véges Blaschke-szorzatok elméletét veszi górcső alá, ezért a polinomokról szóló tételek csupán kimondva szerepelnek majd e fejezetben.

## 2.1. Egyértelműségi tétel

Az egyik legkézenfekvőbb kérdés az egyértelműsége vonatkozhat. Mit mondhatunk, hány pont határoz meg egy véges Blaschke-szorzatot? Rögtön adódik a polinomokra vonatkozó analízisből jól ismert tény:

2.1.1. állítás.  $n$  különböző pontban megadott érték egyértelműen meghatároz egy legfeljebb  $n$ -fokú normált polinomot.

Ezek után nem meglepő a következő tétel sem:

2.1.2. tétel ([9]). Legyen  $A(z) = \prod_{i=1}^n \frac{z - a_i}{1 - \bar{a}_i z}$  és  $B(z) = \prod_{i=1}^n \frac{z - b_i}{1 - \bar{b}_i z}$ ,  $a_i, b_i \in \mathbb{D}$ . Ekkor, ha  $A(z_k) = B(z_k)$ , hogy  $i \in J$ , ha  $i \in J$  és  $k = (1; 2; \dots; n)$ , akkor  $A(z) = B(z)$ .

A tétel bizonyításához szükség lesz egy lemmára:

2.1.3. lemma.  $A(z) = \prod_{i=1}^n \frac{z - a_i}{1 - \bar{a}_i z}$  és  $B(z) = \prod_{i=1}^n \frac{z - b_i}{1 - \bar{b}_i z}$ ,  $a_i, b_i \in D$ . Ekkor létezik olyan  $\theta \in \mathbb{T}$ , hogy  $A(\theta z) = B(z)$ .

Bizonyítás. Az állítás egy ekvivalens megfogalmazása, hogy van olyan  $\theta \in \mathbb{T}$ , hogy

$$\prod_{i=1}^n \frac{a_i - \theta z}{1 - \bar{a}_i \theta z} = \prod_{i=1}^n \frac{b_i - z}{1 - \bar{b}_i z} = 1 \quad (2.1.1)$$

Mivel azonban  $\frac{1 - \bar{a}_i}{1 - \bar{b}_i} = \frac{1 - \bar{a}_i}{1 - \bar{b}_i}$ , ezért elég találni olyan egységnyi komplex számot, hogy

$$\prod_{i=1}^n \frac{1 - \bar{a}_i}{1 - \bar{b}_i} = \prod_{i=1}^n \frac{1 - \bar{a}_i}{1 - \bar{b}_i} = 1 \quad (2.1.2)$$

teljesül.

$f(z) = \prod_{i=1}^n \frac{1 - \bar{a}_i z}{1 - \bar{b}_i z}$  holomorf az egységkörnél kicsivel nagyobb körön belül, hiszen a pólusok  $\frac{1}{\bar{b}_i}$  mind az egységkörlemezen kívül helyezkednek el, továbbá  $f(0) = 1$ . Ekkor, ha létezik olyan  $\theta \in \mathbb{T}$ , hogy  $f(\theta z) = 1$ , akkor készen vagyunk, tehát feltehetjük, hogy nincs ilyen  $\theta$ . Ekkor az argumentumelv miatt az egységkör képe legalább egyszer megkerüli az 1-et, ez azonban azt jelenti, hogy  $f(\mathbb{T})$  metszi valahol a valós tengelyt, azaz (2.1.2) valóban teljesül.  $\square$

Bizonyítás (2.1.2 tétel). Legyen  $R(z) = \frac{A(z)}{B(z)}$  legfeljebb  $2n + 2$ -edfokú meromorf racionális törtfüggvény a következők szerint:

$$R(z) = \frac{A(z)}{B(z)}; \quad z \in \mathbb{C} \quad (2.1.3)$$

Ekkor  $|R(\theta)| = 1$ ;  $\theta \in \mathbb{T}$ . Továbbá igaz bármely véges Blaschke-szorzatra, hogy

$$B(z) = 1 - \overline{B(1-\bar{z})}; \quad (2.1.4)$$

hiszen  $1 - \bar{z} = \overline{1 - z}$ , tehát a körvonal minden pontjára igaz, de ekkor az unicitástétel miatt  $\mathbb{C}$ -n is. Vagyis  $R(z)\overline{R(1-\bar{z})} = 1$ . Ha most ezt egybevetjük a tételben szereplő feltételekkel, kapjuk, hogy:

$$R(\theta_k) = \overline{R(1-\bar{\theta}_k)} = 1 \quad k = 1; \dots; n \quad (2.1.5)$$

A lemma (2.1.3) miatt ráadásként van egy olyan  $\theta \in \mathbb{T}$ , amire szintén  $R(\theta) = 1$ . A legfeljebb  $2n$ -edfokú normált racionális törtfüggvény értéke tehát  $2n + 1$  különböző pontban 1, azaz  $R \equiv 1$ .  $\square$

2.1.4 megjegyzés. Természetesen a 2.1.3 lemma egy általánosabb megfogalmazásával a tétel is általánosítható immár nem csak normált véges Blaschke-szorzatokra. Ekkor azonban a véges Blaschke-szorzat meghatározásához máris  $2n + 1$  különböző pontban felvett értékre lesz szükségünk, csakúgy, mint a nem normált polinomok esetében.

## 2.2. Fatou-tétel

Egy másik nevezetes tétel az egészfüggvényekre vonatozik:

2.2.1. tétel. Ha  $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$  egészfüggvény és  $\lim_{|z| \rightarrow \infty} f(z) = 1$  (vagyis  $f$ -nek a  $\infty$ -ben pólusa van), akkor  $f$  egy komplex polinom.

Mivel  $\bar{a} = 1$ , ha  $a \in \mathbb{T}$ , ezért  $\frac{1}{1-\bar{a}} = \frac{1}{1-a} = 1$ , vagyis a véges Blaschke-szorzatok az egységkört önmagába képezik. Ez a meggyelés igaz valamiféleképpen megfordítva is:

2.2.2. tétel (Fatou). Ha  $f$  holomorf  $D$ -n és

$$\lim_{|z| \rightarrow 1} |f(z)| = 1;$$

akkor  $f$  egy véges Blaschke-szorzat.

Bizonyítás. Ha  $\lim_{|z| \rightarrow 1} |f(z)| = 1$ , akkor az unicitástétel miatt létezik olyan  $0 < r < 1$ , hogy az  $f$  véges sok (unicitástétel!) zérushelye az  $z : |z| < r$  körlemez belsejében helyezkedik el. Legyenek a zérushelyei rendre  $a_i$ -k ( $i = 1, \dots, n$ ) és  $B(z) = \prod_{i=1}^n \frac{z - a_i}{1 - \bar{a}_i z}$ , ekkor

$$\lim_{|z| \rightarrow 1} \frac{|B(z)|}{|f(z)|} = \lim_{|z| \rightarrow 1} \frac{|f(z)|}{|B(z)|} = 1 \quad (2.2.1)$$

A maximum-elv miatt tehát  $\frac{|B(z)|}{|f(z)|} \leq 1$  és  $\frac{|f(z)|}{|B(z)|} \leq 1$ , azaz  $\frac{|f(z)|}{|B(z)|} = 1$ . Ez azt jelenti, hogy  $f(z) = \prod_{i=1}^n \frac{z - a_i}{1 - \bar{a}_i z}$  valamilyen  $\varphi \in \mathbb{T}$ -re és ezt kellett bizonyítanunk.  $\square$

A továbbiakban a Fatou-tétel egy-két egyszerű következményét gondoljuk meg, ehhez de niáljuk az egységkörlemez algebra egyszerűbb tárgyalás végett.

2.2.3. de nció. Azt mondjuk, hogy  $f : D \rightarrow \mathbb{C}$  függvény az egységkörlemez algebra  $(D)$  eleme, ha holomorf  $D$ -n és folytonosan kiterjed  $\bar{D}$ -re.

Ez a halmaz könnyen ellenőrizhetően valóban algebra  $\mathbb{C}$  felett a pontonkénti összeadásra és szorzásra nézve (sőt a szupremum-normára nézve normált algebra is), tehát indokolt a megnevezés.

2.2.4. következmény. Ha  $f \in A(D)$  és  $f \in \mathbb{T}$ , akkor  $f$  egy véges Blaschke-szorzat.

Bizonyítás.  $f$  folytonos a  $\bar{D}$  kompakt halmazon és  $f \in \mathbb{T}$ , ezért  $|f(z)| = 1$  egyenletesen, amint  $|z| \rightarrow 1$ . Ekkor az előző 2.2.2 tétel miatt valóban véges Blaschke-szorzat.  $\square$

Ezt általánosabban is megfogalmazhatjuk immár meromorf függvényekre:

2.2.5. következmény. Legyen  $f$  meromorf függvény  $D$ -n, úgy, hogy folytonosan kiterjed  $D$  határára, ekkor  $f$  két véges Blaschke-szorzat hányadosa.

Bizonyítás.  $f$  meromorf, vagyis véges sok pólusa van  $D$ -ben legyen  $B(z)$  azon véges Blaschke-szorzat, amely gyökei pontosan a pólusainak felelnek meg (multiplicitással számolva). Ekkor az  $f(z)B(z)$  függvény holomorf  $D$ -n és folytonosan terjed  $\bar{D}$ -re, ezért a 2.2.4 következmény miatt  $f(z)B(z) = A(z)$ , ahol  $A(z)$  szintén egy véges Blaschke-szorzat.  $\square$

Szerencsénkre a Fatou-tételnek van egy másik egyszerű következménye is, amely a polinomok elméletére is átvihető.

2.2.6. de nció. Adott két metrikus tér  $X; Y$ . Azt mondjuk, hogy egy  $f : X \rightarrow Y$  folytonos függvény perfekt, ha bármely  $K \subset Y$  kompakt halmazra  $f^{-1}(K)$  is kompakt.

Ekkor igaz az alábbi tétel:

2.2.7. tétel. Egy  $f : D \rightarrow D$  holomorf függvény perfekt akkor és csak akkor, ha egy véges Blaschke-szorzat.

Bizonyítás. Először lássuk be az oda)() irányt. Tegyük fel, hogy  $f : D \rightarrow D$  holomorf és perfekt. Ekkor nem lehet konstans, hiszen, ha  $f = a \in D$ , akkor a  $f^{-1}(a) = D$ , ami ellentmondás. Elegendő azt belátni, hogy  $\prod_{j=1}^n |f(z_j)| < 1$ , hiszen ekkor a 2.2.2 tétel miatt valóban egy véges Blaschke-szorzat. Tegyük fel indirekte, hogy  $\prod_{j=1}^n |f(z_j)| \geq 1$ , azaz, ha  $(z_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset D$ , hogy  $|f(z_n)| \geq 1$ , akkor létezik  $0 < r < 1$  szám, hogy  $\prod_{j=1}^n |f(z_j)| > r$  bármely  $n \in \mathbb{N}$ -re. Azonban az  $r$  sugarú zárt egységkörlemez  $\overline{B(0; r)}$  kompakt, tehát van olyan  $0 < r^0 < 1$ , hogy  $f^{-1}(\overline{B(0; r^0)}) \subset B(0; r^0)$ . Elég nagy  $n$ -re  $z_n \notin B(0; r^0)$ , ami ellentmond ennek.

A másik irány (( )) nyilvánvaló. □

Ahogy említettem, ez a tétel hasonlóan megfogalmazható a polinomok körében.

2.2.8. tétel. Egy egészfüggvény akkor és csak akkor polinom, ha perfekt.

## 2.3. Karakterizáció a megoldások számával

Ahogy korábban is említettem, a polinomok és Blaschke-szorzatok között húzóódo összefüggések egy része mögött mélyebb differenciáltopológiai okok állnak. Az előző rész utolsó 2.2.8 tétele után gyanút foghatunk, hogy a Riemann-felületek (egydimenziós komplex sokaságok) között futó perfekt leképezésekhez hasonlóan, itt is érdekes összefüggésre bukkanhatunk  $B(z) = w$  egyenlet megoldásainak számát vizsgálva. Igaz ugyanis a következő

2.3.1. tétel ([5] 28-30). Tegyük fel, hogy  $X, Y$  Riemann-felületek,  $f : X \rightarrow Y$  pedig egy holomorf nem konstans és perfekt leképezés. Ekkor létezik olyan  $n \in \mathbb{N}$ , hogy  $f$  minden  $y \in Y$  értéket pontosan  $n$ -szer vesz fel, multiplicitással számolva.

Ez a tétel okot ad tehát a hasonlóságok ilyen oldalról történő feltárására is. Ehhez azonban érdemes tisztáznunk előzetesen a multiplicitás fogalmát.

2.3.2. definíció. Legyen  $f : D \rightarrow \mathbb{C} \setminus \{0\}$  holomorf az  $a \in D$  pontban és  $f(a) = b$ . Azt mondjuk, hogy az  $a$  pontban a  $b$  érték multiplicitása  $m$ , ha

$$f^{(k)}(a) = f^{(k)}(a) = \dots = f^{(m-1)}(a) = 0 \text{ és } f^{(m)}(a) \neq 0:$$

Azaz a  $m$ -szeres gyöké  $f(z) = b$ -nek.

Legyen  $f : D \rightarrow \mathbb{C} \setminus \{0\}$  holomorf és  $b \in \mathbb{C}; D \subset \mathbb{C}$ . Jelölje  $m_f(b; D)$  az  $f(z) = b$  egyenlet  $D$ -beli megoldásainak számát, multiplicitással számolva.

Most már kimondhatjuk az alábbi nevezetes tényt:

2.3.3. tétel. Legyen  $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$  szürjektív egészfüggvény. egy  $n$ -edfokú polinom akkor és csak akkor, ha  $m_f(b; \mathbb{C}) = n; \forall b \in \mathbb{C}$ -re.

Ez a tétel egy az egyben átvihető a véges Blaschke-szorzatokra. Először azt fogjuk belátni, hogy:

2.3.4. tétel. Ha  $B(z) = \prod_{i=1}^n \frac{z - a_i}{1 - \bar{a}_i z}$  véges Blaschke-szorzat ( $n \in \mathbb{N}; a_i \in D \setminus \{0\}$ -re), akkor  $m_B(w; D) = n; \forall w \in D$ .

Bizonyítás. Alakítsuk át a Blaschke-szorzatot polinomok hányadosává úgy, hogy előálljon a

$$B(z) = \frac{z^n \overline{p(1-\bar{z})}}{p(z)} = \frac{z^n + \bar{a}_n z^{n-1} + \dots + \bar{a}_1 z + \bar{a}_0}{z^n + a_n z^{n-1} + \dots + a_1 z + a_0} \quad (2.3.1)$$



alakban, ahol  $a_0 \neq 0$  és a számláló gyökei mind  $D$ -ben vannak.

Ehhez legyen  $p(z) = e^{i\theta} \prod_{i=1}^n (z - a_i)$  és

$$z^n \overline{p(1-\bar{z})} = e^{i\theta} \prod_{i=1}^n (z - a_i) = e^{i\theta} z^n \prod_{i=1}^n (1 - \bar{a}_i/z) = e^{i\theta} z^n \overline{\prod_{i=1}^n (1 - \bar{a}_i/z)} \quad (2.3.2)$$

Ekkor valóban teljesül, hogy

$$B(z) = \frac{z^n \overline{p(1-\bar{z})}}{p(z)} = \frac{e^{i\theta} z^n \prod_{i=1}^n (z - a_i)}{e^{-i\theta} z^n \prod_{i=1}^n (1 - \bar{a}_i/z)} \quad (2.3.3)$$

Vagyis valóban eláll 2.3.1 alakban  $z^n \overline{p(1-\bar{z})}$   $n$ -edfokú polinom gyökei (azaz a Blaschke-szorzat gyökei)  $D$ -ben vannak és  $a_0 = e^{i\theta} \neq 0$ .

Ezek után a  $B(z) = b$  megoldásai helyett elég  $z^n \overline{p(1-\bar{z})} = b p(z)$  egyenletet vizsgálunk. A fenti 2.3.1 jelölést használva tehát:

$$z^n + \bar{a}_1 z^{n-1} + \dots + \bar{a}_{n-1} z + \bar{a}_n = b (z^n + a_1 z^{n-1} + \dots + a_{n-1} z + a_n) = 0 \quad (2.3.4)$$

Feltehetjük, hogy  $|b| = 1$  (máskülönben osztunk  $|b|^{-1}$ -nel), azt is tudjuk továbbá, hogy  $\bar{a}_n \in D$ , hiszen 2.3.2 miatt

$$\bar{a}_n = (-1)^n a_1 a_2 \dots a_n \neq 0; \quad \text{ahol } |a_j| = 1 \quad (2.3.5)$$

Ebből tehát következik, hogy  $|b| < |a_j| = 1$ , ha  $b \in D$ , vagyis a 2.3.4 egyenlet baloldalán a polinom főegyütthatója nem nulla. Az egyenletnek valóban megoldása van, multiplicitással számolva.  $\square$

Az igazság az, hogy  $w$ -t nem csak a  $D$ -ből vehetjük, a  $B(z) = w$  egyenletnek ugyanis  $z \in T$  és  $w \in \mathbb{C} \setminus \bar{D}$  esetén is megoldása van (multiplicitással számolva), és a megoldások rendje és  $\mathbb{C} \setminus \bar{D}$ -beliek. Először vegyünk egy  $w$ -t a zárt egységkörlemez külsejéből. Szerencsénkre, a (2.1.4) összefüggést felhasználva az egész bizonyítás szórul szóra elmondható immár a körlemez kívülről is. Ha  $w \in T$ , akkor az egyenletnek megoldása valóban  $T$ -beli, hiszen tudjuk, hogy  $|B(z)| = 1$ , ha  $z \in T$  és csak ilyen  $z$ -kre. Az érdekesség az, hogy a körlemez határán minden értéket csak egyszer vesz fel, ennek belátásához érdemes külön venni egy lemmát, amit a későbbiekben is fel fogunk használni.

2.3.5. lemma. Ha  $B$  egy véges Blaschke-szorzat és  $T$  tetszőleges, akkor  $B^{-1}(w) \neq \emptyset$

Ahhoz, hogy ezt a lemmát bebizonyítsuk szükségünk lesz a következő később is hasznunkra váló eszközre:

2.3.6. de nício. Legyen  $f$  meromorf egy  $D$  tartományon. Az  $f(z)$  logaritmus deriváltja az  $f'(z)/f(z)$  függvény.

A logaritmus derivált ott értelmes és holomorf, ahol  $f$  nem nulla és holomorf. Az elnevezés mögött a  $(\log f)' = \frac{f'}{f}$  (log  $f$  lokálisan létezik) összefüggés áll.

A logaritmus deriváltra teljesül a következő tulajdonság:

$$\frac{(fg)'}{fg} = \frac{f'g + fg'}{fg} = \frac{f'}{f} + \frac{g'}{g} \quad (2.3.6)$$

Bizonyítás (2.3.5 lemma). Vegyük a

$$B(z) = \prod_{i=1}^n \frac{z - a_i}{1 - \bar{a}_i z} \quad (2.3.7)$$

alakú Blaschke-szorzat logaritmus deriváltját:

$$\frac{B'(z)}{B(z)} = \sum_{j=1}^n \frac{z - \bar{b}_j}{1 - \bar{b}_j z} = \sum_{j=1}^n \frac{(1 - \bar{b}_j z) + \bar{b}_j (z - b_j)}{(1 - \bar{b}_j z)^2} = \sum_{j=1}^n \frac{1 - b_j^2}{(1 - \bar{b}_j z)(z - b_j)} \quad (2.3.8)$$

Ha tehát  $z \in T$ , akkor  $\bar{z} = 1/z$ , ahonnan

$$\frac{B'(z)}{B(z)} = \sum_{j=1}^n \frac{1 - b_j^2}{(1 - \bar{b}_j/z)(z - b_j)} = \sum_{j=1}^n \frac{1 - b_j^2}{z - b_j} \quad (2.3.9)$$

Mivel  $B'(z)/B(z) = 1$ , ezért

$$1 = \sum_{j=1}^n \frac{1 - b_j^2}{z - b_j} > 0 \quad (2.3.10)$$

□

Ez az eredmény tehát biztosítja a számunkra, hogy egy véges Blaschke-szorzat nem vehet fel semmilyen  $T$ -beli értéket 1-nél nagyobb multiplicitással.

Most belátjuk a 2.3.4 tétel megfordítását is:

**2.3.7. tétel (Fatou).** Ha  $f \in H^2$  és  $n \in \mathbb{N}$ , hogy  $m_f(w; D) = n$   $\forall w \in D$ , akkor  $f$  egy  $n$ -edfokú véges Blaschke-szorzat.

Bizonyítás [16]. Azt fogjuk belátni indirekte, hogy  $\lim_{j \rightarrow \infty} |f(z_j)| = 1$ . Ezzel igazolnánk a tételt, hiszen ekkor a 2.2.2 tétel miatt  $f$  valóban véges Blaschke-szorzat.

Tegyük fel tehát, hogy  $\lim_{j \rightarrow \infty} |f(z_j)| \neq 1$ , vagyis, ha  $(z_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset D$  sorozat különböző pontokból áll, és  $|z_n| \rightarrow 1$ , létezik olyan  $0 < r < 1$  szám, hogy  $|f(z_n)| < r$ , ha  $n \rightarrow \infty$ . Mivel a zárt  $r$  sugarú  $\overline{B(0; r)}$  körlemez kompakt, ezért létezik olyan  $(z_{n_k})$  részsorozat, hogy  $|f(z_{n_k})| < r$  valamely  $b \in D$  komplex számra, ha  $n_k \rightarrow \infty$ .

$m_f(b; D) = n$ , ezért  $f(z_{n_k}) \neq b$  véges sok kivétellel. Jelöljük az  $f(z) = b$  egyenlet különböző megoldásait  $a_1, a_2, \dots, a_m$ -mel, rendre  $m_1, m_2, \dots, m_k$  multiplicitásokkal. A kiinduló feltétel szerint tehát  $m_1 + m_2 + \dots + m_k = n$ . A lokális értékelosztás tétele szerint mindenképp  $m_j > 0$ , hogy  $0 < |a_j - b| < r$ -ra az  $f(z) = b$  egyenlet egyetlen megoldása  $B_j := B(a_j; r)$  körlemezén és ezek szoros értékek, illetve  $m_j > 0$ , hogy  $\forall w \in B(b; r)$  számra, az  $f(z) = w$  egyenletnek  $B(a_j; r)$ -ben pontosan  $m_j$  különböző megoldása van és ezek mind egyszeres értékek. Válasszuk meg  $\rho_j$  számokat úgy, hogy a  $B(a_j; \rho_j)$  körlemezek diszjunktak legyenek és ne messék az egységkörvonalat, azaz

$$\rho_j < \min \left\{ \frac{1}{2} |a_j|, |a_j| - 1, |a_j| - |b|, |a_j| - |b| \right\}; \quad \rho_j < \frac{1}{2} (1 - |a_j|) \quad (2.3.11)$$

Továbbá legyen

$$\rho := \min \{ \rho_j : 1 \leq j \leq k \} \quad (2.3.12)$$

Ha  $|z_{n_k}| \rightarrow 1$ , akkor elég nagy  $n_k$ -ra  $z_{n_k} \notin \bigcup_{j=1}^k B(a_j; \rho)$ , azonban  $f(z_{n_k}) \in B(b; \rho)$ . Ekkor tehát az  $f(z) = f(z_{n_k})$  egyenletnek létezik  $m_j + 1 = n + 1$  megoldása, mindenképp  $B(a_j; \rho)$ -ben  $m_j$  darab egyszeres, és az  $z_{n_k}$ . Ez azonban ellentmondás. □

## 2.4. Approximáció

A következőkben a polinomok egészfüggvények közötti sűrűsége lesz az összehasonlítás kiindulópontja:

2.4.1. tétel. Ha  $f$  egészfüggvény, akkor létezik komplex polinomoknak olyan sorozata, amely pontonként  $f$ -hez tart.

Ahhoz, hogy zökkenőmentesen bebizonyíthassuk ennek a tételnek a Blaschke-szorzatokra vonatkozó megfelelőjét, először egy lemmát látunk be:

2.4.2. lemma. Ha  $B(z) = \prod_{i=1}^n \frac{z - b_i}{1 - \bar{b}_i z}$ ,  $b_i \in D$ ;  $n \in \mathbb{N}$  véges Blaschke-szorzat és  $a \in D$ , akkor  $B_a$  és  $B_{\bar{a}}$  is egy-egy-n-edfokú véges Blaschke-szorzat.

Bizonyítás. Világos, hogy  $(B_a)(z) \in D$ , ha  $z \in D$  és  $(B_a)(z) \neq 1$ , ha  $a \in T$ , továbbá  $B_a \in A(D)$ . Tehát a 2.2.4 következmény miatt  $B_a$  egy véges Blaschke-szorzat. Másrészt az

$$B(z) = B_a(w) \quad w \in D \quad (2.4.1)$$

egyenletnek a 2.3.4 tétel miatt megoldása van, tehát bármely  $w \in D$ -re a  $(B_a)(z) = w$  egyenletnek is (hiszen  $B_a|_D = \text{id}_D$ ), ám ekkor a 2.3.7 tétel miatt  $B_a$  egy  $n$ -edfokú véges Blaschke-szorzat.

Hasonlóan  $B_{\bar{a}}$  egy véges Blaschke-szorzat a 2.2.4 következmény miatt. Az, hogy  $n$ -edfokú könnyen adódik, hiszen

$$\frac{b_i - \bar{a}z}{1 - \bar{b}_i a(z)} = \frac{b_i - \frac{a}{\bar{a}z}}{1 - \frac{a}{\bar{a}z}} = \frac{(b_i - a)(\bar{a}_i b_i - 1)z}{(1 - \bar{b}_i a)(\bar{a}_i b_i - 1)z} = \frac{\bar{a} b_i - 1}{1 - \bar{b}_i a} \frac{\frac{a - b_i}{\bar{a}_i b_i - 1} z}{\frac{a - b_i}{\bar{a}_i b_i - 1} z}; \quad (2.4.2)$$

ahol  $\frac{\bar{a} b_i - 1}{1 - \bar{b}_i a} = 1$ . Tehát

$$(B_{\bar{a}})(z) = \prod_{i=1}^n \frac{\bar{a} b_i - 1}{1 - \bar{b}_i a} \prod_{i=1}^n \frac{\frac{a - b_i}{\bar{a}_i b_i - 1} z}{\frac{a - b_i}{\bar{a}_i b_i - 1} z}; \quad (2.4.3)$$

ahonnan látszik, hogy  $(B_{\bar{a}})$  valóban egy  $n$ -edfokú véges Blaschke-szorzat.  $\square$

2.4.3 megjegyzés. A lemmából és a 1.1.3 tételből az önkébe hullott az is, hogy bármely  $z \in \text{Aut}(D)$ -re mind  $z^{-1} B$ , mind  $B z^{-1}$  egy  $n$ -edfokú véges Blaschke-szorzat.

Jelölje a továbbiakban egy függvény  $D$ -beli szuprémumnormáját  $\|f\|_1$ , vagyis

$$\|f\|_1 = \sup\{|f(z)| : z \in D\} \quad (2.4.4)$$

A 2.4.1 tételnek a Blaschke-szorzatokra vonatkozó megfelelőjét Carathéodorynak tulajdonítjuk:

2.4.4. tétel (Carathéodory). Legyen  $f \in S$ , ekkor létezik olyan  $\{B_k\}$  véges Blaschke-szorzat sorozat, amely lokálisan egyenletesen  $f$ -hez tart  $C$ -n.

Bizonyítás. Elegendő lesz azt belátni, hogy bármely  $z \in S$ -re és  $n \in \mathbb{N}$ -re létezik olyan  $B_n$  véges Blaschke-szorzat, hogy az  $B_n$  függvénynek a nullában legalább  $n$ -szeres gyöke van. Ekkor ugyanis  $f(z) - B_n(z) = z^n g(z)$ , ahol  $g$  holomorf  $D$ -n,  $g(0) = 0$  és  $\|g\|_1 < 1$ , tehát

$$\|f(z) - B_n(z)\|_1 = \|z^n g(z)\|_1 \leq \|g\|_1 \|z^n\|_1 = \|g\|_1 \|B_n\|_1 \leq 2 \|g\|_1 \quad (2.4.5)$$

$g(z)$ -re alkalmazhatjuk a Schwarz-lemmát:

$$|f(z) - B_n(z)| \leq 2|z|^{n-1} \quad z \in D \quad (2.4.6)$$

Vagyis  $n \geq 1$  esetén  $B_n(z) \neq f(z)$  lokálisan egyenletesen.

Azt, hogy minden  $n$ -re létezik ilyen  $B_n$  indukcióval fogjuk belátni.  $n = 1$  esetén, ha  $f(0) = 1$ , akkor a maximumelv miatt  $f$  egy egységnyi hosszú konstans, ekkor készen vagyunk. Ha  $|f(0)| < 1$ , akkor legyen

$$B_1(z) = \frac{f(0)}{f(z)}; \quad (2.4.7)$$

így valóban  $f(0) \cdot B_1(0) = 0$ .

Most tegyük fel, hogy minden  $f \in S$ -re létezik  $B_n$ , hogy  $f \cdot B_n$ -nek a 0-ban  $n$ -szeres gyöke van. A Schwarz-lemma miatt ekkor

$$g(z) = \frac{f(0)(f(z))}{z} \quad (2.4.8)$$

ugyancsak Schur-osztálybeli függvény, vagyis van olyan  $B_n$  véges Blaschke-szorzat, hogy  $B_n$ -nek a 0-ban legalább  $n$ -szeres gyöke van. Így  $B_n$  felírható az

$$g(z) \cdot B_n(z) = z^n h(z) \quad (2.4.9)$$

alakban, ahol  $h$  holomorf  $D$ -n és  $\int_{\partial D} |h(z)| dz < 1$ . Mivel

$$B_{n+1} := f(0)(zB_n(z)) \quad (2.4.10)$$

a 2.4.2 lemma miatt  $B_{n+1}$  egy  $(n+1)$ -edfokú véges Blaschke-szorzat, így azt szeretnénk belátni, hogy ez a  $B_{n+1}$  rendelkezik az előírt tulajdonságokkal.

Ehhez azt is tudjuk, hogy

$$f(z) = f(0)(zg(z)) \quad (2.4.11)$$

és

$$\frac{f(z_1)}{f(z_2)} = \frac{(1 - \bar{a}_2)(a - z_1)(1 - \bar{a}_1)(a - z_2)}{(1 - \bar{a}_1)(1 - \bar{a}_2)} = \frac{(z_2 - z_1)(1 + |a|^2)}{(1 - \bar{a}_1)(1 - \bar{a}_2)}; \quad a \in D; \quad (2.4.12)$$

Ezek után

$$\begin{aligned} f(z) \cdot B_{n+1}(z) &= f(0)(zg(z)) \cdot f(0)(zB_n(z)) = \frac{(zB_n(z) \cdot zg(z))(1 + |f(0)|^2)}{(1 - \bar{f}(0)zg(z))(1 - \bar{f}(0)zB_n(z))} = \\ &= z(B_n(z) \cdot g(z)) \frac{(1 + |f(0)|^2)}{(1 - \bar{f}(0)zg(z))(1 - \bar{f}(0)zB_n(z))} = \\ &= z^{n+1} h(z) \frac{(1 + |f(0)|^2)}{(1 - \bar{f}(0)zg(z))(1 - \bar{f}(0)zB_n(z))}; \end{aligned} \quad (2.4.13)$$

Vagyis teljesül az indukciós feltétel. □

A 2.4.4 tételben az approximáló  $B_k$  sorozatban előfordulhat, hogy a tagoknak többszörös gyökei is vannak. Bizonyos esetekben szükségünk lesz olyan approximációra, ahol a közelítő Blaschke-szorzatoknak csak egyszeres gyökei vannak. Szerencsére ezt mindig meg tudjuk oldani.

**2.4.5. tétel.** Legyen  $B$  egy  $n$ -edfokú véges Blaschke-szorzat. Ekkor létezik  $n$ -edfokú véges Blaschke-szorzatoknak olyan  $B^\epsilon : 0 < \epsilon < \epsilon_0$  sorozata, hogy

(a)  $B^\epsilon$  gyökei egyszeresek,

(b)  $B^\epsilon : B^\epsilon(0) \neq 0$  és  $B^{\epsilon_0}(0) \neq 0$ ,

(c)  $\rho > 0$  esetén  $B^\rho$   $B$  lokálisan egyenletesen (olyan kompakt halmazokon, amelyek nem tartalmazzák  $B$  pólusait).

Bizonyítás. Legyen

$$B(z) = \prod_{i=1}^n \frac{b_i z^{k_i}}{1 - \overline{b_i} z} \quad ; \text{ ahol } \sum k_i = n; \quad b_i \in \mathbb{D} \text{ különbözők és } k_i = n: \quad (2.4.14)$$

Definiáljuk  $\rho_0$ -at a következőképpen:

$$\rho_0 = \min_{1 \leq j \leq m} \frac{1}{2} |b_j| \quad ; \quad i, j = 1, \dots, m; \quad i \neq j: \quad (2.4.15)$$

Ekkor, ha  $0 < \rho < \rho_0$ , akkor a

$$S_{i,\rho} = \{z : |z - b_i| = \rho\} \quad (2.4.16)$$

(vagyis az  $\rho$  sugarú,  $b_i$  középpontú körök) diszjunktak. Most vegyünk minden ilyen  $S_{i,\rho}$ -ről  $(1 \leq i \leq m)$   $k_i$  darab különböző  $b_{i,1}, b_{i,2}, \dots, b_{i,k_i}$  komplex számot és legyen

$$B^\rho(z) = \prod_{i=1}^m \prod_{s=1}^{k_i} \frac{b_{i,s} z}{1 - \overline{b_{i,s}} z} \quad (2.4.17)$$

Azt állítjuk, hogy ez az  $n$ -edfokú Blaschke-szorzat teljesíti az (a); (b); (c) állításokat. (a) nyilvánvalóan igaz, hiszen pont így választottuk meg  $b_{i,s}$ -eket, másrészt  $\rho_0 > \rho > 0$ -ra  $B^\rho(0) \neq 0$ , hiszen egyik  $b_{i,s}$  sem 0. Ahhoz, hogy (b) második része is teljesüljön vizsgáljuk ismét  $B^\rho$  logaritmikus deriváltját, ahol  $B^\rho(z) \neq 0$ .

$$\frac{B^{\rho,0}(z)}{B^\rho(z)} = \sum_{i=1}^m \sum_{s=1}^{k_i} \frac{1 - \overline{b_{i,s}} z^2}{(1 - \overline{b_{i,s}} z)(z - b_{i,s})} \quad (2.4.18)$$

Mivel  $B^\rho(0) \neq 0$ , ezért

$$\frac{B^{\rho,0}(0)}{B^\rho(0)} = \sum_{i=1}^m \sum_{s=1}^{k_i} \frac{1 - |b_{i,s}|^2}{|b_{i,s}|} = \sum_{i=1}^m \sum_{s=1}^{k_i} \frac{1}{\overline{b_{i,s}}} \quad (2.4.19)$$

Vegyünk észre, hogy meg tudjuk úgy választani  $b_{i,s}$ -eket, hogy  $B^{\rho,0}(0) \neq 0$  teljesüljön. Ha például  $b_{1,1} = e^i$  és netalán

$$\frac{B^{\rho,0}(0)}{B^\rho(0)} = \frac{1}{e^i} + \sum_{s=2}^{k_1} \frac{1}{\overline{b_{1,s}}} + \sum_{i=2}^m \sum_{s=1}^{k_i} \frac{1}{\overline{b_{i,s}}} \quad (2.4.20)$$

0 lenne, akkor  $\rho$ -t egy kicsit módosítva (vigyázva, hogy  $b_{1,1}$  ne essen egybe egyik  $b_{i,s}$ -sel se, ha  $2 \leq s \leq k_1$ ), már igaz lesz, hogy  $B^{\rho,0}(0) \neq 0$ .

Most lássuk be a (c) rész teljesülését. Ehhez használjuk fel azt, hogy ha adott két  $c_1; c_2; \dots; c_n$  és  $d_1; d_2; \dots; d_n$   $\overline{\mathbb{D}}$ -beli sorozat, akkor

$$\prod_{i=1}^n c_i \prod_{i=1}^n d_i = \prod_{i=1}^n c_i \prod_{i=2}^n (c_i + d_i) \prod_{i=2}^n c_i \prod_{i=1}^n d_i = (c_1 - d_1) \prod_{i=2}^n (c_i + d_i) \prod_{i=2}^n c_i \prod_{i=2}^n d_i$$

$$= \prod_{i=2}^n (c_i - d_i) \prod_{i=2}^n (c_i + d_i) \prod_{i=2}^n c_i \prod_{i=2}^n d_i = \prod_{i=2}^n (c_i^2 - d_i^2) \prod_{i=2}^n c_i \prod_{i=2}^n d_i$$

Vagyis indukcióval teljesül, hogy

$$\prod_{i=1}^n c_i \prod_{i=1}^n d_i = \prod_{i=1}^n (c_i^2 - d_i^2) \prod_{i=1}^n c_i \prod_{i=1}^n d_i \quad (2.4.21)$$

Ezek szerint

$$jB^*(z) = B(z)j \sum_{i=1}^n \sum_{s=1}^{X_i} \frac{b_{i,s} z}{1 - \overline{b_{i,s}} z} + \frac{b_j z}{1 - \overline{b_j} z} \quad (2.4.22)$$

Vagyis, ha  $K \subset C$  egy kompakt halmaz, amely nem tartalmazza  $B$  pólusait, akkor a nevezők el vannak határolva nullától, legyen mondjuk

$$\begin{aligned} r_1 &= \min_{j=1, \dots, m} \min_{z \in K} |1 - \overline{b_j} z| \\ r_2 &= \min_{j=1, \dots, m} \min_{z \in K} |1 - \overline{b_{i,s}} z| \end{aligned}$$

Így

$$\frac{b_{i,s} z}{1 - \overline{b_{i,s}} z} + \frac{b_j z}{1 - \overline{b_j} z} = \frac{j b_{i,s} z + \overline{b_j} b_{i,s} z^2 + \overline{b_j} z^2 b_j + b_j \overline{b_{i,s}} z + \overline{b_{i,s}} z^2 j}{j(1 - \overline{b_{i,s}} z) + \overline{b_j} z(1 - \overline{b_j} z)}$$

$$= \frac{j b_{i,s} z + b_j(1 + |z|^2)}{1 - \overline{b_{i,s}} z + \overline{b_j} z} + C_j b_{i,s} + b_j$$

ahol  $C$  konstans egyedül  $K$ -től függ. Tehát

$$jB^*(z) = B(z)j \sum_{i=1}^n \sum_{s=1}^{X_i} j b_{i,s} + b_j \quad (2.4.23)$$

Azaz  $B^*$  valóban konvergál lokálisan egyenletesen  $B$ -hez. □

## 2.5. Kritikus pontok helyzete, Gauss-Lucas-tétel

2.5.1. definíció. Azt mondjuk, hogy egy  $z$  pont az  $f$  függvény kritikus pontja, ha  $z$  az  $f'$  zérushelye.

A 2.3.5 lemma szerint egy tetszőleges Blaschke-szorzatnak nem létezik a körvonalon kritikus pontja. A kritikus pontok tehát vagy  $D$  vagy  $\bar{D}$ -beliek. Ennél több is igaz, a következő egyszerű eredmény egyfajta szimmetriát igazol.

2.5.2. lemma.  $B$  véges Blaschke-szorzat. tegyük fel, hogy  $z \in C \setminus \{0\}$  és  $B(z) \neq 0$ , illetve  $B(z) \neq 1$ . Ekkor  $B'(z) = 0$  pontosan akkor, ha  $B'(1/\overline{z}) = 0$ .

Bizonyítás. A 2.1.4 összefüggésből tudjuk, hogy

$$B(z)\overline{B(1/\overline{z})} = 1; \quad z \in C \setminus \{0\} \quad (2.5.1)$$

Deriváljuk  $z$  szerint,

$$B'(z)\overline{B(1/\overline{z})} - \frac{1}{z^2} B(z)\overline{B'(1/\overline{z})} = 0 \quad (2.5.2)$$

Másrészt az előbbi összefüggésből világos, hogy

$$B(z) \neq 0 \Leftrightarrow B(z) \neq 1 \quad (2.5.3)$$

E deriváltakra vonatkozó egyenlet és ez utóbbi ekvivalencia felhasználásával azt kapjuk, hogy

$$B'(z) \neq 0 \Leftrightarrow B'(1/\overline{z}) = 0 \quad (2.5.4)$$

□

Mielőtt rátérnénk a fejezet fő eredményének tárgyalására, belátunk egy a Blaschke-szorzatok kritikus pontjainak vizsgálatához igen hasznos tételt.

2.5.3. tétel. Legyen  $B$  egy  $n$ -edfokú véges Blaschke-szorzat, amelyet a tétel kedvéért a következő alakban adunk meg:

$$B(z) = z^{k_0} \prod_{i=1}^n \frac{b_i - z}{1 - \bar{b}_i z} \quad ; \text{ ahol } b_i \in D \setminus \{0\} \text{ k \text{ különböz\text{ok és } } \sum_{i=0}^n k_i = n: \quad (2.5.5)$$

Ekkor  $B^0$ -nak pontosan  $n - 1$  gyöke van  $D$ -ben (multiplicitással számolva),  $m$  gyöke  $C \setminus \bar{D}$ -ben, ha  $k_0 \in \mathbb{Z}$  és legfeljebb  $m - 1$ , ha  $k_0 = 0$ .

Bizonyítás. A 2.3.5 lemma miatt a körvonalon nem kell gyököket keresnünk. Tegyük fel először, hogy a gyökök mind különbözök ( $k_i = 1 \ \forall i = 1, \dots, n$ ) és sem  $B$ -nek, sem  $B^0$ -nak nincs gyöke  $a=0$ -ban. Ekkor a logaritmus derivált tulajdonságát kihasználva, tudjuk, hogy

$$B^0(z) = 0 \iff \frac{B^0(z)}{B(z)} = \sum_{i=1}^n \frac{1 - |b_i|^2}{(1 - \bar{b}_i z)(z - b_i)} = 0: \quad (2.5.6)$$

Most szorozzuk be a jobboldalon található egyenletet a

$$\prod_{i=1}^n (1 - \bar{b}_i z)(z - b_i) \quad (2.5.7)$$

szorzattal. Ekkor egy  $2n - 2$ -edfokú polinomot kapunk, amely gyökei nem

$$f \in \{0; b_1; b_2; \dots; b_n; 1 - \bar{b}_1; 1 - \bar{b}_2; \dots; 1 - \bar{b}_n\}$$

közül valók. Felhasználhatjuk az előző 2.5.2 lemmát, így azt kapjuk, hogy min  $D$ -ben, mind  $C \setminus \bar{D}$ -ben  $n - 1$  (különböz) gyök van (ebben az esetben  $n = 0$  volt).

Az általános esetet visszavezetjük az előzőre. Az előző fejezetben belátott 2.4.5 tétel miatt közelíthetjük a véges Blaschke-szorzatunkat olyan  $B^*$   $n$ -edfokú véges Blaschke-szorzatokkal, ahol a gyökök egyszeresek és  $B^*$ -nak, illetve  $B^0$ -nak nincs gyöke  $a=0$ -ban. vagyis speciálisan  $\bar{D}$ -n is egyenletesen konvergál, így a zárt egységkörlemezen teljesülnek a korábbi megállapításaink, ott  $1$  kritikus pontja van  $B$ -nek (multiplicitással számolva). Kérdés azonban, hogy mit mondhatunk  $C \setminus \bar{D}$ -n.

Először tekintsük azt az esetet, amikor  $k_0 \in \mathbb{Z}$ , ekkor közvetlen számolással adódik, hogy

$$B^0(z) = z^{k_0 - 1} \prod_{i=1}^n \frac{(b_i - z)^{k_i - 1}}{(1 - \bar{b}_i z)^{k_i + 1}} p(z); \quad (2.5.8)$$

ahol  $p$  egy  $2m$ -edfokú polinom, amely gyökei nem  $f \in \{0; b_1; \dots; b_m\}$ -beliek. Ekkor tehát a kritikus pontok száma (multiplicitással)  $\sum_{i=0}^m (k_i - 1) + 2m = n + m - 1$ . A 2.5.2 lemma miatt  $p$  gyökeinek szükségképpen

$$f \in \{w_1; w_2; \dots; w_m; 1 - \bar{w}_1; 1 - \bar{w}_2; \dots; 1 - \bar{w}_m\} \quad (2.5.9)$$

alakot kell ölteniük, vagyis  $B^0$ -nak valóban  $m$  gyöke van  $D$ -ben.

Most tegyük fel, hogy  $k_0 = 0$ . Tekintsük ismét a derivált függvényt.

$$B^0(z) = \prod_{i=1}^n \frac{(b_i - z)^{k_i - 1}}{(1 - \bar{b}_i z)^{k_i + 1}} q(z); \quad (2.5.10)$$

ahol most  $q(z)$  egy legfeljebb  $(2m - 2)$ -edfokú polinom, amelynek nincs gyöke  $f \in \{b_1; b_2; \dots; b_m\}$  között. Következésképpen  $B^0$ -nak legfeljebb  $n + m - 2$  gyöke van  $C$ -ben (multiplicitással számolva). Legyen  $q$  gyökeinek száma (multiplicitással)  $r$ , ebből legyen  $s$  darab  $a=0$  multiplicitása. Ekkor  $q$ -nak van  $r - s$  nem nulla gyöke, amelyekre a 2.5.2 lemma miatt teljesül a "szimmetria", vagyis  $s = 2$   $D$ -beli és  $s = 2$   $C \setminus \bar{D}$ -beli. Ezek szerint  $r + s = \deg q - 2m - 2 = r - s - 2m - 1$ , tehát  $q$ -nak valóban legfeljebb  $m - 1$  gyöke van  $C \setminus \bar{D}$ -ben.  $\square$

A következ® nevezetes tétel egy komplex polinom gyökeinek és kritikus pontjainak helyzetér® teszt állítást.

2.5.4. tétel (Gauss-Lucas) Egy nem konstans komplex polinom gyökeinek konvex burka tartalmazza a polinom kritikus pontjait.

A korábbi (Poincaré-féle körmodellbeli) vizsgálódásainkkal összhangban adódik a

2.5.5. de nícíó. Azt mondjuk, hogy egy  $A \subset D$  halmaz hiperbolikusan konvex ha

$$a_1, a_2 \in A \text{ és } t \in [0; 1] \Rightarrow \frac{a_1 + \frac{a_1 - a_2}{1 - \bar{a}_1 a_2} t}{1 + \frac{\bar{a}_1 - \bar{a}_2}{1 - \bar{a}_1 a_2} t} \in A$$

Ennek megfelel®en egy  $A \subset D$  halmaz hiperbolikus konvex burkának hívjuk a legsz®kebb  $A$ -t tartalmazó hiperbolikusan konvex halmazt, avagy

$$\text{conv}(A) = \bigcap \{ H \subset D : A \subset H \text{ és } H \text{ hiperbolikusan konvex} \} \quad (2.5.11)$$

J.L. Walsh 1952-ben jutott a Gauss-Lucas tételhez analóg eredményre a véges Blaschke-szorzatok körében.

2.5.6. tétel (Walsh). Ha  $B(z) = \prod_{i=1}^n \frac{z - b_i}{1 - \bar{b}_i z}$  egy véges Blaschke-szorzat, akkor gyökeinek hiperbolikus konvex burka tartalmazza a kritikus pontjait.

Bizonyítás. Tekintsük  $B(z) = \prod_{i=1}^n \frac{z - b_i}{1 - \bar{b}_i z}$ ,  $b_i \in D$ ;  $B'(z)$  logaritmikus deriváltját (ahol értelmes), ekkor a (2.3.6) tulajdonság miatt

$$\text{Im} \frac{B'(z)}{B(z)} = \text{Im} \sum_{i=1}^n \frac{(1 - \bar{b}_i z) + \bar{b}_i (z - b_i)}{(1 - \bar{b}_i z)^2} \frac{1}{z - b_i} = \sum_{i=1}^n \text{Im} \frac{1 - j b_i^2}{(1 - \bar{b}_i z)(z - b_i)} \quad (2.5.12)$$

A kritikus pontok helyzetének jobb megértéséhez vizsgáljuk meg alaposabban a

$$\psi(z) = \frac{1 - j a^2}{(1 - \bar{a}z)(z - a)}; \quad a \in D \setminus \{z : \text{Im}(z) > 0\} \quad (2.5.13)$$

$D \setminus \{z : \text{Im}(z) < 0\}$ -n holomorf függvényt, pontosabban azt, hogy hova képezi a  $D \setminus \{z : \text{Im}(z) < 0\}$  alsó félkörlemez határát.

Ha  $z \in \mathbb{R}$  :  $\text{Im}(z) = 0$ , akkor

$$\psi(z) = \psi(e^i) = \frac{1 - j a^2}{(1 - \bar{a}e^i)(e^i - a)} = \frac{1 - j a^2}{(1 - \bar{a}e^i)(e^i - a)} \frac{e^{-i}}{e^{-i}} = \frac{(1 - j a^2)e^{-i}}{j(1 - \bar{a}e^i)j^2} \quad (2.5.14)$$

Ezért a  $\psi(e^i) : \text{Im}(z) < 0$  alsó félkört  $\psi$  a  $C \setminus \{z : \text{Im}(z) > 0\}$  zárt fels® félsíkra képezi. Ha pedig  $z \in [ -1; 1]$ , akkor

$$\psi(z) = \frac{1 - j a^2}{j(1 - \bar{a}z)(z - a)j^2} (1 - \bar{a}z)(z - a) \quad (2.5.15)$$

Így csak a képzetes részt gylembe véve:

$$\begin{aligned} \text{Im}(\psi(z)) &= \frac{1 - j a^2}{j(1 - \bar{a}z)(z - a)j^2} \text{Im}(z - az^2 - \bar{a} + jaj^2z) = \\ &= \frac{1 - j a^2}{j(1 - \bar{a}z)(z - a)j^2} (1 - z^2) \text{Im}(a); \quad z \in [ -1; 1]; \end{aligned} \quad (2.5.16)$$

Ezért  $\psi([ -1; 1]) \subset C \setminus \{z : \text{Im}(z) > 0\}$ . Összegezve ezeket a részeredményeket és kihasználva, hogy holomorf a  $D \setminus \{z : \text{Im}(z) < 0\}$  alsó félkörlemezen, azt kapjuk, hogy  $\psi([ -1; 1]) \cup \psi(e^i : \text{Im}(z) < 0)$  egy egyszerű zárt görbe a  $C \setminus \{z : \text{Im}(z) > 0\}$  zárt fels® félsíkban, továbbá

$$\psi(D \setminus \{z : \text{Im}(z) < 0\}) \subset C \setminus \{z : \text{Im}(z) > 0\} \quad (2.5.17)$$



Vagyis

$$z \in D \setminus \{z : \operatorname{Im}(z) < 0\} \Rightarrow \operatorname{Im}(z) > 0: \quad (2.5.18)$$

Most tegyük fel, hogy  $B$  gyökei (vagyis minden  $b_i, i = 1; \dots; n$ ) a  $D \setminus \{z : \operatorname{Im}(z) > 0\}$  felső félkörlemezbe esnek. Ekkor (2.5.12) miatt

$$z \in D \setminus \{z : \operatorname{Im}(z) < 0\} \Rightarrow \operatorname{Im} \frac{B^0(z)}{B(z)} > 0: \quad (2.5.19)$$

Tehát a folytonosság miatt, ha  $B(z)$  gyökei  $D \setminus \{z : \operatorname{Im}(z) < 0\}$  félkörlemezre esnek, akkor  $B^0(z)$  gyökei is.

Tekintsük most a  $B_a$  függvényt (valamely  $a \in D$ -re). A 2.4.2 lemma miatt ez is egyen-edfokú véges Blaschke-szorzat, gyökei pedig  $a_i^{-1}(b_i) = a_i^{-1}(b_i) \quad i = 1; \dots; n$  számok. Hasonlóan, ha  $B^0$  gyökei  $c_1; \dots; c_{n-1}$ , akkor  $(B_a)^0(z) = (B^0_a)(z) = (B^0_a)(z) \frac{1 - \bar{a}z}{1 - az}$  gyökei  $a_i^{-1}(c_i) \quad i = 1; \dots; n-1$  számok.

Az előző (2.5.19) megállapítás miatt:

$$\operatorname{Im}(a_i^{-1}(b_i)) \geq 0 \quad i = 1; \dots; n \Rightarrow \operatorname{Im}(a_i^{-1}(c_i)) \geq 0 \quad i = 1; \dots; n-1 \quad (2.5.20)$$

Ugyanez másképpen: ha  $B$  gyökei  $a$

$$\frac{a - t}{1 - \bar{a}t} \quad t \in [ -1; 1] \quad (2.5.21)$$

hiperbolikus egyenes egyik oldalán helyezkednek el, akkor  $B^0$  gyökei a hiperbolikus egyenes ugyanazon oldalán (itt szintén kihasználjuk a  $a^{-1} \circ a = \operatorname{id}$  összefüggést).

Hasonlóan, ha  $t = z$  forgatással helyettesítjük  $a$ -t, akkor  $B^{-1}$  gyökei  $-(b_i) \quad i = 1; \dots; n$ ,  $(B^{-1})^0$  gyökei pedig  $-(c_i) \quad i = 1; \dots; n-1$ . Ezért, ha  $B$  gyökei  $a$

$$t \in [ -1; 1] \quad (2.5.22)$$

(hiperbolikus) egyenes egyik oldalára esnek, akkor  $B^0$  gyökei szintén ugyanarra az oldalára.

Mindent összevetve tehát, ha  $B$  gyökei egy hiperbolikus félsíkba esnek, akkor a kritikus pontjai is ebbe a félsíkba esnek, ilyenek metszete pedig kiadja a hiperbolikus konvex burkát.  $\square$

## 2.6. Karakterizáció a kritikus pontokkal

Egy véges Blaschke-szorzat kritikus pontjairól már sok szó esett korábban is, tudjuk például a 2.5.3 tétel után, hogy egy  $d$ -edfokú véges Blaschke-szorzatnak  $(d-1)$  darab kritikus pontja van (multiplicitással)  $D$ -ben. Adódik a kérdés, hogy mit mondhatunk, mekkora szabadsággal bírunk a kritikus pontok megválasztásakor, ha azokhoz mindenképpen szeretnénk egy Blaschke-szorzatot is társítani. A komplex polinomok körében igaz a következő tétel:

2.6.1. tétel. Két komplex polinomnak,  $p$ -nek és  $q$ -nak ugyanazok a kritikus pontjai, multiplicitással számolva, akkor és csak akkor, ha  $p = \lambda q$ , ahol  $\lambda$  egy lineáris polinom.

Az eddigiek alapján erős a gyanú bennünk, hogy hasonló szabadsággal bírunk a véges Blaschke-szorzatok esetében is. Valóban,

2.6.2. tétel ([22]). Legyen  $c_1; c_2; \dots; c_d$   $d$  darab (nem feltétlenül különböző) pont  $D$ -ben. Ekkor egyértelműen létezik egy  $B$   $(d+1)$ -edfokú véges Blaschke-szorzat, amelynek a kritikus pontjai  $c_1; c_2; \dots; c_d$ ,  $B(0) = 0$  és  $B(1) = 1$ . Továbbá, ha  $A$  egy olyan  $(d+1)$ -edfokú véges Blaschke-szorzat, amelynek szintén  $c_1; c_2; \dots; c_d$ -ek a kritikus pontjai, akkor létezik olyan  $\lambda \in \operatorname{Aut}(D)$ , hogy  $A = B \circ \lambda$ .

Ennek a fejezetnek a célja egy bizonyítást adni a fent említett tételre. Az alap ötletünk az, hogy belátjuk arról a leképezésről, amely egy  $d + 1$  -edfokú véges Blaschke-szorzat gyökeit (amelyre továbbá igaz a tételben meghatározott két feltétel is) a Blaschke-szorzat kritikus pontjaiba képezi, egy szürjektív leképezés. Kezdeként tekintsük a

$$B_n(z) = \prod_{i=1}^n \frac{z - b_{i,n}}{1 - \overline{b_{i,n}}z}; \quad (b_{i,n}) \in D; \quad (2.6.1)$$

Aut(D)-beli függvényeket, ahol  $(b_{i,n}) \in D$  és  $\lim_{n \rightarrow \infty} b_{i,n} = b_i \in D$ . Ekkor a 2.4.5 tétel bizonyításához hasonlóan szintén teljesül, hogy a

$$B_n(z) = \prod_{i=1}^n \frac{z - b_{i,n}}{1 - \overline{b_{i,n}}z}; \quad (b_{i,n}) \in D; \quad \lim_{n \rightarrow \infty} b_{i,n} = b_i \in D \quad (2.6.2)$$

véges Blaschke-szorzat sorozat lokálisan egyenletesen tart a

$$B(z) = \prod_{i=1}^{\infty} \frac{z - b_i}{1 - \overline{b_i}z} \quad (2.6.3)$$

$d$ -edfokú véges Blaschke-szorzathoz. Vezessük be a

$$(b; z) = \frac{1 - \overline{b}z}{1 - b\overline{z}} \quad (2.6.4)$$

jelölést. Ez pontosan az az automorfizmusnak, ahol  $(b; b) = 0$  és  $(b; 1) = 1$  (egy a határon és a tartomány belsejében megadott érték már egyértelműen meghatároz egy konform leképezést).

2.6.3. állítás.  $(b_n) \in D$ ,  $(b_n; z)$  a hozzátartozó sorozat. Ekkor a következők igazak:

(a) ha  $b_n \neq 0$ , akkor  $(b_n; z) \neq 1$  lokálisan egyenletesen  $D$ -n,

(b) ha  $b_n \neq 1$ , akkor az  $\frac{1 - \overline{b_n}}{1 - b_n}$  sorozat minden torlódási pontjához létezik  $(a_n; z)$ -nek olyan részso-rozata, amely  $( )$ -hoz tart lokálisan egyenletesen.

Bizonyítás.

(a) Rögzítsünk egy  $K$  kompakt halmast. Ekkor mivel  $(b_n)$  az 1-től jól el van határolva, ezért

$$|(b_n; z) - 1| = \frac{|z - b_n|}{|1 - \overline{b_n}z|} (1 - |b_n|^2) \leq C_K (1 - |b_n|^2); \quad (2.6.5)$$

ahol  $C_K$  csak  $K$ -től függő konstans.

(b) Tegyük fel, hogy

$$\frac{1 - \overline{b_n}}{1 - b_n} \rightarrow 0; \quad (2.6.6)$$

akkor

$$(b_n; z) + \frac{1 - \overline{b_n}}{1 - b_n} = \frac{1 - \overline{b_n}}{1 - b_n} \frac{z - b_n}{1 - \overline{b_n}z} + 1 + \frac{1 - \overline{b_n}}{1 - b_n} \frac{1 - \overline{b_n}}{1 - b_n}; \quad (2.6.7)$$

ahol  $C_K$  egy  $K$ -től függő konstans.

□

Jelöljük  $B_d$ -vel a

$$B(z) = \prod_{i=1}^d (b_i; z) \quad (2.6.8)$$

alakú  $d+1$ -edfokú véges Blaschke-szorzatok halmazát. Világos, hogy  $B(0) = 0$  és  $B(1) = 1$ , illetve a 2.6.3 állítás következményeként, teljesül a következő

2.6.4. következmény. Ha  $(B_n)$  sorozat  $B_d$ -ben. Akkor vagy létezik olyan  $B \in B_d$ , hogy  $B_n \rightarrow B$  lokálisan egyenletesen  $D$ -n, vagy  $B_n$  bármely részsorozatának létezik olyan részsorozata és  $T, B \in B_d$ ;  $0 < d^0 < d$ , amely lokálisan egyenletesen tart  $B$ -hez  $D$ -n.

A 2.6.2 tétel bizonyításához a továbbiakban érdemes egy kicsinyég eltávolodni a Blaschke-szorzatok világától.

### 2.6.1. $D^d$ topologikus tér

Legyen

$$D^d = \{ (z_1, z_2, \dots, z_d) : z_i \in D; 1 \leq i \leq d \} \quad (2.6.9)$$

a szorzattopológiával ellátva, vagyis, ahol a bázisnyíltak a

$$U_1 \times U_2 \times \dots \times U_d \quad (2.6.10)$$

halmazok, ahol  $U_i \subset D$  nyílt. De niáljuk a következő ekvivalenciarelációt

$$(z_1; z_2; \dots; z_d) \sim (z_{(1)}; z_{(2)}; \dots; z_{(d)}); \quad z_{(i)} \in S_d; \quad (2.6.11)$$

ahol  $S_d$ -vel jelöljük a  $d$ -ed rendű szimmetrikus csoportot. Ezzel az ekvivalenciarelációval legyen a faktortér

$$V^d = D^d / \sim; \quad (2.6.12)$$

a rendezetlen számd-esek (multihalmazok) tere, és jelöljük  $z = (z_1; z_2; \dots; z_d)$ -vel az elemeit. (Vigyázzunk, hogy ez nem azonos  $(z_1; z_2; \dots; z_d)$  halmazzal.) Hogyan néz ki ezen a faktortéren a topológia? Ha  $q$ -val jelöljük a  $q: D^d \rightarrow V^d$  kanonikus projekciót, akkor de níciónak szerint a  $V^d$ -beli nyíltak, azon  $D^d$ -beli nyíltak  $q$  szerinti képei, amelyek előállnak teljes ekvivalenciaosztályok uniójaként. Vagyis azt mondhatjuk, hogy a

$$V^d = \left[ \bigcup_{z \in D^d} B(z_{(1)}; \dots; z_{(d)}; \dots) \right] \quad (2.6.13)$$

halmaz  $q$  szerinti képe, ahol  $z = (z_1; z_2; \dots; z_d)$  környezete, ahol  $B(z_i; \dots)$   $D$ . Jelölés:  $z = (z_1; z_2; \dots; z_d) \in D^d$ -re  $q(V^d) = D(z; \dots)$ . Azaz  $D(z; \dots)$  olyan  $w \in D^d$ -kből áll, amelyekhez létezik  $S_d$ , hogy

$$|z_1 - w_{(1)j}| < \epsilon; \quad |z_2 - w_{(2)j}| < \epsilon; \quad \dots; \quad |z_d - w_{(d)j}| < \epsilon; \quad (2.6.14)$$

Ezek után értelemszerűen de niálható a konvergencia is  $D$ -n.

2.6.5. állítás. A  $q: D^d \rightarrow S_d$  kanonikus projekció egy nyílt leképezés.

Bizonyítás. Rögzített  $H \subset S_d$ -ra, az

$$F: D^d \rightarrow D^d; F(z_1; z_2; \dots; z_d) = (z_{(1)}; z_{(2)}; \dots; z_{(d)}) \quad (2.6.15)$$

leképezés egy homeomorfizmuson, hiszen csak a koordinátákat cseréljük fel. Így, mivel bármely  $H \subset D^d$  halmazra

$$q^{-1}(q(H)) = \bigcup_{H \in S_d} F(H); \quad (2.6.16)$$

speciálisan a nyílt  $H$  halmazokra  $q^{-1}(q(H))$  nyílt. Tehát  $q(H)$  nyílt.  $\square$

Térjünk vissza a  $B_d$  függvényosztályhoz. Figyeljük meg, hogy a  $D^d$  topologikus tér más értelmezést nyer, ha egy tetszőleges  $b \in D^d$  elemet megfigyelünk a

$$B(b; z) = \prod_{i=1}^d (b_i; z) \quad (2.6.17)$$

véges Blaschke-szorzatnak. Vegyük észre, hogy ekkor  $a_d$ -beli, konvergencia fogalom ezen a megfeleltetésen keresztül éppen egybeesik  $B_d$ -beli lokálisan egyenletes konvergencia fogalmával. Tegyük fel először, hogy adott egy  $(b_n) \subset D^d$  konvergens sorozat, hogy  $b_n \rightarrow b \in D^d$ , vagyis bármely  $\epsilon > 0$ -ra létezik olyan  $N \in \mathbb{N}$  és  $n \geq N$  esetén

$$|b_{n,i} - b_{(i)}| < \epsilon; \quad |b_{n,2} - b_{(2)}| < \epsilon; \quad \dots; \quad |b_{n,d} - b_{(d)}| < \epsilon; \quad (2.6.18)$$

Ez viszont azt jelenti, hogy  $B(b_n; z) \rightarrow B(b; z)$  lokálisan egyenletesen  $D$ -n. Megfordítva, ha  $B(b_n; z) \rightarrow B(b; z)$ , akkor Hurwitz-tétel miatt igaz a  $b_i$  gyökök bármilyen kis környezetében, hogy elég nagy  $n$ -re a  $B(b_n; z)$ -nek is létezik gyöke, amely pontosan  $b_n \rightarrow b$   $D$ -beli konvergenciájának felel meg.

2.6.6 megjegyzés. Belátható, hogy a  $B_d$  a lokálisan egyenletes konvergencia által indukált topológiával ellátva metrizálható, mégpedig a

$$d(B_1; B_2) = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{2^n} \sup_{|z| < 1} |B_1(z) - B_2(z)|; \quad \text{ahol } B_1, B_2 \in B_d \quad (2.6.19)$$

metrikával, tehát a fenti megfeleltetés révén  $D$  is.

De niáljuk most már a 2.6.2 tétel belátásához a  $B(b; z)$  véges Blaschke-szorzathoz, az  $c_1; c_2; \dots; c_d$  kritikus pontjait rendeli, vagyis legyen

$$B(b; z) = \prod_{i=1}^d (b_i; z) = \prod_{i=1}^d (c_i; z); \quad (2.6.20)$$

Ez értelmes leképezés, hiszen a 2.5.3 tétellel láttuk, hogy minden  $d > 1$ -edfokú véges Blaschke-szorzatnak kritikus pontja van  $D$ -ben, multiplicitással számolva. A 2.6.2 tétel bizonyításának kulcsa annak belátása, hogy  $B$  homeomorfizmus.

2.6.7. lemma. folytonos.

Bizonyítás. Legyen  $b_n \rightarrow b$   $D$ -ben. Vagyis  $B(b_n; z) \rightarrow B(b; z)$  lokálisan egyenletesen  $D$ -n. Ekkor a Weierstraß-tétel miatt  $\partial B(b_n; z) \rightarrow \partial B(b; z)$  szintén lokálisan egyenletesen, vagyis korábbi megfeleltetés révén immár ezen deriváltak gyökeire teljesül, hogy  $c_n \rightarrow c$   $D$ -ben. sorozatfolytonos, tehát folytonos.  $\square$

A következőkben azt fogjuk belátni, hogy  $f$  perfekt. Ehhez azonban szükségünk lesz egy segédállításra.

2.6.8. állítás.  $X; Y$  metrikus terek. Egy  $f : X \rightarrow Y$  folytonos leképezésre a következők ekvivalensek:

(1)  $f$  perfekt

(2) Ha  $(x_n) \subset X$  olyan, hogy bármely  $K_X \subset X$  kompakt halmazzal  $n : x_n \in K_X$   $g_j < 1$ , akkor  $f(x_n)$  is rendelkezik ezzel a tulajdonsággal, vagyis bármely  $K_Y \subset Y$  kompakt halmazzal

$$\{f(x_n) : f(x_n) \in K_Y\} \text{ g}_j < 1 :$$

Bizonyítás. (1)  $\Rightarrow$  (2): Tegyük fel, hogy  $f$  perfekt, és hogy létezik olyan  $K_Y \subset Y$ , hogy  $\{f(x_n) : f(x_n) \in K_Y\}$  nem véges. Vagyis  $\{f(x_n) : f(x_n) \in K_Y\}$  végtelen, és  $f^{-1}(K_Y)$  kompakt, tehát  $K_X = f^{-1}(K_Y)$  olyan kompakt halmaz, amelyre  $\{x_n : x_n \in K_X\}$  végtelen.

(2)  $\Rightarrow$  (1):  $X; Y$  metrikusak, így a sorozatkompaktság és kompaktság ekvivalens fogalmak. Legyen  $K_Y \subset Y$  és  $(x_n) \subset f^{-1}(K_Y)$  sorozat. Így mivel  $f(x_n) \in K_Y$  és  $K_Y$  kompakt, ezért  $(x_n)$ -re sem teljesül (2) tehát létezik olyan  $L \subset X$ , hogy  $\{x_n : x_n \in L\}$  végtelen, ezért  $(x_{n_k})$  részsorozat, amely konvergens. folytonos, tehát  $f^{-1}(K)$  zárt.  $(x_{n_k}) \subset f^{-1}(K)$ -ban is konvergens.  $\square$

A következő állításra is szükségünk lesz később:

2.6.9. állítás.  $X; Y$  metrikus terek.  $f : X \rightarrow Y$  folytonos perfekt leképezés. Ekkor  $f(X)$  zárt  $Y$ -ban.

Bizonyítás. Tegyük fel indirekte, hogy  $y \in \overline{f(X)} \setminus f(X)$ . Ekkor létezik egy  $(y_n) \subset f(X)$ , hogy  $y_n \rightarrow y$ , magyarázva a  $K = \{y_n : n \in \mathbb{N}\}$  halmaz kompakt.  $f$  perfekt, így  $f^{-1}(K)$  is kompakt  $X$ -ben. Azonban  $y \notin f(X)$ , ezért  $f^{-1}(K) = \{f^{-1}(y_n) : n \in \mathbb{N}\}$ . Vegyünk egy tetszőleges sorozatot  $f^{-1}(K)$ -ből, a sorozatkompaktság miatt létezik konvergens részsorozat  $(x_n)$ . Mivel  $f$  folytonos, ezért  $f(x_n)$  is konvergens, de a határértéke nem lehet  $y$ . Ez azonban ellentmondás.  $\square$

Térjünk vissza a függvényünkhöz. Az előkészületek után most egy újabb tulajdonságát tudjuk belátni.

2.6.10. tétel.  $f$  perfekt.

Bizonyítás.  $f$  folytonos,  $d$  metrikus tér, ezért alkalmazhatjuk a 2.6.8 állítást. Tegyük fel indirekte, hogy, ha  $(b_n) \subset \mathbb{C}^d$  olyan sorozat, hogy bármely kompakt részhalmaz csak véges sok elemét tartalmazza, akkor létezik olyan  $K \subset \mathbb{C}^d$  kompakt halmaz, hogy  $f : (b_n) \subset K$   $g$  végtelen számosságú. Feltehető tehát, hogy  $f(b_n) \subset K$ . Másrészt  $(b_n)$  megválasztása miatt az is feltehető szükség esetén átindexelve a sorozatot, hogy  $b_n \rightarrow b = (b_1; b_2; \dots; b_d)$ , ahol  $|b_i| = 1$  és  $|b_j| = 1$ , ha  $2 \leq i \leq d$ .

Feleltessük meg most ezeket a sorozatokat  $B(b_n; z)$  függvénysorozatoknak. A 2.6.3 következményeként  $B(b_n; z)$  lokálisan egyenletesen konvergál egy  $B \subset B_{d^0}$ -hez, ahol  $0 < d^0 < d$ . Vagyis  $B$  egy  $(d^0 + 1)$ -edfokú véges Blaschke-sorozat  $d^0$  kritikus ponttal, multiplicitással (2.5.3 tétel). De, mivel  $(b_n)$  egy  $\mathbb{C}^d$ -beli kompakt halmaz része, ezért  $B$ -nek  $d$  darab kritikus pontja van.  $d^0 < d$ , ellentmondás.  $\square$

## 2.6.2. A távolság-arány függvény

Most fogjuk felhasználni az első fejezet végén tett megállapításainkat. Legyen  $S \subset \mathbb{C}^d$ , vegyük a  $(z) = \frac{2}{1 + |z|^2}$  Poincaré-metrika  $f$  szerinti pullbackjét (ld. 1.1.17), ez megegyezik a

$$(f^{-1})(z) = \frac{2|f^{-1}(z)|}{1 + |f^{-1}(z)|^2} \quad (2.6.21)$$

függvénnyel. Továbbá azt is tudjuk, hogy  $(f^{-1})'$  görbülete a kritikus pontokat leszámítva  $\neq 1$ , ami a  $\log|(f^{-1})'(z)| = -2 \log|f'(z)|$  összefüggésből következik. A Schwarz-Pick-tételből adódik, hogy

$$\frac{|f'(z)|}{1 - |f(z)|^2} \leq \frac{1}{1 - |z|^2}. \quad (2.6.22)$$

Ez adja a motivációt a

$$R_f(z) = \frac{1 - |z|^2}{1 - |f(z)|^2} |f'(z)| \quad (2.6.23)$$

távolság-arány függvény bevezetésére, amely felfogható úgy, mint amely Poincaré-metrikát hasonlítja össze az  $E^2$ -szerinti pullbackjével. Most a távolság-arány függvény függvény egy-két könnyen látható tulajdonságát fogjuk belátni, amelyek végül hozzásegítenek majd annak bebizonyításához, hogyinjektív.

2.6.11. lemma. Legyen  $f, g \in \text{Aut}(D)$ , ekkor

- (1)  $R_f \leq 1$ , és egyenlőség csak  $\text{Aut}(D)$  esetén teljesül,
- (2)  $R_{f \circ g} = (R_f \circ g) R_g$ , speciálisan, ha  $g \in \text{Aut}(D)$ , akkor  $R_{f \circ g} = R_f$  és  $R_g \circ f = R_f$ ,
- (3)  $R_f$  nemnegatív  $D$ -n, gyökei  $f$  kritikus pontjai, valós analitikus  $D$ -n ezeket a gyököket leszámítva. Továbbá minden  $c \in D$  minden  $c$  gyökére  $R_f(z) = |z - c|^m |f'(z)|$ , ahol  $m = f^{-1}(c)$  multiplicitása  $c$ -ben, pedig valós analitikus  $c$  egy környezetében.

Bizonyítás.

- (1) Ez tulajdonképpen a Schwarz-Pick-tétel.
- (2) Ez egyszerű számítással adódik a láncszabályból.

$$R_{f \circ g}(z) = \frac{1 - |z|^2}{1 - |f(g(z))|^2} |(f \circ g)'(z)| = \frac{1 - |g(z)|^2}{1 - |f(g(z))|^2} |f'(g(z))| \frac{1 - |z|^2}{1 - |g(z)|^2} |g'(z)| = (R_f \circ g) R_g \quad (2.6.24)$$

Másrészt  $R_f = 1$ , ahonnan a speciális eset adódik.

- (3) Tegyük fel, hogy  $f^{-1}(c)$ -nek  $m$ -edrendű gyöke van  $c$ -ben, ekkor

$$f(z) = f(c) + f^{(m+1)}(c)(z - c)^{m+1} + f^{(m+2)}(c)(z - c)^{m+2} + \dots \quad (2.6.25)$$

a  $c$  egy kis környezetében és  $f^{(k)}(c) \neq 0$ , ha  $k = m$ . Vagyis  $f'(z) = (z - c)^m g(z)$ , ahol  $g$  holomorf  $c$  környezetében és  $g(c) \neq 0$ . Ezt behelyettesítve a távolság-arány függvénybe adódik az állítás. □

2.6.12. lemma. Legyen  $B$  egy véges Blaschke-szorzat, ekkor  $R_B$  folytonosan kiterjed a határra és  $\lim_{|z| \rightarrow 1} R_B(z) = 1$ .

Bizonyítás. Azt fogjuk belátni, hogy tetszőleges  $\epsilon > 0$ -re

$$\lim_{|z| \rightarrow 1} \frac{1 - |B(z)|^2}{1 - |z|^2} = 1 \quad (2.6.26)$$

Ehhez első lépésként azt bizonyítjuk, hogy ha

$$B_k(z) = \prod_{i=1}^k \frac{z - b_i}{1 - \bar{b}_i z}; \quad B_0(z) = 1 \quad (2.6.27)$$

akkor bármely  $z \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{T}$ -re teljesül a

$$\frac{1 - \prod_{j=1}^n B_j(z)j^2}{1 - \prod_{j=1}^n zj^2} = \prod_{i=1}^n jB_{i-1}(z)j^2 \frac{1 - \prod_{j=1}^i b_j j^2}{j1 - \overline{b_i} zj^2} \quad (2.6.28)$$

azonosság. Indukciót használunk.

$n = 1$  : Schwarz-Pick-tétel speciális esete.

Tegyük fel, hogy  $k < n$ -re teljesül az indukciós feltétel. Ekkor

$$\begin{aligned} 1 - \prod_{j=1}^n B_j(z)j^2 &= 1 - \prod_{j=1}^{n-1} B_j(z)j^2 \frac{z - \overline{b_n}}{1 - \overline{b_n} z} = 1 - \prod_{j=1}^{n-1} B_j(z)j^2 + jB_{n-1}(z)j^2 \left( 1 - \frac{z - \overline{b_n}}{1 - \overline{b_n} z} \right) \\ &= 1 - \prod_{j=1}^{n-1} B_j(z)j^2 + jB_{n-1}(z)j^2 \frac{(1 - \prod_{j=1}^n zj^2)(1 - \prod_{j=1}^n b_j j^2)}{j1 - \overline{b_n} zj^2}; \end{aligned}$$

ahol az utolsó egyenlőség az  $az = 1$  esetben következik. Most osszuk végeig  $(1 - \prod_{j=1}^n zj^2)$ -tel az előbbi egyenlőség lánc legvégét, így azt kapjuk, hogy

$$\frac{1 - \prod_{j=1}^n B_j(z)j^2}{1 - \prod_{j=1}^n zj^2} = \frac{1 - \prod_{j=1}^{n-1} B_j(z)j^2}{1 - \prod_{j=1}^{n-1} zj^2} + jB_{n-1}(z)j^2 \frac{1 - \prod_{j=1}^n b_j j^2}{j1 - \overline{b_n} zj^2} = \prod_{i=1}^n jB_{i-1}(z)j^2 \frac{1 - \prod_{j=1}^i b_j j^2}{j1 - \overline{b_i} zj^2}; \quad (2.6.29)$$

Most lássuk be a kiinduló feltevésünket. Emlékeztetül, láttuk (2.3.10), hogy  $\mathbb{T}$ -re

$$jB^0(z)j = \prod_{i=1}^n \frac{1 - \prod_{j=1}^i b_j j^2}{j1 - \overline{b_i} zj^2}; \quad (2.6.30)$$

Ezt és az előző lépés eredményét felhasználva

$$\lim_{z \rightarrow 1} \frac{1 - \prod_{j=1}^n B_j(z)j^2}{1 - \prod_{j=1}^n zj^2} = \lim_{z \rightarrow 1} \prod_{i=1}^n jB_{i-1}(z)j^2 \frac{1 - \prod_{j=1}^i b_j j^2}{j1 - \overline{b_i} zj^2} = \prod_{i=1}^n \frac{1 - \prod_{j=1}^i b_j j^2}{j1 - \overline{b_i} j^2} = jB^0(1)j; \quad (2.6.31)$$

bebizonyítottuk a lemmát. □

Most már rendelkezésünkre áll minden eszköz ahhoz, hogy bebizonyítsuk a függvényünk injektivitását.

2.6.13. állítás.  $f$  injektív.

Bizonyítás. Tegyük fel, hogy  $a, b \in \mathbb{D}$ -ra igaz, hogy  $f(a) = f(b)$ . Legyen  $A$  és  $B$  ezekenak és  $b$ -nek megfelelő véges Blaschke-szorzatok  $\mathbb{D}$ -ben. A feltevés tehát az, hogy a kritikus pontjaik megegyeznek. Vegyük a

$$h(z) = \frac{R_A(z)}{R_B(z)}; z \in \mathbb{D} \quad (2.6.32)$$

függvényt. Ez a 2.6.11 lemma következményeként valós-analitikus  $\mathbb{D}$ -n  $A$  és  $B$  kritikus pontjait leszámítva. Sőt, mivel a lehetséges szingularitások  $\mathbb{R}_B$  zérushelyein fordulhatnak elő, amely helyeken a 2.6.11 lemma (3) pontja miatt a gyökök kiejtik egymást, ezért  $h$  valós-analitikus az egész  $\mathbb{D}$  tartományon. Az előző 2.6.12 lemma miatt  $h$  is kiterjeszthető  $\overline{\mathbb{D}}$ -re és  $\lim_{|z| \rightarrow 1} h(z) = 1$ .

Belátjuk, hogy  $h \neq 1$ . Ezt úgy fogjuk megtenni, hogy igazoljuk, hogy  $h \neq 1$ , ekkor a szimmetria miatt hasonlóan igaz  $\frac{1}{h} \neq 1$ . Tegyük fel indirekte, hogy  $h > 1$ , vagyis létezik valamilyen  $p$  pont, ahol felveszi a maximumát és  $h(p) > 1$ . Vagyis a második deriváltakra igaz (monoton növekvő függvénybe behelyettesítve is), hogy

$$\log h(p) < 0; \quad (2.6.33)$$

Vegyük észre, hogy  $h(z) = \frac{A(z)}{B(z)}$ . Vagyis

$$\log h(z) = \log(A(z)) - \log(B(z)) = \log(A(z)^2) - \log(B(z)^2) \quad (2.6.34)$$

a kritikus pontokat leszámítva, tehát a folytonosság miatt az egész  $D$ -n. Vagyis  $(A(z)^2)'(p) = (B(z)^2)'(p) = 0$ . Másrészt  $h(p) > 1$ , vagyis  $(A(z)^2)'(p) > (B(z)^2)'(p)$ , ez azonban ellentmondás.

$h \neq 1$ , vagyis  $R_A(z) = R_B(z)$ , ez azt jelenti, hogy

$$\frac{jA^0(z)}{1 - |A(z)|^2} = \frac{jB^0(z)}{1 - |B(z)|^2}; \quad z \in D \quad (2.6.35)$$

Ebből az következik, hogy az  $A(z) \neq B(z)$  leképezés a Schwarz-tétel miatt  $D$  automorfizmusa, vagyis valamilyen  $a$ -ra  $A(z) = B(z)$ . Azonban  $A, B \in B_d$ , ezért  $a=0$ -át és  $1$ -et is kizárják, tehát  $a \neq 1$  és  $A(z) = B(z)$ . Tehát valóban injektív.  $\square$

**2.6.14. tétel.**  $f: D \rightarrow D$  homeomorfizmus.

**Bizonyítás.** Beláttuk tehát, hogy  $f$  egy injektív, perfekt és folytonos leképezés. Azt is tudjuk továbbá (2.6.9 állítás), hogy  $D$  zárt  $D$ -ben. Ha igazoljuk, hogy  $D$  nyílt is, akkor készen vagyunk, hiszen  $D$  összefüggő. Tehát elég, ha azt látjuk be, hogy  $f$  a képére homeomorfizmus. Mivel a topológiát generálják a kompakt halmazok (kompaktan generált), ezért elegendő belátni, hogy bármely  $K \subset D$ -re  $f|_K: K \rightarrow f(K)$  megszorítás homeomorfizmus. Topológiából jól ismert állítás, hogy ha  $X$  tér kompakt,  $Y$  Hausdorff-tér és  $f: X \rightarrow Y$  folytonos injektív leképezés, akkor  $f$  homeomorfizmus a képére (ld. [20], 5.1.18. tétel).  $\square$

Ezzel elérkeztünk végre a 2.6.2 tétel bizonyításához.

**Bizonyítás (2.6.2 tétel).**  $B$  egyértelmű létezését éppen az előző tétel bizonyítja.

A tétel második részéhez tegyük fel, hogy  $A$  olyan  $d+1$ -edfokú véges Blaschke-szorzat, amelynek kritikus pontjai éppen  $B$  kritikus pontjai.  $A$  egy automorfizmussal való komponálása során nem változnak a kritikus pontok, vagyis feltehetjük, hogy  $A \in \text{Aut}(D)$  olyan, hogy  $A(0) = 0$  és  $A(1) = 1$ . Ekkor  $B; A \in B_d$  és a kritikus pontjaik megegyeznek, tehát injektivitása miatt  $B = A$ .  $\square$

## 2.7. Faktorizációs tételek

Világos, hogy a véges Blaschke-szorzatok halmaza zárt a pontonkénti szorzás műveletére nézve, nyilvánvaló ugyanis, hogy ha  $B_1$  és  $B_2$  két véges Blaschke-szorzat, akkor  $B_1 B_2$  is egy véges Blaschke-szorzat, amely fokja  $\deg(B_1) + \deg(B_2)$ . Jóval kevésbé nyilvánvaló, hogy mit mondhatunk két Blaschke-szorzat kompozíciójáról, ebben a kérdésben azonban némi segítséget nyújtott a 2.4.2 lemma, ahol láttuk, hogy tetszőleges  $B_a$  (Blaschke-függvény) és  $B_n$   $n$ -edfokú véges Blaschke-szorzat esetén mindig  $B_a B_n$   $B_a$  egy-egy  $n$ -edfokú véges Blaschke-szorzat. Szóval a 2.4.3 megjegyzésből tudjuk, hogy helyettesíthetjük tetszőleges  $\text{Aut}(D)$ -beli függvénnyel. Ezek után természetesen nem nehéz két véges Blaschke-szorzat kompozícióját sem meghatározni.

**2.7.1. tétel.** Legyen  $B_1$  és  $B_2$  két véges Blaschke-szorzat, rendre  $n_1$ -ed és  $n_2$ -edfokúak. Ekkor  $B_1 B_2$  is egy véges Blaschke-szorzat, amelynek a fokja  $n_1 + n_2$ .

**Bizonyítás.** Írjuk fel a  $B_1$ -et a

$$B_1 = \prod_{j=1}^{n_1} \left( \frac{z - b_j}{1 - \bar{b}_j z} \right) \quad (2.7.1)$$



alakban, ahol  $b_i$  ( $i = 1; \dots; n_1$ )  $B_1$  gyökei. Ekkor

$$B_1 B_2 = (b_1 B_2)(b_2 B_2) \dots (b_{n_1} B_2) \quad (2.7.2)$$

Ekkor a 2.4.2 lemma miatt minden  $b_i B_2$  tényező egy  $n_2$ -edfokú Blaschke-szorzat, tehát  $B_1 B_2$  egy  $n_1 n_2$ -edfokú véges Blaschke-szorzat.  $\square$

Ennek a fejezetnek a fő kiinduló kérdéséhez a tétel valamilyen értelembeni megfordítása adja az ötletet:

2.7.2. kérdés. Mikor lehet egy véges Blaschke-szorzatot két legalább elsőfokú Blaschke-szorzat kompozíciójaként felírni?

A foksámra való kikötés a triviális eseteket igyekszik kizárni, ezen esetekben nem kíván ilyen felbontást találni. Vegyük észre, hogy, ha  $B$  egy  $p$ -edfokú véges Blaschke-szorzat, ahol  $p$  prímszám, akkor  $B$  a 2.7.1 tétel miatt felbonthatatlan.

2.7.3. de nívó. Azt mondjuk, hogy egy  $B$  véges Blaschke-szorzat felbontható, ha  $B = B_1 B_2$ , ahol  $B_1$  és  $B_2$  legalább elsőfokú véges Blaschke-szorzatok.

Érdekes módon a kérdés általánosabban nehezebben megválaszolható. A karakterizációra több út is lehetséges, mi most egy olyan karakterizációt dolgozunk ki, amelyhez ismét találunk a polinomok témakörében is megfelelő tételket, az eszközök gondtalan használatához most azonban rendhagyó módon szükségünk lesz egy kitérőre.

### 2.7.1. Monodrómia-csoport

A monodrómia rendszerint akkor kerül elő a (komplex) függvénytanban, amikor egy adott függvény viselkedését szeretnénk megvizsgálni egy szingularitása körül. Ennek egy lehetséges algebrai topológia feléli útja az ún. monodrómia csoport vizsgálata. A monodrómia elméletének megalapozott tárgyalásához mélyebb algebrai topológiai apparátust kéne előzetesen felsorakoztatni, a dolgozathoz szükséges gondolatmenet megértéséhez azonban elég, ha ennél egy fokkal hevenyészettebben közelítünk a tárgyhoz, így azonban előfordulhat, hogy a bevezetés bizonyos részei "elkenődnek", ezek azonban mind precízzé tehetőek. Az ebben a fejezetben kimondott állítások és tételek zöme a dolgozat felépítése miatt csak kimondva szerepelnek.

2.7.4. de nívó.  $X; Y$  topologikus terek. Az  $H : X \rightarrow [0; 1] \rightarrow Y$  folytonos függvényt homotópiának nevezzük, és azt mondjuk, hogy  $H$  homotópia összeköti az  $H_0(x) = H(x; 0)$  függvényt  $H_1(x) = H(x; 1)$  függvénnyel. Ennek megfelelően két függvény homotóp, ha létezik őket összekötő homotópia.

Egy  $(X; x_0)$  párt, ahol  $X$  topologikus tér és  $x_0 \in X$ , pontozott térnek nevezzük. Illetve jelöljük  $F(X; x_0)$ -al az  $x_0$  kezdő- és végpontú hurkok (tehát az azonos kezdő- és végpontú  $[0; 1] \rightarrow X$  folytonos függvények/ utak) halmazát  $X$ -en. Két hurkot kötött homotópiának mondunk, ha létezik a két hurkot összekötő a végpontokon kötött homotópia, vagyis  $H_t(0) = H_t(1) = x_0$ , minden  $t \in [0; 1]$ -re. Könnyen meggondolható, hogy a végpontokon kötött homotópia egy ekvivalencia-relációt határoz meg  $F(X; x_0)$ -on. Az ekvivalenciaosztályokat homotópiaosztályoknak nevezzük. Egy  $\gamma \in F(X; x_0)$  hurok homotópiaosztályát  $[\gamma]$ -vel,  $F(X; x_0)$  homotópiaosztályait  $\pi_1(X; x_0)$ -al jelöljük. Ezen homotópiaosztályok között bevezethető egy szorzás, nevezetesen a hurkok "egymás után felírása":

2.7.5. de nívó. Ha  $f : [0; 1] \rightarrow X; g : [0; 1] \rightarrow X$  folytonos függvények (utak) és  $f(1) = g(0)$ , vagyis  $f$  út végpontja megegyezik  $g$  kezdőpontjával, akkor definiáljuk  $f$  és  $g$  utak  $f \cdot g$  szorzatát a következőképpen:

$$f \cdot g(t) = \begin{cases} f(2t) & \text{ha } 0 \leq t < \frac{1}{2} \\ g(2t - 1) & \text{ha } \frac{1}{2} \leq t \leq 1 \end{cases} \quad (2.7.3)$$

A hurkok nyilvánvalóan (azonos kezdő- és végpontú) utak, belátható, hogy az így megadott művelet jól definiált és szorzást határoz meg  $\pi_1(X; x_0)$ . Ennél több is igaz.

2.7.6. állítás.  $\pi_1(X; x_0)$  az imént definiált szorzással csoportot alkot, ezt a csoportot  $X$  tér ( $x_0$  kezdőpontú) fundamentális csoportjának nevezzük.

2.7.7. tétel. Ha  $X$  útszeríjen összefüggő, akkor bármely  $x^0 \in X$ -re  $\pi_1(X; x) = \pi_1(X; x^0)$ .

2.7.8. definíció.  $(E; e_0)$  és  $(B; b_0)$  pontozott topologikus terek adottak. Egy  $p : (E; e_0) \rightarrow (B; b_0)$  leképezés  $p$  fedésnek (vagy fedésnek) hívunk, ha minden  $b \in B$ -nek létezik olyan  $U \subset B$  nyílt környezete, hogy  $p^{-1}(U) = \bigcup_i V_i$  ( $V_i \subset E$  nyíltak diszjunkt uniója), továbbá minden  $i$ -re  $p|_{V_i} : V_i \rightarrow U$  homeomorfizmus.

Szerencsénkre teljesül a következő

2.7.9. állítás. Ha  $B$  összefüggő, akkor  $\pi_1(B)$  brum számossága (a rétegszám) mindig  $\leq$   $B$ -re megegyezik.

Maradjon a fedésünk továbbra  $p : (E; e_0) \rightarrow (B; b_0)$ . Ha most veszünk  $B$ -beli  $b_0$  kezdőpontú utakat (hurkokat), akkor természetesen felmerül, hogy hogyan tekinthetünk ezekre a  $E$  fedésében.

2.7.10. tétel (Fedés utak tétele)

- (1) Ha  $u$  egy  $b_0$  kezdőpontú út  $B$ -ben, akkor egyértelműen létezik olyan út  $E$ -ben, amelynek a kezdőpontja  $e_0$  és  $p \circ v = u$ . Ezt a  $v$ -t  $u$  felemeltjének hívjuk.
- (2) Ha  $v$  és  $v^0$  két  $e_0$  kezdőpontú út  $E$ -ben, és  $p \circ v$  és  $p \circ v^0$  homotóp a végpontokon kötött homotópiával, akkor  $v$  és  $v^0$  is.

2.7.11. megjegyzés. Ebből speciálisan azt kapjuk, hogy ebben az esetben  $v^0$  végpontjai is megegyeznek. Ez a tulajdonság később fontos lesz nekünk. Jelöljük egy tételbeli úthoz hasonló  $e_0$  kezdőpontú felemeltjét  $\tilde{u}_{e_0}$ -val.

A monodrómia bevezetése előtt szükségünk van egy-két csoportelméleti fogalom tisztázására is.

2.7.12. definíció (Csoportthatás). Azt mondjuk, hogy egy  $G$  csoport hat az  $X$  halmazon (vagy  $G$  transzformációcsoport  $X$ -en), ha adott egy  $X \rightarrow G$  leképezés, amit  $(x; g) \mapsto x \cdot g$ -ként írunk, és amelyre

$$(1) \text{ minden } x \in X \text{-re és } g_1, g_2 \in G \text{-re } (x \cdot g_1) \cdot g_2 = x \cdot (g_1 g_2)$$

$$(2) \text{ minden } x \in X \text{-re } x \cdot 1_G = x$$

teljesül.

2.7.13 megjegyzés. Valójában ezzel a jobbról hatást definiáltuk csak, azonban a  $g \cdot x = x \cdot g^{-1}$  összefüggés kanonikus módon megfeleltet egy jobboldali csoportthatást egy baloldalinak, és fordítva. Tehát az, hogy jobb- vagy baloldali csoportthatásról beszélünk, csupán ízlés dolga.

Jelöljük  $\cdot : X \rightarrow G \rightarrow X$ -val a csoportthatást. Vegyük észre, hogy rögzített  $g \in G$ -re, ha tekintjük az  $(x; g) \mapsto x$  hozzárendelést, mint  $g : X \rightarrow X$  leképezést, akkor egy bijekciót kapunk. Valóban, azt állítjuk, hogy  $g^{-1} = g^{-1}$ . Ez teljesül is, hiszen

$$g^{-1} \circ g(x) = (x \cdot g) g^{-1} \stackrel{(1)}{=} x \cdot (g g^{-1}) = x \cdot 1_G \stackrel{(2)}{=} x: \quad (2.7.4)$$

Tehát, ha  $\text{Sym}(X)$ -szel jelöljük,  $X$  szimmetrikus csoportját (vagyis az  $f: X \rightarrow X$  permutációk csoportját), akkor  $\rho: G \rightarrow \text{Sym}(X)$ , sőt homomorfizmus. Ha  $g_1, g_2 \in G$ , akkor

$$\rho_{g_1 g_2}(x) = x \circ (g_1 g_2) \stackrel{(1)}{=} (x \circ g_1) \circ g_2 = g_2 \circ g_1(x) \quad \forall x \in X; \quad (2.7.5)$$

azaz  $\text{Im } \rho$  részcsoportha  $\text{Sym}(X)$ -nek.

2.7.14. de nció.  $x \in X$ -re a  $x \cdot G = \{x \circ g : g \in G\}$  halmazt  $x$  orbitjának nevezzük, továbbá azt mondjuk, hogy egy csoporthatástranzitív, ha bármely  $x, y \in X$  pontnak az egész  $X$  az orbitja, vagyis, ha bármely  $x, y \in X$  párra létezik  $g \in G$ , hogy  $x \circ g = y$ .

A következő fogalomnak a polinomok és Blaschke-szorzatok felbonthatóságának karakterizációjakor döntő szerepe lesz.

2.7.15. de nció. Tegyük fel, hogy  $G$  csoport tranzitíven hat az  $X$  halmazon.  $\mathcal{A} \subseteq X$  imprimitív tartomány, ha  $\exists g \in G : (\mathcal{A} \circ g = \mathcal{A} \text{ vagy } (\mathcal{A} \circ g) \cap \mathcal{A} = \emptyset)$ , azaz ha  $\mathcal{A}$  különbözők szerinti képei  $X$  egy (azonos elemszámú részekből álló) partícióját adják. Nyilván  $\mathcal{A}$  ( $x \in X$ ) imprimitív tartomány, továbbá imprimitív tartomány képe is imprimitív tartomány.

2.7.16. de nció. Azt mondjuk, hogy egy  $G$  tranzitív csoporthatás  $X$ -en imprimitív, ha létezik  $\mathcal{A} \subseteq X$  nem triviális ( $\emptyset \subsetneq \mathcal{A} \subsetneq X$ ) imprimitív tartomány. Egy tranzitív csoporthatás primitív, ha nincs ilyen részhalmaz.

Most már tényleg készen állunk a monodrómia bevezetésére és ezt a gondolatmenet szempontjából fontos tételt be is bizonyítjuk.

2.7.17. tétel (Monodrómia). Tegyük fel, hogy  $p: E \rightarrow X$  fedés és  $x_0 \in X$ . Ekkor az  $e = [f] = f_e^{-1}(1)$  leképezéssel (ahol  $[f] \in \pi_1(X; x_0)$  és  $e \in p^{-1}(x_0)$ ) a  $\pi_1(X; x_0)$  fundamentális csoport (jobbról) hat a  $p^{-1}(x_0)$  brumon.

Bizonyítás. Először érdemes megvizsgálni, hogy értelmes-e egyáltalán a leképezés, amit megadtunk. A 2.7.10 tétel (1) része miatt tudjuk, hogy bármely  $X$ -beli  $x_0$  kezdőpontú huroknak egyértelműen létezik a fedőterében kezdőpontú  $f_e$  felemeltje. Abból, hogy  $f$  hurok, következik, hogy az  $f_e(1)$  végpont szintén  $p^{-1}(x_0)$ -beli lesz. A fedő utak tételének (2) része pedig biztosítja számunkra, hogy  $f_e(1)$  csak  $f$  homotópiaoszályától függ. Tehát az  $e = [f] = f_e^{-1}(1)$  leképezés valóban jól definiált.

Most már csak azt kell belátnunk, hogy  $e = [f] = f_e^{-1}(1)$  valóban csoporthatást definiál. Ehhez két tulajdonság teljesülése szükséges:

(1)  $e = [x_0] = e$ , ahol  $[x_0] \in \pi_1(X; x_0)$  konstans  $x_0$  függvény homotópiosztálya.

(2)  $e = [f] \circ [g] = e \circ ([f] \circ [g])$ , ahol  $[f], [g] \in \pi_1(X; x_0)$

Az (1) részhez vegyük észre, hogy a konstans  $x_0$  függvény  $e$  kezdőpontú felemeltje a konstans  $e$  függvény, tehát  $e = [x_0] = f_e^{-1}(1) = e$ .

Másrészt legyen  $[f] = e^0$ , ekkor  $e = [f] \circ [g] = f_e^{-1}(1)$ . De az is igaz, hogy  $f_e \circ f_e^{-1}$  éppen az  $f$  hurok  $e$  kezdőpontú felemeltje, tehát:

$$e \circ ([f] \circ [g]) = e \circ ([f] \circ [g]) = (f_e \circ f_e^{-1})(1) = f_e^{-1}(1) = e = ([f] \circ [g]); \quad (2.7.6)$$

amivel a tételt bebizonyítottuk. □

2.7.18. de nció. A 2.7.17 tételben definiált csoporthatást monodrómiaának (vagy monodrómiahatásnak) nevezzük.

2.7.19. de nıcıó. A monodrómia által indukált  $\pi_1(X; x_0) \cong \text{Sym}(p^{-1}(x_0))$  homomorfizmus képét  $p$  fedés  $x_0$ -beli monodrómia-csoportjának nevezzük.

A következı egyszerű állításra a késıbbiekben még szükségünk lesz.

2.7.20. állítás. Ha  $E$  útszerıen össze ügö, akkor a monodrómia tranzitív.

Bizonyítás. Tegyük fel, hogy  $e \in p^{-1}(x_0)$ .  $E$  útszerı összefüggése miatt létezik egyút, hogy  $u(0) = e$  és  $u(1) = e^0$ . Ekkor az  $f = p \circ u$  egy  $x_0$  kezdıpontú hurok  $X$ -ben, aminek aze kezdıpontú felemeltjeu. Vagyis:

$$e [f] = u(1) = e^0, \quad (2.7.7)$$

ezzel beláttuk a tranzitivitást. □

## 2.7.2. Polinomok faktorizációs tételei

Egy nem-lineáris  $p$  komplex polinomról azt mondjuk, hogy összetett ha felírható  $p = q \circ r$  alakban, ahol  $q, r$  legalább elsőfokú komplex polinomok. Ha nem létezik ilyen felbontás, akkor szokás prím-nek is hívni (nem összekeverendı a polinomok számelméletében elıforduló tulajdonsággal). Világos, hogy egy adott polinom felbontható prímek kompozíciójára, ezt a felbontást prím faktorizációnak hívjuk, és egy prím faktorizációban szereplı prímek számát a polinom hosszának látjuk, hogy értelmes a hossz a polinom faktorizációja által nem megkülönböztetett megnevezése.

Most az elıbbi alfejezetben felvonultatott elméletet szeretnénk a polinomok konkrét esetében értelmezni. Vegyük észre, hogy, mivel polinom egy egészfüggvény, ezért a lokális injektivitás tétele miatt a kritikus pontokat leszámítva (amelyekben egyn-edfokú polinom esetében  $n-1$  darab van)  $p^{-1}$  lokálisan létezik (ráadásul holomorf). Legyen  $C_p = \{f \circ p(z) : p(z) = 0\}$  (ez a 2.3.3 tétel miatt legfeljebb  $n-1$  elem). Azt állítom, hogy  $p : p^{-1}(C_n C_p) \rightarrow C_n C_p$  egy fedıleképezés lesz. Vegyünk egy  $C_n C_p$  elemet, a 2.3.3 tétel miatt  $p^{-1}(w) = \{z_1, z_2, \dots, z_n\}$  és válasszuk meg  $V_i$ -k környezetét úgy, hogy  $V_i \cap V_j = \emptyset$ , ha  $i \neq j$  és  $p|_{V_i} : V_i \rightarrow U_i$  homeomorf leképezés, ahol  $U_i$   $w$  egy környezete (a lokális inverz létezése miatt ezt megtehetjük, sőt még úgy is, hogy lokálisan diffeomorf legyen). Legyen  $X = \bigcup_{i=1}^n V_i$  és  $U = \bigcup_{i=1}^n U_i \subset p(X)$ , ekkor  $X$  zárt halmaz, ezért a nyílt leképezések tétele miatt  $p|_X$  is zárt, tehát  $U = \bigcup_{i=1}^n U_i \subset p(X) = \overline{\bigcup_{i=1}^n U_i} \subset p(X)$  nyílt és  $w \in U$ . Ekkor belátható, hogy  $p^{-1}(U) = \bigcup_{i=1}^n (V_i \cap p^{-1}(U))$  és  $p$  homeomorf módon képez  $V_i \cap p^{-1}(U)$ -t  $U$ -ra. Vagyis  $p : p^{-1}(C_n C_p) \rightarrow C_n C_p$  valóban egy fedés. Másrészt, mivel  $p^{-1}(C_n C_p)$  és  $C_n C_p$  útszerıen összefüggı, ezért beszélhetünk egy polinom tranzitív monodrómia-csoportjáról.

Ezek után megfogalmazzuk azt a nevezetes tételt a komplex polinomok körében, amelynek analogonját fogjuk késıbb bizonyítani a véges Blaschke-szorzatokra. Ezt a tételt J. F. Ritt amerikai matematikus dolgozta ki 1922-ben, ezért hagyományosan Ritt-tételnek hívják.

2.7.21. tétel (Ritt). Egy nem-lineáris komplex polinom akkor és csak akkor összetett, ha a polinom monodrómia-csoportja imprimitív.

A következı két tételt Ritt ugyanebben a cikkében bizonyította, ezeknek a Blaschke-szorzatok elméletében érvényes megfelelıit nem fogjuk belátni, mert a dolgozat kereteit meghaladná, azonban a fejezet végén majd azokról is említést teszünk.

2.7.22. tétel. Egy nem-lineáris komplex polinom hossza független a prím faktorizációjától.

2.7.23. de nícío. Az (els@fajú) n-edfokú Csebisev-polinomok alatt a következ@ összefüggéssel de niált komplex függvényeket értjük:

$$T_n(z) = \cos n ; \text{ ahol } z = \cos : \quad (2.7.8)$$

Más szóval:

$$T_n(z) = \cos(n \arccos z) \quad (2.7.9)$$

2.7.24. tétel. Ha adott két prím faktorizációja egy nem-lineáris komplex polinomnak, akkor áttérhetünk az egyik faktorizációról a másikra a következ@ operációk használatával:

1.  $p_1 p_2 = (p_1 q) (q^{-1} p_2)$ , ahol  $p_1, p_2$  polinomok,  $q$  pedig lineáris polinom.
2.  $T_m T_n = T_n T_m$ , ahol  $T_k$  k-adfokú Csebisev-polinomok.
3.  $z^n (p(z))^m z^m = z^m (z^n p(z^m))$ , ahol  $m; n \in \mathbb{N}$  és  $p$  polinom.

A következ@kben a Ritt-tétel Blaschke-szorzatokra vonatkozó megfeleléjét fogjuk belátni. Ez azonban hosszabb el@készületet igényel.

### 2.7.3. Blaschke-szorzatok faktorizációs tételei

Adott tehát a 2.7.2 kérdés: mikor lehet egy véges Blaschke-szorzatot nem triviális módon Blaschke-szorzatok kompozíciójaként felírni? A segítséget a válaszhoz a monodrómia-csoport vizsgálata nyújtja, és ahogy várjuk a Ritt-tételekhez hasonló karakterizációt tudunk itt is megadni.

2.7.25. de nícío. Azt mondjuk, hogy egy n-edfokú B véges Blaschke-szorzat normalizált, ha megadható az

$$B(z) = z \prod_{i=2}^n \frac{\bar{b}_i - b_i z}{|b_i| (1 - \bar{b}_i z)} \quad (2.7.10)$$

alakban, ahol  $b_i \in D$  minden  $2 \leq i \leq n$  egészre és  $b_i \neq b_j$ , ha  $i \neq j$ .

Vegyük észre, hogy a de nícióban megadott feltételek ekvivalensek a következ@kkel:

$$B(0) = 0 ; \quad B'(z) > 0 ; \quad B(a) = 0 \Rightarrow B'(a) \neq 0 : \quad (2.7.11)$$

Valóban, az els@ tulajdonság következik a tényezőkből, az utolsó pedig a gyökök különbözőségéből. A középsőhöz vegyük a deriváltat.

$$B'(z) = z \prod_{i=2}^n \frac{\bar{b}_i - b_i z}{|b_i| (1 - \bar{b}_i z)} + \sum_{i=2}^n \frac{\bar{b}_i - b_i z}{|b_i| (1 - \bar{b}_i z)} : \quad (2.7.12)$$

Ebből következik, hogy

$$B'(0) = \sum_{i=2}^n \frac{\bar{b}_i}{|b_i|} ; \quad (2.7.13)$$

ahol  $|b_i| \neq 0$  minden  $i$ -re, vagyis  $B'(0) > 0$ . Másrészt mindhárom feltétel teljesülése esetén hasonló megfontolással látszik, hogy a vizsgált Blaschke-szorzat valóban normalizált.

A felbonthatóságról szóló tételt ilyen normalizált Blaschke-szorzatokra fogjuk kimondani, ezért szükségünk van a következ@ állításra:

2.7.26. állítás. Ha  $B$  egy véges Blaschke-szorzat, akkor léteznek olyan  $a_2 \in D$ ,  $a_1 \in T$  komplex számok, hogy  $\mathcal{B} = (a_2, B, a_1)$  egy normalizált véges Blaschke-szorzat. Továbbá akkor és csak akkor bontható fel, ha  $\mathcal{B}$  is.

Bizonyítás. Jelöljük a  $B$   $n$ -edfokú véges Blaschke-szorzat kritikus pontjainak halmazát  $C_B$ -vel. Tehát

$$C_B = \{z : B'(z) = 0\} \quad (2.7.14)$$

A 2.5.3 tétel miatt  $n - 1$  kritikus pont van (multiplicitással számolva), azonban annyi is elég, hogy  $C_B$  véges elemszámú, ekkor ugyanis könnyen találunk egy  $z \in C_B$  elemet, amire ezek után, a 2.3.4 tétel miatt

$$B^{-1}(f w) = \{z_1, z_2, \dots, z_n\} \quad (2.7.15)$$

és  $w$  megválasztása miatt

$$B(z_i) = w \quad B'(z_i) \neq 0 \quad (i = 1, \dots, n): \quad (2.7.16)$$

Válasszuk  $z_1$ -et  $a_1$ -nek,  $w$ -t  $a_2$ -nek. A továbbiakban  $D$ -t szeretnénk megadni és belátni a normalizált Blaschke-szorzatokhoz szükséges tulajdonságokat. Legyen tehát

$$\mathcal{B} = (a_2, B, a_1): \quad (2.7.17)$$

Figyeljük meg, hogy a 2.4.3 megjegyzésből adódóan szintén egy  $n$ -edfokú véges Blaschke-szorzat, hiszen két  $\text{Aut}(D)$ -beli függvénnyel van komponálva.

Mivel  $B(a_1) = a_2$ , ezért

$$\mathcal{B}'(a_1) = \frac{a_2 B'(a_1)}{1 - \overline{a_2} B'(a_1)} = 0; \quad (2.7.18)$$

hiszen ne felejtjük:  $B(a_1) = a_2$ . Ezzel a normalizált Blaschke-szorzat első feltétele teljesül. A második feltételhez írjuk fel  $\mathcal{B}$  deriváltját a láncszabály és a hányados deriválási szabályának segítségével:

$$\begin{aligned} \mathcal{B}'(a_1) &= \frac{B'(a_1) \frac{0}{a_1} (1 - \overline{a_2} B'(a_1)) + \overline{a_2} B'(a_1) \frac{0}{a_1} (a_2 - B'(a_1))}{(1 - \overline{a_2} B'(a_1))^2} = \\ &= \frac{B'(a_1) \frac{0}{a_1} (j a_2 j^2 - 1)}{(1 - \overline{a_2} B'(a_1))^2} \end{aligned} \quad (2.7.19)$$

Felhasználva, hogy

$$\frac{0}{a_1}(z) = \frac{j a_1 j^2 - 1}{(1 - \overline{a_1} z)^2} \quad (2.7.20)$$

behelyettesíthetjük a  $z = 0$  értéket a  $\mathcal{B}'$ -ra kapott kifejezésbe.

$$\mathcal{B}'(0) = \frac{B'(a_1)(j a_1 j^2 - 1)(j a_2 j^2 - 1)}{(1 - \overline{a_2} B'(a_1))^2} = \frac{B'(a_1)(j a_1 j^2 - 1)}{j a_2 j^2 - 1} \quad (2.7.21)$$

$B'(a_1) \neq 0$ , ezért  $\mathcal{B}'(0) \neq 0$ . Így  $\mathcal{B}$ -t meg tudjuk úgy választani, hogy a második feltétel, azaz  $\mathcal{B}'(0) > 0$  teljesüljön.

$B$  és  $\mathcal{B}$  de nícója miatt látjuk, hogy  $\mathcal{B}$  gyökei a

$$B^{-1}(f z_1, z_2, \dots, z_n) = \{z_1, z_2, \dots, z_n\} \quad (2.7.22)$$

számok, ahol  $a_i \neq 0$ . A fent kapott kifejezésbe  $z = a_i$ -t behelyettesítve kapjuk, hogy

$$\begin{aligned} B^0(a_i) &= \frac{B^0(a_i)(|a_1|^2 - 1)(|a_2|^2 - 1)}{(1 - \bar{a}_1 a_i)^2 (1 - \bar{a}_2 a_i)^2} = \frac{B^0(a_i)(|a_1|^2 - 1)}{(1 - \bar{a}_1 a_i)^2 (|a_2|^2 - 1)} = \\ &= \frac{B^0(a_i)(|a_1|^2 - 1)}{(1 - \bar{a}_1 a_i)^2 (|a_2|^2 - 1)} \neq 0; \end{aligned} \quad (2.7.23)$$

hiszen  $B^0(a_i) \neq 0$ . Ezzel azt kapjuk, hogy a 2.7.11 utolsó feltétele is teljesül, tehát  $B$  valóban  $n$ -edfokú normalizált véges Blaschke-szorzat.

Már csak az van hátra, hogy belássuk, a felbonthatóság szempontjából mindegy, hogy az eredeti vagy a normalizált Blaschke-szorzatot tekintjük. Ehhez általánosabban vegyünk két;  $B_1, B_2 \in \mathcal{B}(D)$  függvényt és  $B_1, B_2$  véges Blaschke-szorzatot, úgy, hogy

$$B_1 = B_2 \quad (2.7.24)$$

Ekkor, ha  $B_2$  felbontható, tehát  $B_2 = C \cdot D$ , ahol  $C, D$  nem triviális véges Blaschke-szorzatok, akkor a kompozíció asszociativitásából

$$B_1 = (C \cdot D) \quad (2.7.25)$$

A 2.4.3 megjegyzés miatt mind  $C$ , mind  $D$  rendre egydeg  $C$  és  $D$  fokú véges Blaschke-szorzat. Tehát speciálisan, ha  $B_1 = B_2$ ;  $B_2 = B$ , igaz, hogy  $B$  akkor és csak akkor felbontható, ha  $B_1$  is az.  $\square$

Vagyis, ha csak arra vagyunk kíváncsiak, hogy egy véges Blaschke-szorzat felbontható-e vagy sem, akkor mindegy, hogy egy normalizált vagy nem normalizált Blaschke-szorzatot tekintünk.

Ezek után tehát vegyünk egy  $n$ -edfokú véges Blaschke-szorzatot, immár normalizált formában és jelöljük a

$$C_B = f \cdot c : B(z) = c; B^0(z) = 0 \quad (2.7.26)$$

kritikus értékek (tehát a kritikus pontok  $B$  szerinti képét) halmazát  $C_B$ -vel. Világos, hogy  $C_B$ -nek  $n - 1$  eleme van  $D$ -ben (2.5.3 tétel). Másrészt a 2.3.4 tétel miatt  $B^{-1}(C_B)$  legfeljebb  $n(n - 1)$   $D$ -beli pontot tartalmaz. A komplex polinomokhoz hasonlóan azt állítjuk, hogy

$$B : D \setminus B^{-1}(C_B) \rightarrow D \setminus C_B \quad (2.7.27)$$

egy fedésképezés. Ez ismét könnyen igazolható, hiszen a lokális injektivitás tétele miatt  $D \setminus C_B$  halmazon létezik a  $B^{-1}$ , ráadásul holomorf. A 2.3.4 tétel miatt a rétegszám minden  $D$ -beli pontban  $n$ , így bármely  $z \in D \setminus C_B$  pont egy  $U \subset D \setminus C_B$  környezetére

$$B^{-1}(U) = \bigcup_{i=1}^n V_i; \quad \text{ahol } V_i \subset D \setminus B^{-1}(C_B) \text{ nyílt}; \quad (2.7.28)$$

továbbá bármely  $i$ -re a

$$B|_{V_i} : V_i \rightarrow U \text{ homeomorfizmus} \quad (2.7.29)$$

a lokális injektivitás tétele miatt.

Azaz beszélhetünk itt is  $B$  monodrómia-csoportjáról. Most ezt fogjuk közelebbről megvizsgálni és kicsit más kontextusba bújtatni. Mivel  $B$  normalizált, ezért  $0 \in D \setminus C_B$ , tehát létezik  $0$ -nak olyan  $U$  környezete, ahol  $B^{-1}$ -nek megadhatón folytonos (sőt holomorf!) ága. A fenti jelölésekkel, ha  $B^{-1}(U) = \bigcup_{i=1}^n V_i$ , akkor legyen

$$B^{-1}|_U = g_i : U \rightarrow V_i \quad i = 1; 2; \dots; n \quad (2.7.30)$$

az  $n$  darab folytonos ág. A normalizáltság miatt azt is feltehetjük, hogy  $g_1(0) = 0$  és ekkor mindig a  $0$ -hoz egy  $B^{-1}(f(0))$  brumbeli elemet rendel és  $g_i(0) \in g_j(0)$ , ha  $i \in j$ .

$B \setminus 0$  pontbeli monodrómia-csoportját szeretnénk feltérképezni, vizsgáljuk meg, hogy hogyan hat a  $\pi_1(D \setminus C_B)$  fundamentális csoport (a 2.7.7 tétel miatt mindegy milyen kezdőpontú hurkok homotópiaosztályait tekintjük) a  $B^{-1}(f(0))$  brumon. Mit jelent tehát ebben az esetben a  $e \in \pi_1(B \setminus 0)$  mŕvelet (ahol  $e \in B^{-1}(f(0))$  és  $\pi_1(B \setminus 0) \cong \pi_1(D \setminus C_B)$ )? Emlékezzünk, hogy  $e$ -vel jelöltük a kezdőpontú felemeltjét és a szorzást  $e \cdot [ ] = e(1)$ -ként határoztuk meg. Vegyük észre, hogy ez a mŕvelet ebben az esetben felfogható úgy, hogy tekintjük  $B^{-1}$ -nek azt a  $g_i$  folytonos ágát, amelyre teljesül, hogy  $g_i(0) = e$  és  $g_i$ -t analitikusan folytatjuk a út mentén, majd azt az értéket tekintjük, amelyet  $g_i$  analitikusan folytatva a végpontjában felvesz. Tisztázzuk, mit is értünk analitikus folytatáson.

2.7.27. de nŕció. Legyen  $f_1$  holomorf  $D_1$  tartományon. Azt mondjuk, hogy  $f_2$  az  $f_1$  analitikus folytatása  $D_2$  tartományra (ahol  $D_1 \setminus D_2 \neq \emptyset$ ), ha  $f_2$  holomorf  $D_2$ -n és  $f_1 = f_2|_{D_1 \setminus D_2}$ .

Vegyük észre, hogy ha létezik ilyen  $f_2$ , akkor az unicitás tétel értelmében egyértelmű. Az analitikus folytatás megadása egy út mentén egy technikailag kissé nehézkes de nŕciót igényel, azonban a mögöttes tartalom nagyon egyszerű.

2.7.28. de nŕció. Legyen  $\gamma : [0; 1] \rightarrow C$  út,  $0 = t_0 < t_1 < t_2 < \dots < t_{n+1} = 1$ , a  $[0; 1]$  egy felosztása és ehhez egy  $D_0; D_1; \dots; D_n$  nyílt környezetekből álló sorozat olyan, hogy  $([t_i; t_{i+1}]) \subset D_i$ . (Ekkor  $(t_{i+1})^2 \subset D_i \setminus D_{i+1}$ .) Azt mondjuk, hogy egy  $f_0$   $D_0$ -on holomorf függvény  $f$   $D_i$ -g sorozat mentén vett analitikus folytatása az  $f_0; f_1; \dots; f_n$  sorozat, ha bármely  $0 \leq i < n$  egészre  $f_i$  holomorf  $D_i$ -n és  $f_{i+1}$  az  $f_i$  analitikus folytatása a  $D_{i+1}$ -re.

Könnyen látható, hogy az adott görbéhez tartozó sorozat mentén vett analitikus folytatás nem függ a felosztás és környezetek megválasztásától. Így  $f_0$  analitikus folytatásával egyértelműen kapunk egy a  $(1)$  környezetében holomorf függvényt.

2.7.29. de nŕció. Legyen  $f_0$  holomorf  $D_0$ -on, út  $\gamma \subset (0) \subset D_0$ , ekkor  $f_0$  analitikus folytatása a út mentén az az  $f \in (1)$  környezetében) holomorf függvény, amely egy  $D_0; D_1; \dots; D_n$  g sorozat mentén  $f_0$  analitikus folytatásának  $(1)$  környezetében megadott eleme.

$f$  nem csak, hogy az  $f \in D_0; D_1; \dots; D_n$  g sorozat megválasztásától, de a 2.7.10 fedő utak tétele miatt homotópiaosztályából vett reprezentáns megválasztásától sem függ, tehát a korábbi fejtegetéseink valóban megállják a helyüket. Visszatérve tehát most már az új jelölést használva azt kaptuk, hogy

$$e \cdot [ ] = (g_i) \cdot (1); \text{ ahol } g_i(0) = e: \tag{2.7.31}$$

Vegyük észre, hogy mivel  $g_i$  mentén vett analitikus folytatása (azaz  $(g_i)$ ) egy a  $0$  környezetéből a  $e \in B^{-1}(f(0))$  környezetébe képező holomorf függvény, ezért

$$(g_i) \subset f \cdot g_1; g_2; \dots; g_n; \tag{2.7.32}$$

ahogyan vártuk. Tehát végtére is a monodrómia-csoportot felfoghatjuk úgy is, mint  $S_n$  egy  $f \cdot g_1; \dots; g_n$  g halmazt permutáló részcsoportját. Jelöljük a továbbiakban  $G_B$ -vel egy  $B$  Blaschke-szorzat monodrómia-csoportját.

Most rátérünk a fejezet fő tételére, aminek analogonjával már találkoztunk a polinomok faktorizációjáról szóló részben.



2.7.30. tétel. Legyen  $B$  egy normalizált véges Blaschke-szorzat akkor és csak akkor felbontható, ha  $B$  monodrómia-csoportja  $G_B$  imprimitív.

Bizonyítás. Tegyük fel először, hogy  $G_B$  imprimitíven hat  $B^{-1}(0)$ -beli  $f, g_1, g_2, \dots, g_n$  folytonos ágainak halmazán. Ez azt jelenti, hogy létezik olyan  $f, g_1, g_2, \dots, g_n$ , hogy  $G_B$  szerinti képei egy egyenlő részekből álló partícióját adják  $f, g_1, g_2, \dots, g_n$ -nek. Ha a részek elemszáma  $n = km$ , akkor szükség esetén  $g$ -ket újrászámozva jelöljük a partíciót a következőképpen:

$$\begin{aligned} P_1 &= f, g_1, g_2, \dots, g_m, g; \\ P_2 &= f, g_{m+1}, g_{m+2}, \dots, g_{2m}, g; \\ &\vdots \\ P_k &= f, g_{(k-1)m+1}, g_{(k-1)m+2}, \dots, g_{km}, g. \end{aligned}$$

Jelölje ismét  $C_B$   $B$  kritikus értékeinek halmazát. Mivel  $B(D \setminus B^{-1}(C_B)) = D \setminus C_B$  és  $g$  analitikusan folytatható  $D \setminus C_B$  bármely nyílt halmazára, ezért a  $g$   $B$  függvény analitikusan folytatható  $D \setminus B^{-1}(C_B)$  bármely nyílt részhalmazára.

A következő függvény  $D \setminus B^{-1}(C_B)$  egy környezetében van értelmezve:

$$D(z) = z \prod_{i=2}^n \frac{\overline{g_i(0)}}{|g_i(0)|} g_i(B(z)) \quad (2.7.33)$$

$B$  normalizáltsága és  $g_1(0) = 0$  miatt  $g_1(B(0)) = 0$ , ráadásul  $(B \circ g_1^{-1})(z) = B(z)$  a  $0$  egy környezetében, ezért  $g_1(B(z)) = z$ . Így átírhatjuk  $D$ -t a következő alakra:

$$D(z) = g_1(B(z)) \prod_{i=2}^n \frac{\overline{g_i(0)}}{|g_i(0)|} g_i(B(z)) \quad (2.7.34)$$

Látjuk, hogy ebben az alakban már csak  $g_i \circ B$  alakú ( $i = 1, \dots, n$ ) függvények szorzata szerepel, így  $D(z)$  is analitikusan folytatható tetszőleges  $D \setminus B^{-1}(C_B)$ -beli tartományra. Vegyünk egy  $0$  kezdőpontú hurkot  $D \setminus B^{-1}(C_B)$ -ben és legyen  $\gamma = B \circ e$ , ekkor  $\gamma$  egy  $D \setminus C_B$ -beli szintén  $0$  kezdőpontú hurok.  $0 \leq t \leq 1$  a de nívó szerint, vagyis  $(g_1 \circ B) \circ e = g_1$ , ezért mivel  $P_1$  imprimitív tartomány, egy  $P_1$ -beli ág mentén vett analitikus folytatása szükségszerűen  $P_1$ -beli. Mit jelent ez a  $D$  függvényünkre nézve? Vegyük észre, hogy  $D$   $e$  mentén vett analitikus folytatása lényegében ugyanaz, mintha

$$g_1(w) \prod_{i=2}^n \frac{\overline{g_i(0)}}{|g_i(0)|} g_i(w) \quad (2.7.35)$$

$e$  mentén vett analitikus folytatását tekintenénk. A fenti megállapításaink érvényében tehát  $D$  tetszőleges  $0$  kezdőpontú  $e$  hurok mentén vett analitikus folytatása legfeljebb csak a tényezőket cseréli fel. Ez azt jelenti, hogy  $D$  a  $0$  egy környezetében egyértelmű (minden ponthoz egy értéket rendel), így mivel analitikusan folytatható tetszőleges  $D \setminus B^{-1}(C_B)$ -beli tartományra, ezért  $D$  egyértelmű nem csak a  $0$  egy környezetében, de az egész  $D \setminus B^{-1}(C_B)$ -n is.  $|D| < 1$  minden  $D \setminus B^{-1}(C_B)$ -beli ponton,  $B^{-1}(C_B)$  egy véges halmaz, tehát  $D$  egy holomorf függvényt határoz meg  $D$ -n is. Figyeljük meg, hogy mindaz, amit eddig elmondtunk  $D$ -re, nemcsak  $D$ -n, de  $\bar{D}$  egy kis környezetére is elmondható (vigyázzunk arra, hogy elkerüljük  $B$  pólusait), tehát  $D$  holomorf  $\bar{D}$  egy kis környezetében. Speciálisan  $D$  holomorf  $T$ -n is és  $D(T) = T$ , hiszen  $|g_i(B^{-1}(0))| = 1$ ;  $8 \leq 2 \leq T$ . A 2.2.4 következmény miatt  $D$  egy véges Blaschke-szorzat.

Ezek után a következő egyenlőségek teljesülését fogjuk belátni:

$$\begin{aligned} D(g_1(0)) &= D(g_2(0)) = \dots = D(g_m(0)) = 0; \\ D(g_{m+1}(0)) &= D(g_{m+2}(0)) = \dots = D(g_{2m}(0)); \\ &\vdots \\ D(g_{(k-1)m+1}(0)) &= D(g_{(k-1)m+2}(0)) = \dots = D(g_{mk}(0)); \end{aligned}$$

Ezt azzal fogjuk igazolni, hogy megmutatjuk

$$D(g_{m+j}(0)) = \prod_{i=2}^n \frac{\overline{g_i(0)}}{|g_i(0)|} \prod_{i=1}^n |g_{m+i}| \quad (2.7.36)$$

teljesül. Vegyük észre, hogy a fenti egyenlőség jobb oldala nem függől, tehát az igazolandó egyenlőség rendszer soraiban szereplő kifejezések egyenlősége automatikusan adódik. Az pedig, hogy ezenkívül az első  $n$  gyökeket tartalmazza következik abból, hogy  $D(g_1(0)) = D(0) = 0$ , másrészt, az, hogy csak ezek  $D$  gyökei,  $D$  alakjából látszik, hiszen egyedül  $g_1$  azon ága  $B^{-1}$ -nek, amely felveszi a 0 értéket és tudjuk, hogy  $P_1$  imprimitivitási tartomány.

Most igazoljuk az (2.7.36) alakot,  $D(g_{m+j}(0))$ -re. Legyen  $\gamma$  egy olyan hurok  $D \cap C_B$ -ben, hogy

$$(g_1) = g_{m+j} : \quad (2.7.37)$$

Ennek létezését az 2.7.20 állítás biztosítja nekünk. Jelöljük  $\gamma$ -mal szokásos módon 0 kezdőpontú  $B$  szerinti felemeltjét. De néció szerint:  $g_{m+j}(0) = e(1)$ . Ez tehát azt jelenti, hogy  $D(g_{m+j}(0))$  a  $\gamma$  mentén vett analitikus folytatása  $D$ -nek. Azonban tudjuk, hogy minden  $P_i$  imprimitivitási tartomány, vagyis egy tetszőleges  $i$   $k$ -ra  $P_i$  elemeinek  $\gamma$  mentén vett analitikus folytatásai vagy mind  $P_i$ -beliek vagy mind  $P_j$ -beliek, ahol  $1 \leq j \leq i \leq k$ . Speciálisan, ha  $(g_1) = g_{m+j}$ , akkor  $f_{g_1; g_2; \dots; g_m}$  mentén vett analitikus folytatásai  $P_1$ -beliek. Tehát visszatekintve  $D$  eredeti (2.7.33) meghatározására,

$$D(g_{m+j}(0)) = \prod_{i=2}^n \frac{\overline{g_i(0)}}{|g_i(0)|} \prod_{i=1}^n |g_{m+i}| \quad (2.7.38)$$

valóban teljesül.

Most érkezünk el a bizonyítás vissza  $(\ )$  irányának végéhez. Ugyanis vegyük azt  $k$ -ad fokú  $C$  véges Blaschke-szorzatot, amely gyökei

$$0 = D(g_1); D(g_{m+1}); \dots; D(g_{(k-1)m+1}); \quad (2.7.39)$$

és teljesül  $C^0(0) > 0$ . Ez már egyértelműen meghatározza  $C$ -t, hiszen  $C(z) = z \prod_{i=2}^k \frac{c_i - z}{1 - \overline{c_i} z}$ , ezért

$$C^0(z) = z \prod_{i=2}^k \frac{c_i - z}{1 - \overline{c_i} z} + \prod_{i=2}^k \frac{c_i - z}{1 - \overline{c_i} z} \quad (2.7.40)$$

$z = 0$ -át behelyettesítve kapjuk, hogy

$$\prod_{i=2}^k c_i > 0; \quad (2.7.41)$$

amely a  $\prod_{i=2}^k T$ -t már egyértelműen meghatározza. Bebizonyítottuk korábban, hogy  $D$  egy  $m$ -ed fokú Blaschke-szorzat  $g_1(0); g_2(0); \dots; g_m(0)$  gyökökkel, és a fenti (2.7.40) számolást használva látszik, hogy

$$D^0(0) = \prod_{i=2}^n \frac{\overline{g_i(0)}}{|g_i(0)|} g_i(B(0)) = \prod_{i=2}^n |g_i(0)| > 0; \quad (2.7.42)$$

A 2.7.1 tétel miatt  $C \cdot D$  egy  $m_k = n$ -edfokú véges Blaschke-szorzat, amelynek a gyökei

$$g_1(0); g_2(0); \dots; g_n(0) \quad (2.7.43)$$

és a láncszabály miatt  $(C \cdot D)^0(0) = C^0(D(0))D^0(0) > 0$ . Azt kaptuk, hogy  $C \cdot D$  gyökei megegyeznek  $B$  gyökeivel, ráadásul  $(C \cdot D)^0(0) > 0$  miatt a konstans szorzók is azonosak, tehát  $C \cdot D = B$ .

Ezek után üdítően egyszerű lesz az  $(*)$  irányú bizonyítása. Tegyük fel, hogy  $B = C \cdot D$ , ahol  $C; D$  két legalább elsőfokú véges Blaschke-szorzat és legyen ismét  $g_1; g_2; \dots; g_n \in \mathbb{B}^{-1}$  folytonos ágai a  $0$  környezetében. Látjuk, hogy ekkor bármely  $g_j$ -re  $D \cdot g_j$  a  $0$  környezetében  $\mathbb{B}^{-1}$  folytonos ága. Most adjunk meg egy imprimitív tartományt, legyen

$$4 = \{g_j; 1 \leq j \leq n\} : D \cdot g_j = D \cdot g_1 \quad (2.7.44)$$

Ez valóban imprimitív tartomány, hiszen tetszőleges hurokra  $D \in C_B - b$

$$(g_j) = (g_j) \cap D \quad (g_j) = D \cdot (g_j) : \quad (2.7.45)$$

Másrészt  $4$  nem triviális részhalmaza  $\{g_1; g_2; \dots; g_n\}$ -nek, hiszen, ha az lenne, akkor vagy  $C$  vagy  $D$  nulladfokú, ami ellentmondás. Ezzel beláttuk, hogy  $C_B$  valóban imprimitív.  $\square$

Vegyük észre, hogy a hosszadalmasabb bizonyítás meghozta a gyümölcsét, ugyanis egy felbontható Blaschke-szorzat esetén megadta az eljárást ahhoz is, hogy megtaláljuk egy felbontását.

2.7.31. megjegyzés. Ha a monodrómia-csoport imprimitív tartományának rendje prím, akkor 2.7.1 tétel miatt a bizonyításbeli felbontás során adódó  $D$  tovább nem bontható. Hasonló mondható  $e(C - r)$ , ha a különböző imprimitív tartományok száma prím.

Ahogy ígértem, most megemlítjük bizonyítás nélkül a másik két (2.7.22 és 2.7.24) Ritt-tétel Blaschke-szorzatokra vonatkozó megfelelőjét. A polinomokhoz hasonlóan most prím faktorizációnak nevezzük egy véges Blaschke-szorzat olyan (nem triviális) felbontását véges Blaschke-szorzatokra, amely felbontásban szereplő Blaschke-szorzatok már nem bonthatók tovább. Egy véges Blaschke-szorzat hosszának mondjuk egy prím faktorizációjában szereplő Blaschke-szorzatok számát. Értelmes a különböző faktorizációk szerint nem megkülönböztetett megnevezés, ugyanis igaz a következő

2.7.32. tétel. Egy véges Blaschke-szorzat hossza nem függ a prím faktorizációjától.

Végül álljon itt a harmadik 2.7.24 tétel egységkörlemezbeli változata.

2.7.33. tétel. Ha adott egy (legalább másodfokú) véges Blaschke-szorzat két prím faktorizációja, akkor az egyikre átérhetünk a másodikra a következő operációk ismételt alkalmazásával:

1.  $B_1 \cdot B_2 = (B_1 \cdot \alpha) \cdot (\alpha^{-1} \cdot B_2)$ , ahol  $B_1; B_2$  véges Blaschke-szorzatok, pedig egy Möbius-transzformáció,

2.  $b_{m;n} \cdot b_n = b_{n;m} \cdot b_m$ , ahol  $b_n$  az úgynevezett  $n$ -edfokú Csebisev-Blaschke-szorzat,

3.  $z^n (B_0(z))^m \cdot z^m = z^m (z^n B_0(z^m))$ , ahol  $B_0$  véges Blaschke-szorzat;  $n \geq 2 \in \mathbb{N}$ .

A tétel kimondásával egyben ismét vétünk a precizitás ellen, hiszen előzetesen még nem beszéltünk eddig a Csebisev-Blaschke-szorzatokról. A gondosság kárára most is kibújunk ezelő feladat elől, ugyanis ezen függvények bevezetése igen körülményes. Egyfelől meg lehet közelíteni a Jacobi elliptikus függvények felől, másfelől közvetlenül a Csebisev-Blaschke-szorzatok monodrómia tulajdonságain keresztül is be lehet őket vezetni. Ami a tétel szempontjából fontos tulajdonsága ezeknek a függvényeknek, hogy a Csebisev-polinomokhoz hasonlóan két Csebisev-Blaschke-szorzat kompozíciója kommutál.

## 3. fejezet

# Kitekintés

A dolgozat végére már egy egészen sokrétű szótárat sikerült kialakítani a polinomok és véges Blaschke-szorzatok között.

polinomok	véges Blaschke-szorzatok
2.1.1	2.1.2
2.2.1	2.2.2
2.2.8	2.2.7
2.3.3	2.3.4 és 2.3.7
2.4.1	2.4.4
2.5.4	2.5.6
2.6.1	2.6.2
2.7.21, 2.7.22, 2.7.24	2.7.30, 2.7.32, 2.7.33

Ez táblázat jól érzékelteti, hogy e két terület eredményei mennyire összefüggnek egymással. Azonban nemcsak, hogy összefüggnek, hanem egymás javára is válhatnak. Ezt illusztrálandó tesztek egy rövid matematikatörténeti kitekintést.

1981-ben Stephen Smale amerikai matematikus bebizonyította a következő becslést:

3.0.1. tétel (Smale, 1981, [19]) Ha  $p$  egy nem lineáris polinom,  $z_i$  kritikus pontokkal és  $z$  nem kritikus pontja  $p$ -nek, akkor

$$\min_i \frac{|p(z)|}{|z - z_i|} \geq 4|p'(z)| \quad (3.0.1)$$

Rögtön ebben a cikkben felteszi azt a kérdést is, hogy az egyenlőtlenségben szereplő konstans csökkenthető-e tovább, akár 1-re vagy  $(d-1)/d$ -re (ahol  $d = \deg p$ ). Ez már éles lenne, hiszen  $1/d$   $d$ -re élesen teljesül. A sejtés könnyen láthatóan átfogalmazható a következő alakra:

3.0.2. sejtés (Smale, [19]) Legyen  $p$  egy  $d \geq 2$  fokú normált polinom, amelyre  $p(0) = 0$  és  $p'(0) \neq 0$ , továbbá jelölje  $z_i$  a kritikus pontjait. Ekkor

$$\min_i \frac{|p'(z_i)|}{|z_i|} \geq N |p'(0)| \quad (3.0.2)$$

teljesül  $N = 1$ -re (vagy akár  $N = (d-1)/d$ -re is).

2002-ben Terry Sheil-Small bebizonyította a sejtést  $d = 2, 3$  és  $4$ -re, és egyben felfedezte, hogy a probléma átvihető a véges Blaschke-szorzatok témakörére. Így született meg a párhuzamos sejtés.

3.0.3. sejtés (Sheil-Small, 2002, [18]). Legyen  $B$  egy véges  $d$ -ed fokú Blaschke-szorzat ( $d \geq 2$ )  $j \in \mathbb{D}$  kritikus pontokkal ( $j = 1, \dots, d-1$ ) és  $B(0) = 0$ . Ha a  $0$  nem kritikus pontja  $B$ -nek, akkor

$$\min_j \frac{B'(j)}{j} = N_j B^0(0)j$$

teljesül  $N = 1$ -re (vagy akár  $N = (d-1)=d$ -re is).

Sheil-Small egyben azt is belátta, hogy a Blaschke-szorzatokra vonatkozó sejtés bizonyításából következik a Smale-sejtés is. Ezek után újtára indult ez a tétel is és azóta számos finomítgatás született  $N$ -re. Egy-kettőt felsorolok – a teljesség igénye nélkül – a Smale-sejtésre adottak közül:

1.  $N = 4^{(d-1)=(d+1)}$  (Beardon, 2002, [1]),
2.  $N = 1$ ,  $d = 5$  számítógéppel (Crane, 2006, [3]),
3.  $N = 4^{\frac{d-1}{d+1}}$  (Conte, Fujikawa, Lakic, 2007, [6]).

Továbbá 2017-ben Sheil-Small-sejtésre belátták, hogy  $N \leq 2^{\frac{2d-1+(2d-3)4^{1-\frac{1}{d}}}{2d-1}}$  (Ng,Zhang, 2016, [15]). Ez utóbbi cikk egyik szerzője, még a publikálás évében tartott egy előadást, ahol a két terület sejtésének összefüggése is előkerült. Ő úgy fogalmazott – amit ezután a dolgozat után mi is meg tudunk érteni –, hogy míg a polinomok algebrája, illetve azok deriváltjainak algebrája jóval egyszerűbb, mint a véges Blaschke-szorzatoké (ahol a deriváltak általában még Blaschke-szorzatok se lesznek), addig a véges Blaschke-szorzatok geometriai viselkedéséből sokat nyerhetünk. Így bár nem minden érvelés vihető át az egyik területről a másikra, azonban jó okunk van feltételezni, hogy e sejtés finomítása esetében a két terület kooperációja előremutató eredményekhez vezethet.

# Irodalomjegyzék

- [1] BEARDON, A.F., CARNE, T.K., NG, T.W. (2002). *The critical values of a polynomial*. Constr. Approx. 18, 343–354. DOI:10.1007/s00365-002-0506-1
- [2] COWEN, C. (2012). *Finite Blaschke products and compositions of other finite Blaschke products*. arXiv:1207.4010
- [3] CRANE, E. (2007). *A bound for Smale's mean value conjecture for complex polynomials*. Bull. Lond. Math. Soc. 39, 781–791. DOI:10.1112/blms/bdm063
- [4] FATOU, P. (1923). *Sur les fonctions holomorphes et bornées à l'intérieur d'un cercle*. Bull. Soc. Math. Fr. 51, 191–202. DOI:10.24033/bsmf.1033
- [5] FORSTER, O. (1981). *Lectures on Riemann Surfaces*. New York: Springer. vol. 81. DOI:10.1007/978-1-4612-5961-9
- [6] FUJIKAWA, E., SUGAWA, T. (2006). *Geometric function theory and Smale's mean value conjecture*. Proc. Jpn. Acad., Ser. A, Math. Sci. 82, 97–100. DOI:10.3792/pjaa.82.97
- [7] GARCIA, S. R. , MASHREGHI, J., ROSS, W. T. (2018). *Finite Blaschke Products and Their Connections*. Springer, Cham. DOI: 10.1007/978-3-319-78247-8
- [8] GARNETT, J.B.. (2007). *Bounded Analytic Functions*. Graduate Texts in Mathematics, vol. 236. Springer, New York. DOI:10.1007/0-387-49763-3
- [9] HORWITZ, A.L. , RUBEL, L.A.. (1986). *A uniqueness theorem for monic Blaschke products*. Proceedings Of The American Mathematical Society 96(1), 180–182. URL:https://www.ams.org/journal/s/proc/1986-096-01/S0002-9939-1986-0813834-9/S0002-9939-1986-0813834-9. pdf
- [10] Kós G. (2021). *Komplex függvénytan jegyzet (kézirat)*. URL:https://kosgeza.web.elte.hu/oktatas/2020osz-kft/
- [11] LEE J.M. (2011). *Group Actions and Covering Maps*. In: Introduction to Topological Manifolds. Graduate Texts in Mathematics, vol 202. Springer, New York, NY. DOI:10.1007/978-1-4419-7940-7\_12
- [12] Monodromy transformation. Encyclopedia of Mathematics. URL:http://encyclopediaofmath.org/index.php?title=Monodromy\_transformation&oldid=47885 (2021.05.31.)
- [13] NG T.W., TSANG C.Y. (2013). *Polynomials Versus Finite Blaschke Products*. In: Mashreghi J., Fricain E. (eds) Blaschke Products and Their Applications. Fields Institute Communications. vol. 65. Springer, Boston, MA. 10.1007/978-1-4614-5341-3\_14

- [14] NG, T.W., WANG, M.X. (2013). *Ritt's theory on the unit disk*. Forum Mathematicum. vol. 25. no. 4. 821-851. DOI:10.1515/form.2011.136
- [15] NG, T. W., ZHANG, Y. (2016). *Smale's mean value conjecture for finite Blaschke products*. J Anal 24, 331–345. DOI:10.1007/s41478-016-0007-4
- [16] RADÓ, TIBOR. (1922). *Zur Theorie der mehrdeutigen konformen Abbildungen*. In: Acta litterarum ac scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae: Sectio scientiarum mathematicarum, (1). 55-64. URL:[http://acta.bibl.u-szeged.hu/13277/1/math\\_001\\_055-064.pdf](http://acta.bibl.u-szeged.hu/13277/1/math_001_055-064.pdf)
- [17] RITT, J.F. (1922). *Prime and composite polynomials*. Trans. Am. Math. Soc. 23(1). 51–66. URL:<https://www.ams.org/journals/tran/1922-023-01/S0002-9947-1922-1501189-9/S0002-9947-1922-1501189-9.pdf>
- [18] SHEIL-SMALL, T. (2002). *Complex Polynomials*. Cambridge University Press, Cambridge. DOI:10.1017/CBO9780511543074
- [19] SMALE, S. (1981). *The fundamental theorem of algebra and complexity theory*. Bull. Am. Math. Soc. 4(1), 1–36. URL:<https://www.ams.org/journals/bull/1981-04-01/S0273-0979-1981-14858-8/S0273-0979-1981-14858-8.pdf>
- [20] Szűcs A. (2018). *Topológia*. URL:<http://bol.yai.cs.elte.hu/~szucs/Top1-2.pdf>
- [21] WALSH, J.L. (1952). *Note on the location of zeros of extremal polynomials in the non-euclidean plane*. Acad. Serbe Sci. Publ. Inst. Math. 4, 157–160.
- [22] ZAKERI, S. (1998). *On critical points of proper holomorphic maps on the unit disk*. Bull. Lond. Math. Soc. 30(1), 62–66. arXiv:9606221

