

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM  
TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR

---

OPERÁTORALGEBRÁK IZOMORFIZMUSAI  
DIPLOMAMUNKA

SIMON RICHÁRD

Matematikus MSc

Témavezető:

Dr. Tarcsay Zsigmond  
adjunktus

ELTE Alkalmazott Analízis és Számításmatematikai Tanszék



Eötvös Loránd Tudományegyetem  
Természettudományi Kar  
2020

# Tartalomjegyzék

1. Banach-algebrák reprezentációja	7
1.1. Reprezentációk normált tereken . . . . .	8
2. Algebrák radikálja	13
3. Johnson automatikus folytonossági tétele	16
3.0.1. Félig-egyszeres kommutatív Banach-algebrák . . . . .	20
4. Eidelheit tétele	22
5. Herstein tétele	25
6. $C^*$ -algebra egységgömbjének extrémális pontjai	32
7. Kadison általánosított Schwarz-egyenletlensége	39
8. Kadison izometria tétele	45

# Köszönetnyilvánítás

Szeretném megköszönni témavezetőmnek, Tarcsay Zsigmondnak a téma ajánlását, illetve a rengeteg segítséget, amelyet a dolgozat írása során nyújtott. Köszönet illeti továbbá a remek mesterszakos funkcionálanalízis kurzusokért, amelyek még közelebb hozták hozzám a témát. Köszönet illeti továbbá családomat egyetemi éveim alatti támogatásukért.

# EI SZÓ

Jelen szakdolgozat célja betekintést nyújtani normált algebrák (Banach-algebrák,  $C^*$ -algebrák, Hilbert terek korlátos operátorainak algebrája) közötti izomorfizmusok elméletébe. Elsőként Johnson automatikus folytonossági tételét tárgyaljuk. Erre két különböző bizonyítást is mutatunk, melyek közül az első Banach-algebrák reprezentációelméletének egy rövid alapozása előzi meg. Ezután belátjuk Eidelheit tételét, amely Banach-téren értelmezett korlátos operátorok algebrája közötti algebra-izomorfizmusok lehetséges alakját karakterizálja. Később a Jordan-homomorfizmusok elméletét tárgyaljuk, bebizonyítjuk Herstein tételét, majd a fejezet eredményeinek alkalmazásaként a Gleason-Zelazko-Kahane tételt. Ezután  $C^*$ -algebra egységömbjének extrémális pontjainak karakterizációját tárgyaljuk, majd a következő fejezetben belátunk egy  $C^*$ -algebrákra vonatkozó általánosított Schwarz-egyenlenséget, illetve ennek alkalmazásaként leírjuk  $C^*$ -algebrák rendezés tartó leképezéseinek struktúráját. Végül bizonyítjuk Kadison két izometria tételét, melyek közül az első Jordan-homomorfizmusok izometrikusságát tárgyalja, a második pedig a Banach-Stone tétel általánosítása nemkommutatív  $C^*$ -algebrákra.

# Jelölések, felhasznált tételek

Az alábbiakban összegyűjtünk néhány, a dolgozatban használt jelölést, illetve ismertnek tekintett, bizonyítás nélkül hivatkozott tételt.  $K$  mindig a valós vagy komplex számtestet jelöli.  $B(X)$  egy  $X$  Banach-tér korlátos operátorainak algebráját jelöli.

0.0.1. Tétel. (Kommutatív Gelfand-Naimark tétel) Minden kommutatív egységelemes  $C^*$ -algebra izometrikusan  $*$ -izomorf egy alkalmas kompakt Hausdorff-tér folytonos függvényalgebrájának megfelelő részalgebrájával.

0.0.2. Tétel. (Nemkommutatív Gelfand-Naimark tétel) Minden nemkommutatív egységelemes  $C^*$ -algebra izometrikusan  $*$ -izomorf egy alkalmas  $H$  Hilbert-tér korlátos operátorainak algebrájának megfelelő részalgebrájával.

0.0.3. Tétel. (Zárt gráf tétel) Egy  $T$  operátor grafikonján (vagy gráfján) az alábbi

$$G(T) = \{(x, Tx) | x \in \text{dom}T\}$$

halmazt értjük. Ha  $X, Y$  normált terek, akkor azt mondjuk hogy a  $T : X \rightarrow Y$  operátor zárt, ha a  $G(T)$  halmaz zárt  $X \times Y$ -ban. A Banach-féle zárt gráf tétel: Legyenek  $E$  és  $F$  Banach-terek, és  $T : E \rightarrow F$  zárt lineáris operátor. Ekkor  $T$  folytonos.

0.0.4. Tétel. (Douglas faktorizációs tétele) Legyen  $\mathcal{H}$  Hilbert-tér, és legyenek  $A, B \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$  folytonos lineáris operátorok. Ekkor a következő kijelentések ekvivalensek:

(i)  $A$  és  $B$  képtereire fennáll, hogy

$$\text{ran } A \subseteq \text{ran } B,$$

(ii) létezik olyan  $c \geq 0$ , hogy minden  $x \in \mathcal{H}$  vektorra

$$\|Ax\| \leq c \cdot \|Bx\|,$$

(iii) minden  $y \in \mathcal{H}$  vektorra létezik olyan  $c_y \geq 0$  szám, amelyre minden  $x \in \mathcal{H}$  vektor mellett

$$|(x|Ay)| \leq c_y \cdot \|Bx\|,$$

(iv) létezik olyan  $D \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$  folytonos lineáris operátor amelyre

$$A = BD.$$

A fenti feltételek teljesülése mellett egyetlen olyan  $D \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$  operátor létezik, amely rendelkezik az alábbi tulajdonságokkal:

$$\|D\| = \inf\{\lambda \geq 0 \mid AA^* \leq \lambda^2 BB^*\}, \quad (1)$$

$$\text{ran } D \subseteq [\ker B]^\perp. \quad (2)$$

Ezt a  $D$  operátort a

$$BX = A,$$

$X$  ismeretlennel felírt Douglas-egyenlet megoldásának hívjuk.

# 1. fejezet

## Banach-algebrák reprezentációja

Ahhoz, hogy a következő fejezetben beláthassuk az automatikus folytonossági tételt szükségünk lesz néhány eredményre Banach-algebrák reprezentációelméletéből. Az alábbiakban ezeket foglaljuk össze.

1.0.1. Definíció. Legyen  $\mathcal{A}$  algebra és  $\mathcal{X}$  vektortér.  $\mathcal{A}$  egy  $T$  reprezentációja  $\mathcal{X}$ -en egy  $a \rightarrow T_a$  homomorfizmusa  $\mathcal{A}$ -nak  $L(\mathcal{X})$ -be. Az  $\mathcal{Y}$  altér  $T$ -invariáns, ha  $T_a y \in \mathcal{Y}$  minden  $y \in \mathcal{Y}$ -ra. Azt mondjuk, hogy a  $T$  reprezentáció:

- Helyes, ha a  $T$  homomorfizmus injektív.
- Triviális, ha  $T_a = 0$  minden  $a \in \mathcal{A}$ -ra.
- Irreducibilis, ha a  $\{0\}$  és  $\mathcal{X}$  az egyetlen  $T$ -invariáns alterek, és  $T$  nem triviális.
- Ciklikus, ha létezik egy  $z \in \mathcal{X}$  (úgynevezett ciklikus) vektor, amelyre  $\mathcal{X} = \{T_a z : a \in \mathcal{A}\}$
- Ekvivalens  $\mathcal{A}$ -nak egy  $S$   $\mathcal{Y}$  vektortéren adott reprezentációjához, ha létezik egy  $U : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$  lineáris bijekció (amit ekvivalenciának hívunk), amelyre teljesül hogy:

$$S_a U = U T_a \quad a \in \mathcal{A}.$$

A folytonossági tétel bizonyítása az irreducibilis reprezentációkon keresztül történik, így az alábbiakban ezek néhány tulajdonságát foglaljuk össze. Először egy ekvivalens jellemzést adunk.

1.0.2. Állítás. Legyen  $\mathcal{A}$  algebra, és  $T$   $\mathcal{A}$  egy reprezentációja  $\mathcal{X}$ -en. Ekkor  $T$  pontosan akkor ciklikus, ha ekvivalens  $L^{\mathcal{A}/L}$ -el  $\mathcal{A}$ -nak valamilyen  $\mathcal{L}$  moduláris balideáljával. Ha  $z$  tetszőleges ciklikus vektora  $T$ -nek, akkor  $\mathcal{L}$  választható úgy, hogy

$$\mathcal{L} = \{a \in \mathcal{A} \mid T_a z = 0\}.$$

*Bizonyítás.* Legyen  $z$  tetszőleges vektor  $\mathcal{X}$ -ben, ekkor  $\mathcal{L} = \{a \in \mathcal{A} : T_a z = 0\}$  egy balideál. Tegyük fel most, hogy  $z$  ciklikus vektor. Ekkor létezik  $e \in \mathcal{A}$ , hogy  $T_e z = z$ . Így  $e$  nyilván

egy relatív jobb egysége  $\mathcal{L}$ -nek, tehát  $\mathcal{L}$  moduláris. Tetszőleges  $a \in \mathcal{A}$ -ra legyen  $U(a + \mathcal{L}) = T_a z$ . Ez jóldefiniált  $\mathcal{L}$  választása miatt, és így egy lineáris injekciója  $\mathcal{A}/\mathcal{L}$ -nek  $\mathcal{X}$ -be. Szürjektív, mivel  $z$  ciklikus vektor. Könnyen látható, hogy  $T_a U = U L_a^{A/L}$  minden  $a \in \mathcal{A}$ -ra, és így  $U$  ekvivalencia, ami igazolja a feltétel szükségességét. Tegyük fel most, hogy  $\mathcal{L}$  egy moduláris balideál  $e$  relatív jobb egységgel. Ekkor  $L_a^{A/L}(e + \mathcal{L}) = a + \mathcal{L}$  minden  $a \in \mathcal{A}$ -ra, és így  $e + \mathcal{L}$  ciklikus vektora  $L^{A/L}$ -nek. Mivel az ekvivalencia megőrzi a ciklikusságot, ezzel beláttuk a feltétel elégségességét is.  $\square$

1.0.3. Tétel. Legyen  $\mathcal{A}$  algebra, és  $T$  az  $\mathcal{A}$  egy reprezentációja az  $\mathcal{X}$  vektortéren. Ekkor a következők ekvivalensek:

1.  $T$  irreducibilis.
2. Minden nemnulla vektor  $\mathcal{X}$ -ben ciklikus vektor, és  $\mathcal{X}$  nem nulla dimenziós.
3. Létezik olyan maximális moduláris balideál  $\mathcal{L}$ , hogy  $T$  ekvivalens  $L^{A/L}$ -l.

Bizonyítás.  $1 \Rightarrow 2$

A  $\{z \in \mathcal{X} : T_A z = \{0\}\}$  egy  $T$ -invariáns altér, és mivel  $T$  irreducibilis, ezért csak a  $\{0\}$  vagy  $\mathcal{X}$  lehet. Mivel  $T$  nemtriviális, ezért ez az altér csak a  $\{0\}$  lehet. Bármely  $z \in \mathcal{X}$ -re  $T_X z = \{T_a z : a \in \mathcal{A}\}$  egy  $T$ -invariáns altér, ami a  $\{0\}$  vagy  $\mathcal{X}$ . Minden nemnulla  $z$  vektorra  $T_A z = \mathcal{X}$ , azaz  $z$  ciklikus.

$2 \Rightarrow 3$

Az előző állítás szerint  $T$  ekvivalens  $L^{A/L}$ -l valamilyen  $\mathcal{L}$  moduláris balideállal. Ha  $\mathcal{L}$  valódi, de nem maximális, akkor tekintsünk valamilyen  $\mathcal{K}$  balideált, ami valódi módon tartalmazza  $\mathcal{L}$ -et. Ekkor  $\mathcal{K}/\mathcal{L}$  egy nemnulla valódi  $L^{A/L}$ -invariáns altér. Ez azonban ellentmondás, ugyanis  $\mathcal{K}/\mathcal{L}$  minden nemnulla eleme egy ciklikus vektora  $L^{A/L}$ -nek  $L^{A/L}$  és  $T$  ekvivalenciája miatt.

$3 \Rightarrow 1$

Ha  $\mathcal{L}$  egy maximális balideál és  $\mathcal{Y}$  egy  $L^{A/L}$ -invariáns altere  $\mathcal{A}/\mathcal{L}$ -nek akkor

$$\{a \in \mathcal{A} : a + \mathcal{L} \in \mathcal{Y}\}$$

az  $\mathcal{A}$  egy balideálja, ami tartalmazza  $\mathcal{L}$ -t. Így  $\mathcal{Y}$  csak a  $\{0\}$  vagy  $\mathcal{A}/\mathcal{L}$  lehet. Ekkor ha  $\mathcal{L}$  moduláris, akkor mind  $L^{A/L}$ , mind a vele ekvivalens  $T$  reprezentáció irreducibilis.  $\square$

## 1.1. Reprezentációk normált tereken

Az alábbi alfejezetben ismertetjük a fejezet elején bevezetett fogalmak normált térbeli változatát, majd bebizonyítjuk azokat az állításokat, amelyek Johnson folytonossági tételének belátásához szükségesek.

1.1.1. Definíció. Legyen  $T$  az  $\mathcal{A}$  algebra egy reprezentációja az  $\mathcal{X}$  normált téren. Ekkor azt mondjuk, hogy  $T$ :



1. Normált, ha  $T_a \in \mathcal{B}(X)$  minden  $a \in \mathcal{A}$ -ra.
2. Topologikusan ciklikus, ha létezik olyan  $z \in X$  vektor, amelyre  $T_{\mathcal{A}}z = \{T_az : a \in \mathcal{A}\}$  sűrű  $X$ -ben.
3. Topologikusan irreducibilis, ha a  $\{0\}$  és  $X$  az egyetlen zárt  $T$ -invariáns alterek, és  $T$  nem triviális.
4. Topologikusan ekvivalens az  $\mathcal{A}$  algebra egy  $S$  reprezentációjával az  $Y$  normált téren, ha létezik olyan  $U$  lineáris homeomorfizmusa  $X$ -nek  $Y$ -ba, amelyre

$$S_a U = U T_a \quad a \in \mathcal{A}.$$

Ha  $\mathcal{A}$  egy normált algebra, akkor  $T$ :

5. Folytonos, ha normált és folytonos mint  $\mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}(X)$  leképezés.
6. Erősen folytonos, ha  $a \rightarrow T_ax$  folytonos leképezés  $\mathcal{A}$ -ból  $X$ -be minden rögzített  $x \in X$ -re.

1.1.2. Állítás. *Egy Banach-algebra egy erősen folytonos normált reprezentációja folytonos.*

*Bizonyítás.* Legyen  $T$  egy erősen folytonos normált reprezentációja az  $\mathcal{A}$  Banach-algebrának az  $X$  normált téren. Alkalmazzuk a Hahn-Banach tételt az  $\{S_x : x \in X_1\}$  halmazra, ahol  $X_1$  az  $X$  egységgömbje, és

$$S_x(a) = T_ax \quad \forall a \in \mathcal{A} \quad x \in X$$

Az erősen folytonosság miatt minden  $S_x$  leképezés folytonos  $\mathcal{A}$ -ból  $X$ -be.  $T$  normáltságából következik, hogy

$$\|S_x(a)\| = \|T_ax\| \leq \|T_a\| \|x\| \leq \|T_a\| \quad \forall a \in \mathcal{A} \quad x \in X.$$

Így létezik olyan  $M$ , amelyre

$$\|S_x\| \leq M \quad \forall x \in X,$$

amiből kapjuk, hogy

$$\|T_a\| = \sup_{x \in X_1} \|T_a(x)\| = \sup_{x \in X_1} \|S_x(a)\| \leq M \|a\|,$$

azaz  $T$  folytonos.

□

1.1.3. Tétel. *Legyen  $T$  egy ciklikus reprezentációja az  $\mathcal{A}$  normált algebrának az  $X$  vektortéren. Ha  $z$  egy ciklikus vektora  $T$ -nek, és az  $\{a \in \mathcal{A} : T_az = 0\}$  zárt, akkor*

$$\|x\|_z = \inf\{\|a\| : a \in \mathcal{A}, T_az = x\} \quad \forall x \in X$$

*egy normát definiál  $X$ -en, amelyre  $T$  egy folytonos reprezentáció  $(X, \|\cdot\|_z)$ -n, amelyre teljesül, hogy  $\|T_a(x)\|_z \leq \|a\|$  minden  $a \in \mathcal{A}$ -ra. Ha  $\mathcal{A}$  Banach-algebra, akkor  $(X, \|\cdot\|_z)$  Banach-tér. Ha  $X$  eleve Banach-tér a  $\|\cdot\|$  normával, akkor  $T$  erősen folytonos  $\|\cdot\|$  szerint, és  $\|\cdot\|_z$  ekvivalens  $\|\cdot\|$ -val.*

*Bizonyítás.* Legyen  $\mathcal{L} = \{a \in \mathcal{A} : T_a z = 0\}$ . Ekkor  $\|\cdot\|_z$  nem más, mint az  $\mathcal{A}/\mathcal{L}$  faktornormájának átvitele az ekvivalenciával  $X$ -be a ciklikus reprezentációk ekvivalens jellemzésénél megadott ekvivalenciával. A  $\|T_a\|_z \leq \|a\|$  kijelentés egy egyszer átfogalmazása annak, hogy  $L^{A/L}$  egy kontraktív reprezentáció. Ebből azonnal következik, hogy  $(X, \|\cdot\|_z)$  teljes, ha  $\mathcal{A}$  Banach-algebra.  $\square$

1.1.4. Állítás. *Legyen  $\mathcal{A}$  algebra. Ekkor semelyik valódi egy-vagy kétoldali moduláris ideál sem tartalmazza a relatív egységét.*

*Bizonyítás.* Ha  $I$  baloldali moduláris ideál  $\mathcal{A}$ -ban és  $e \in I$  relatív jobb egység, akkor bármely  $a \in \mathcal{A}$  elemre  $a - ae \in I$  és  $ae \in I$  miatt  $a = (a - ae) + ae \in I$ , vagyis  $I = \mathcal{A}$ .  $\square$

1.1.5. Tétel. *Legyen  $\|\cdot\|$  norma az  $\mathcal{A}$  Banach-algebrán. Minden valódi egy-vagy kétoldali moduláris ideál lezárása a  $\|\cdot\|$  szerint valódi. Következésképp minden maximális moduláris ideál zárt.*

*Bizonyítás.* Mivel minden eset hasonlóan tárgyalható, csak balideálokra bizonyítjuk be az állítást. Legyen  $e$  relatív jobb egység az  $\mathcal{L}$  valódi moduláris balideálhoz. Megmutatjuk, hogy bármely  $b \in \mathcal{L}$  elemre  $\|e - b\| \geq 1$ . Ha nem,  $\|e - b\| \leq 1 - \epsilon$  következik, hogy létezik  $c$  kvázi-inverze  $e - b$ -nek. Ez azonban ellentmond az előző állításnak, így  $e$  nincs benne  $\mathcal{L}$  lezártjában, azaz a lezárt valódi.  $\square$

1.1.6. Definíció. Egy ideált primitívnek nevezünk, ha egy irreducibilis reprezentáció magja. Egy valódi  $I$  ideált prímnek nevezünk, ha bármely  $I_1, I_2$  ideálokra ha teljesül  $I_1 I_2 \subseteq I$ , akkor  $I_1 \subseteq I$  vagy  $I_2 \subseteq I$ . Ha  $\mathcal{L}$  balideál, akkor az

$$\mathcal{L} : \mathcal{A} = \{a \in \mathcal{A} \mid a\mathcal{A} \subseteq \mathcal{L}\}$$

halmazt az  $\mathcal{L}$  kvóciensének hívjuk.

1.1.7. Tétel. *Legyen  $\mathcal{A}$  algebra.*

1. *Egy  $\mathcal{P} \subseteq \mathcal{A}$  ideál pontosan akkor primitív, ha el áll  $\mathcal{L} : \mathcal{A}$  alakban valamilyen  $\mathcal{L}$  maximális moduláris balideálra. Ekkor  $\mathcal{P}$  a legnagyobb ideál  $\mathcal{L}$ -ben.*
2. *A  $\mathcal{P}$  primitív ideálra teljesül, hogy*

$$\mathcal{P} \subseteq \bigcap \{\mathcal{L} \mid \mathcal{L} \text{ egy maximális moduláris balideál, amelyre } \mathcal{P} = \mathcal{L} : \mathcal{A}\}$$

*Bizonyítás.* 1.: Tegyük fel, hogy  $\mathcal{P}$  a magja a nemtriviális irreducibilis  $T : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{L}(X)$  reprezentációnak. Legyen  $z \in X \setminus \{0\}$  és definiáljuk  $\mathcal{L}$ -et a következő képp:  $\mathcal{L} = \{a \in \mathcal{A} : T_a z = 0\}$ . Ekkor a korábbiakban láttak szerint  $\mathcal{L}$  maximális moduláris balideál, és  $T$  ekvivalens  $L^{A/L}$ -nel. Nyilván  $\mathcal{P}$  a magja  $L^{A/L}$ -nek, és ez a mag  $\mathcal{L} : \mathcal{A}$ .  $\mathcal{L} : \mathcal{A} \subseteq \mathcal{L}$ . Bármely  $\mathcal{I} \subseteq \mathcal{L}$  ideál esetén  $\mathcal{I}\mathcal{A} \subseteq \mathcal{L}$  és így fennáll  $\mathcal{I} \subseteq \mathcal{L} : \mathcal{A}$ .

2.:

Mivel  $\mathcal{L} : \mathcal{A} \subseteq \mathcal{L}$  fennáll bármely  $\mathcal{L}$  baloldali moduláris ideálra, így

$$\mathcal{P} \subseteq \bigcap \{\mathcal{L} \mid \mathcal{L} \text{ egy maximális moduláris balideál, amelyre } \mathcal{P} = \mathcal{L} : \mathcal{A}\}.$$

A fordított irányú tartalmazás belátásához tegyük fel, hogy  $\mathcal{P}$  a  $T : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{L}(X)$  irreducibilis reprezentáció magja, és  $a \in \mathcal{A} \setminus \mathcal{P}$ . Ekkor  $T_a z$  nem azonosan nulla valamely  $z \in X$  vektorra. Így  $a$  nem eleme az  $\mathcal{L} = \{a \in \mathcal{A} \mid T_a z = 0\}$  halmaznak. Ugyanakkor az elbb bizonyítottuk hogy  $\mathcal{L}$ -re teljesül  $\mathcal{P} = \mathcal{L} : \mathcal{A}$ .  $\square$

1.1.8. Állítás. *Egy Banach-algebra bármely primitív ideálja zárt.*

*Bizonyítás.* Legyen  $\mathcal{P}$  az  $\mathcal{A}$  Banach-algebra egy primitív ideálja. Az elz tételben megmutattuk, hogy  $\mathcal{P}$  el áll valamilyen  $\mathcal{L}$  maximális moduláris balideálra mint  $\mathcal{L} : \mathcal{A}$ . A korábbiakban megmutattuk, hogy  $\mathcal{L}$  zárt,  $\mathcal{L} : \mathcal{A}$  definíciójából adódóan pedig  $\mathcal{P}$  is zárt.  $\square$

1.1.9. Tétel. *Legyen  $T$  az  $\mathcal{A}$  algebra egy irreducibilis reprezentációja az  $X$  vektortéren. Ekkor*

$$(T_A)^\theta = \{S \in \mathcal{L}(X) : ST_a = T_a S \ a \in \mathcal{A}\}$$

*halmaz egy hányados algebra. Ha  $(T_A)$  egy hányados algebra, akkor  $T$  felbonthatatlan.*

*Bizonyítás.* Tegyük fel, hogy  $S \in (T_A)^\theta$ . Ekkor  $SX$  egy  $T$ -invariáns altér. Mivel  $SX = \{0\}$  pontosan akkor, ha  $S$  nulla, ezért  $SX = X$  minden nemnulla  $S$ -re. Hasonlóan, az  $\{x : Sx = 0\}$  is  $T$ -invariáns, és így  $\{0\}$  minden nemnulla  $S$ -re. Így minden nemnulla  $S \in (T_A)^\theta$  invertálható  $\mathcal{L}(X)$ -ben és inverze is  $(T_A)^\theta$ -beli, azaz  $(T_A)^\theta$  hányados algebra. Tegyük most fel, hogy  $T$  felbontható. Ekkor a két altérre vetít projekció  $(T_A)^\theta$ -beli, mivel az alterek invariánsak. Azonban ezek a projekciók nemtriviális idempotens elemek, ami ellentmond annak, hogy  $(T_A)$  hányados algebra  $\square$

1.1.10. Tétel. *Legyen  $T$  egy irreducibilis reprezentációja az  $\mathcal{A}$  Banach-algebrának az  $X$  vektortéren. Ekkor*

$$(T_A)^\theta = \{S \in \mathcal{L}(X) : ST_a = T_a S \ a \in \mathcal{A}\}$$

*halmaz az  $X$  identikus leképezésének komplex többszöröseinek a halmaza.*

*Bizonyítás.* Legyen  $\sigma$  norma  $\mathcal{A}$ -n, továbbá legyen  $z \in X$  egy nemnulla vektor, és legyen  $\|\cdot\|_z$  a korábban már bevezetett norma. Tegyük fel, hogy  $S$  benne van a  $(T_A)^\theta$  halmazban. Ekkor  $x = T_a z$ -re kapjuk, hogy  $Sx = ST_a z = T_a Sz$ , amiből következik, hogy  $\|Sx\|_z \leq \|T_a\|_z \|Sz\|_z$ .  $\square$

1.1.11. Tétel. *Legyen  $\mathcal{A}$  Banach-algebra.  $\mathcal{A}$  minden irreducibilis normált reprezentációja egy normált téren folytonos.*

*Bizonyítás.* Legyen  $\mathcal{P}$  a magja az  $\mathcal{A}$  Banach-algebra  $T$  irreducibilis normált reprezentációjának az  $X$  normált téren. Ekkor  $\mathcal{P}$  primitív, ennél fogva zárt. Így lecserélhetjük  $\mathcal{A}$ -t  $\mathcal{A}/\mathcal{P}$ -re, és feltehetjük, hogy  $T$  h reprezentáció. Tekintsük  $\mathcal{A}$ -t mint operátorok egy  $\mathcal{B}(X)$ -be beágyazott irreducibilis algebráját. A korábbiak szerint elég megmutatni, hogy  $T$  er sen folytonos (azaz minden  $x \in X$ -re  $\mathcal{A} \rightarrow Ax$  folytonos). Ha  $X$  véges dimenziós, akkor  $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{B}(X)$  szintén véges dimenziós, így az  $\mathcal{A} \rightarrow Ax$  leképezés folytonos  $\mathcal{A}$ -n minden  $x \in X$ -re. Feltehet tehát, hogy  $X$  végtelen dimenziós. Továbbá az  $\mathcal{A}$  algebra  $\mathcal{A}^\theta$  kommutátora a korábbiak szerint CI, így megadható  $X$ -beli vektorok olyan  $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{A}^\theta$  felett lineárisan

független sorozata, amelyre  $\|x_n\| = 1$  minden  $n \in \mathbb{N}$ -re. Tegyük fel, hogy  $x \in X$  olyan vektor, hogy az  $A \mapsto Ax$  leképezés folytonos  $\mathcal{A}$ -n. Ekkor minden rögzített  $B \in \mathcal{A}$ -ra az  $A \mapsto AB \mapsto ABx$  folytonos minden  $A \in \mathcal{A}$ -ra. Ugyanakkor  $T$  irreducibilitásából tudjuk, hogy  $\{Bx | B \in \mathcal{A}\} = X$  minden  $x$  nem nulla vektorra. Így az  $A \mapsto Ax$  leképezés vagy folytonos vagy nem folytonos minden nem nulla  $x \in X$  vektorra. A második lehet ségből ellentmondásra fogunk jutni, amellyel igazoljuk a tételt. Tegyük fel, hogy  $A \mapsto Ax$  nem folytonos minden  $x \in X$ -re. Először megmutatjuk, hogy minden  $K > 0, \epsilon > 0, m \in \mathbb{N}$ -hez létezik  $A \in \mathcal{A}$  a következő tulajdonságokkal:

1.  $\|A\| < \epsilon$
2.  $Ax_1 = Ax_2 = \dots = Ax_{m-1}$
3.  $\|Ax_m\| > K$

Legyenek  $K, \epsilon, m$  a továbbiakban rögzítettek, továbbá legyen  $M_n = \{A \in \mathcal{A} : Ax_n = 0\}$ . Ekkor  $M_n$  minden  $n \in \mathbb{N}$ -re egy maximális moduláris balideálja  $\mathcal{A}$ -nak. Definiáljuk  $R$ -et és  $L$ -et a következőképpen:  $R = M_1 \cap M_2 \cap \dots \cap M_{m-1}$ ,  $L = R + M_m$ . A tételben megmutattuk, hogy létezik olyan  $B \in \mathcal{A}$  amelyre  $Bx_1 = Bx_2 = \dots = Bx_{m-1} = 0, Bx_m = x_m \neq 0$ . Ez a  $B \in \mathcal{A}$  elem  $R \subseteq L$ -ben van, viszont nincs benne  $M_m$ -ben, így  $M_m$  maximalitásából kapjuk, hogy  $L = \mathcal{A}$ . Így az összeadás egy folytonos lineáris leképezést definiál  $R \oplus M_m$ -ben  $\mathcal{A}$ -ba. A nyílt leképezés tétel szerint létezik olyan  $\delta > 0$  konstans, hogy minden  $B \in \mathcal{A}$ -hoz, amelyre teljesül  $\|B\| < \delta\epsilon$  léteznek  $A \in R$  és  $C \in M_m$  elemek, amelyekre teljesül, hogy  $B = A + C$  és  $\|A\| < \epsilon, \|C\| < \epsilon$ . Mivel  $A \mapsto Ax_m$  nem folytonos létezik olyan  $B \in \mathcal{A}$ , hogy  $\|Bx_m\| > K$ . Válasszuk most  $A$ -t és  $C$ -t a fentiek szerint. Ekkor  $A$  megfelel az 1,2,3 feltételeknek (mivel  $Cx_m = 0$ ). Indukcióval készíthetünk olyan  $\{A_n\}_{n \in \mathbb{N}}$   $\mathcal{A}$ -beli sorozatot, amelyre a következők igazak:

1.  $\|A_n\| < 2^{-n}$
2.  $A_n x_1 = A_n x_2 = \dots = A_n x_{n-1} = 0$
3.  $\|A_n x_n\| > n + \|A_1 x_n + A_2 x_n + \dots + A_{n-1} x_n\|$ .

Definiáljuk  $B_k \in \mathcal{A}$ -t úgy, hogy  $B_k = \sum_{n>k} A_n$ . Mivel minden  $A_n$  eleme a zárt  $M_k$  ideálnak minden  $n > k$ -ra,  $B_k$  eleme  $M_k$ -nak. Így minden  $k \in \mathbb{N}$ -re kapjuk, hogy

$$\begin{aligned} \|B_0 x_k\| &= \|A_1 x_k + A_2 x_k + \dots + A_k x_k + B_k x_k\| \\ &\geq \|A_k x_k\| - \|A_1 x_k + A_2 x_k + \dots + A_{k-1} x_k\| \\ &\geq k = k \|x_k\|. \end{aligned}$$

Azonban  $B_0$  egy korlátos operátor, mivel  $T$  normális reprezentáció. Ezzel az ellentmondással beláttuk a tételt.  $\square$

## 2. fejezet

# Algebrák radikálja

Az alábbi fejezetben összefoglaljuk azokat az ismereteket, amelyekre a későbbi állítások megértéséhez szükségünk lesz az egységelemes algebrák radikáljának elméletéből.

2.0.1. Definíció. Egy egységelemes  $\mathcal{A}$  radikáljának nevezzük és  $\text{Rad}(\mathcal{A})$ -val jelöljük az  $\mathcal{A}$  maximális balideáljainak metszetét. Ha  $\mathcal{A}$ -ban nem létezik maximális balideál, akkor  $\text{Rad}(\mathcal{A}) = \mathcal{A}$ .

2.0.2. Definíció. Azt mondjuk, hogy az  $\mathcal{A}$  algebra félig-egyszerű, ha  $\text{Rad}(\mathcal{A}) = \{0\}$ , azaz ha  $\mathcal{A}$  maximális balideáljainak metszete triviális.

A Zorn-lemma alkalmazásával egyszerűen belátható az alábbi állítás:

2.0.3. Lemma. *Ha  $\mathcal{A}$  egységelemes algebra, akkor  $\mathcal{A}$  minden valódi ideálja része egy maximális balideálnak.*

2.0.4. Következmény. *Legyen  $\mathcal{A}$  egységelemes algebra, és  $a \in \mathcal{A}$  olyan elem, amelynek nincs balinverze. Ekkor létezik olyan  $\mathcal{M} \subseteq \mathcal{A}$  maximális balideál, amelyre  $a \in \mathcal{M}$ .*

*Bizonyítás.* Jelölje  $\mathcal{I} := \mathcal{A} \cdot a$ , akkor  $\mathcal{I} \subseteq \mathcal{A}$  valódi balideál, továbbá  $a \in \mathcal{I}$ . Az előző lemma szerint létezik olyan  $\mathcal{M}$  maximális balideál, amelyre  $\mathcal{I} \subseteq \mathcal{M}$ , speciálisan  $a \in \mathcal{M}$ .  $\square$

2.0.5. Lemma. *Jelölje  $G(\mathcal{A})$  az  $\mathcal{A}$  invertálható elemeinek halmazát. Legyen  $x \in \text{Rad}(\mathcal{A})$ , ekkor  $\mathbf{1} - x \in G(\mathcal{A})$ .*

*Bizonyítás.* Elsőként megmutatjuk, hogy  $\mathbf{1} - x$  balinvertálható. Valóban, ha nem volna az, akkor az előző állítás szerint létezik  $\mathcal{M}$  maximális balideál, amelyre  $\mathbf{1} - x \in \mathcal{M}$ . Ugyanakkor  $x \in \text{Rad}(\mathcal{A})$  miatt  $x \in \mathcal{M}$ , azaz  $\mathbf{1} = x + (\mathbf{1} - x) \in \mathcal{M} + \mathcal{M} \subseteq \mathcal{M}$ , ami ellentmondás. Ezzel igazoltuk, hogy létezik  $y \in \mathcal{A}$ , amelyre  $y(\mathbf{1} - x) = \mathbf{1}$ . Megmutatjuk, hogy  $(\mathbf{1} - x)y = \mathbf{1}$  is teljesül. Ehhez elég igazolni, hogy  $y$ -nak van balinverze. Tegyük fel indirekt, hogy  $y$  nem balinvertálható, ekkor a fentiek szerint létezik  $\mathcal{M}$  maximális balideál, amelyre  $y \in \mathcal{M}$ , de ekkor  $x \in \mathcal{M}$  miatt  $yx \in \mathcal{M}$ , amiből kapjuk, hogy

$$\mathbf{1} = y(\mathbf{1} - x) = y - yx \in \mathcal{M},$$

azaz  $\mathbf{1} \in \mathcal{M}$ , ami lehetetlen. Ezzel beláttuk, hogy  $y$  egyszerre bal- és jobbinverze is  $\mathbf{1} - x$ -nek, azaz  $\mathbf{1} - x \in G(\mathcal{A})$ .  $\square$

Az alábbi tétel a radikál egy karakterizációját adja egységelemes Banach-algebra esetén.

2.0.6. Tétel. *Legyen  $\mathcal{A}$  egységelemes Banach-algebra, ekkor*

$$\text{Rad}(\mathcal{A}) = \{a \in \mathcal{A} \mid r(ba) = 0 \quad \forall b \in \mathcal{A}\}.$$

*Bizonyítás.* Először megmutatjuk, hogy ha  $a \in \mathcal{A}$  olyan elem, amelyre minden  $b \in \mathcal{A}$  esetén  $r(ba) = 0$ , akkor  $a \in \text{Rad}(\mathcal{A})$ . Tegyük fel indirekten, hogy  $a \notin \text{Rad}(\mathcal{A})$ . Ekkor létezik  $\mathcal{M}$  maximális balideál, hogy  $a \notin \mathcal{M}$ . Világos, hogy az  $\mathcal{I} = \mathcal{A} \cdot a + \mathcal{M}$  olyan balideál, amelyre  $a \in \mathcal{I}$  és  $\mathcal{M} \subseteq \mathcal{I}$ , ezért  $\mathcal{M}$  maximalitása miatt  $\mathcal{I} = \mathcal{A}$ . Speciálisan, léteznek olyan  $b \in \mathcal{A}$  és  $x \in \mathcal{M}$  elemek, hogy  $\mathbf{1} \in \mathcal{I}$  el áll  $\mathbf{1} = ba + x$  alakban, azaz  $\mathbf{1} - ba \in \mathcal{M}$ . Az  $a$  elemre azonban feltettük, hogy  $r(ba) = 0$ , és így  $\mathbf{1} - ba \in G(\mathcal{A})$ , ez azonban lehetetlen, mivel az  $\mathcal{M}$  valódi balideál nem tartalmazhat invertálható elemet. Megfordítva, megmutatjuk hogy ha  $a \in \text{Rad}(\mathcal{A})$  és  $b \in \mathcal{A}$ , akkor  $r(ba) = 0$ . Mivel  $\text{Rad}(\mathcal{A}) \subseteq \mathcal{A}$  balideál, ezért  $b \in \mathcal{A}$  esetén  $ba \in \text{Rad}(\mathcal{A})$ , azaz elég megmutatni, hogy tetszőleges  $x \in \text{Rad}(\mathcal{A})$  esetén  $r(x) = 0$ . A korábbiak alapján bármely  $y \in \text{Rad}(\mathcal{A})$  esetén  $\mathbf{1} - y \in G(\mathcal{A})$ , speciálisan bármely  $x \in \text{Rad}(\mathcal{A})$  és  $\lambda \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$  esetén  $\mathbf{1} - \lambda^{-1}x \in G(\mathcal{A})$ , vagy másképp  $\lambda\mathbf{1} - x \in G(\mathcal{A})$ , azaz  $\lambda \notin \text{Sp}(x)$ .  $\square$

2.0.7. Következmény. *Ha  $\mathcal{A}$  egységelemes Banach-algebra, akkor az  $\mathcal{A}$  Jacobson-radikálja megegyezik az  $\mathcal{A}$  jobboldali ideáljainak metszetével, azaz  $\text{Rad}(\mathcal{A}) \subseteq \mathcal{A}$  kétoldali ideál.*

*Bizonyítás.* Jelölje  $\text{Rad}^0(\mathcal{A})$  az  $\mathcal{A}$  jobboldali ideáljainak metszetét. Az előző tételhez hasonlóan igazolható, hogy

$$\text{Rad}^0(\mathcal{A}) = \{a \in \mathcal{A} \mid r(ab) = 0 \quad \forall b \in \mathcal{A}\}$$

Mivel a Jacobson-lemma szerint  $r(ab) = r(ba)$  teljesül minden  $a, b \in \mathcal{A}$ , ezért a fenti egyenlesekben az előző tételből kapjuk, hogy  $\text{Rad}(\mathcal{A}) = \text{Rad}^0(\mathcal{A})$ . Mivel  $\text{Rad}(\mathcal{A})$  bal-,  $\text{Rad}^0(\mathcal{A})$  pedig jobboldali ideál, ebből az egyenlesekben kapjuk, hogy a Jacobson-radikál kétoldali ideál.  $\square$

2.0.8. Állítás. *Legyen  $\mathcal{A}$  egységelemes Banach-algebra és jelölje  $\pi : \mathcal{A} \mapsto \mathcal{A}/\text{Rad}(\mathcal{A})$  a kanonikus faktor leképezést. Bármely  $a \in \mathcal{A}$  esetén*

$$\text{Sp}(a) = \text{Sp}(\pi(a))$$

*Bizonyítás.* Mivel  $\pi$  egységelemtartó algebra homomorfizmus, ezért fennáll az  $\text{Sp}(\pi(a)) \subseteq \text{Sp}(a)$  tartalmazás. Megfordítva, elegendő azt igazolni, hogy ha  $\pi(a)$  invertálható az  $\mathcal{A}/\text{Rad}(\mathcal{A})$  faktor algebrában, akkor  $\mathcal{A}$  invertálható  $\mathcal{A}$ -ban. Tegyük fel tehát, hogy létezik  $b \in \mathcal{A}$  amelyre

$$\pi(b)\pi(a) = \pi(a)\pi(b) = \mathbf{1} + \text{Rad}(\mathcal{A}),$$

akkor létezik  $x \in \text{Rad}(\mathcal{A})$ , hogy  $ab = \mathbf{1} + x$ , de akkor  $r(x) = \{0\}$  miatt  $ab$  invertálható, amiből következik, hogy  $a$ -nak létezik jobb inverze. Hasonlóan kapjuk, hogy  $a$ -nak létezik bal inverze is, azaz  $a \in G(\mathcal{A})$ .  $\square$

Az alábbiakban megmutatjuk, hogy minden  $C^*$ -algebra félig-egyszerű. Ehhez szükségünk lesz az alábbi lemmára:

2.0.9. Lemma. *Egységelemes  $C^*$ -algebrában bármely önadjungált balinvertálható elem invertálható.*

*Bizonyítás.* Legyen  $a \in \mathcal{A}$  önadjungált, balinvertálható elem, és  $b \in \mathcal{A}$  olyan, hogy  $ba = \mathbf{1}$ . Ekkor

$$b = bab = (bab) = b = b,$$

azaz  $b = b$ . Ebből pedig már következik, hogy  $ab = (ba) = \mathbf{1} = \mathbf{1}$ , azaz  $b$  jobb inverze is  $a$ -nak.  $\square$

2.0.10. Tétel. *Minden egységelemes  $C^*$ -algebra félig-egyszerű.*

*Bizonyítás.* Legyen  $\mathcal{A}$  egységelemes  $C^*$ -algebra és  $a \in \text{Rad}(\mathcal{A})$ . Tegyük fel indirekt, hogy  $a \neq 0$ , akkor  $r(a) = \|a\| = \|a\|^2 > 0$ . Legyen  $\lambda \in \text{Sp}(a)$  olyan (az önadjungált elemek spektrumának valós volta miatt szükségképpen valós) szám, hogy  $\lambda = r(a)$ , akkor  $\lambda \mathbf{1} - a$  nem invertálható, vagy ami ezzel ekvivalens,  $\mathbf{1} - \frac{1}{\lambda}a$  nem invertálható. Mivel  $a \in \text{Rad}(\mathcal{A})$  és  $\text{Rad}(\mathcal{A}) \subseteq \mathcal{A}$  balideál, ezért  $\frac{1}{\lambda}a \in \text{Rad}(\mathcal{A})$ , következésképp  $\mathbf{1} - \frac{1}{\lambda}a$  balinvertálható. Azonban  $\mathbf{1} - \frac{1}{\lambda}a$  önadjungált, ezért invertálható is, ami ellentmondás. Azaz  $\text{Rad}(\mathcal{A}) = \{0\}$ , tehát  $\mathcal{A}$  félig-egyszerű.  $\square$

2.0.11. Tétel. *Ha  $E$  Banach-tér, akkor  $\mathcal{B}(E)$  félig-egyszerű.*

*Bizonyítás.* Rögzített nem nulla  $u \in E$  vektor mellett jelölje

$$\mathcal{I}_u = \{T \in \mathcal{B}(E) \mid Tu = 0\},$$

akkor  $\mathcal{I}_u$  valódi balideál. Megmutatjuk, hogy  $\mathcal{I}_u$  maximális balideál. Legyen ugyanis  $\mathcal{I}$  olyan balideál, amelyre  $\mathcal{I}_u \subseteq \mathcal{I}$ . Világos, hogy ekkor az

$$E_0 = \mathcal{I}u = \{Tu \mid T \in \mathcal{I}\}$$

olyan lineáris altér, amelyre  $E_0 \neq \{0\}$  és amely minden  $T \in \mathcal{B}(E)$  operátor esetén  $T$ -invariáns. Könnyen látható, hogy emiatt  $E_0 = E$ . Speciálisan  $u \in E_0$ , azaz létezik  $U \in \mathcal{I}$  amelyre  $Uu = u$ . Bármely  $T \in \mathcal{B}(E)$  mellett  $TU - T \in \mathcal{I}_u$  és  $TU \in \mathcal{I}$ , ezért  $T = (TU - T) + TU \in \mathcal{I}_u + \mathcal{I} \subseteq \mathcal{I}$ , amiből kapjuk, hogy  $\mathcal{I} = \mathcal{B}(E)$ , amivel megmutattuk, hogy  $\mathcal{I}_u$  maximális balideál. Ebből pedig következik, hogy

$$\text{Rad}(\mathcal{B}(E)) \subseteq \bigcap_{u \in E \setminus \{0\}} \mathcal{I}_u,$$

amiből pedig már egyszerre következik, hogy  $\text{Rad}(\mathcal{B}(E)) = \{0\}$ , ugyanis a metszetben csak olyan operátor lehet, amely minden nem nulla vektort a nullvektorba visz, ez azonban csakis a 0 operátor lehet.  $\square$

## 3. fejezet

# Johnson automatikus folytonossági tétele

Az alábbiakban két különböző bizonyítást adunk Johnson folytonossági tételére. Az első bizonyítás az előző fejezetben kiépített reprezentációelméleti eszközöket használja, a második Ransford bizonyítása.

3.0.1. Tétel. (Johnson) Legyen  $\mathcal{A}$  tetszőleges,  $\mathcal{B}$  pedig félig-egyszerű Banach-algebra. Ekkor minden  $\phi : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$  szürjektív homomorfizmus folytonos.

*Bizonyítás.* Tegyük fel indirekt, hogy  $\phi : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$  teljesíti a fenti feltételeket, de nem folytonos. Ekkor  $\phi$  nem zárt, azaz létezik olyan  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{A}$  sorozat, hogy  $a_n$  nullához tart, de  $\phi(a_n)$  egy nemnulla  $b \in \mathcal{B}$  elemhez konvergál. Mivel  $\mathcal{B}$  félig-egyszerű, és  $b \neq 0$ , létezik  $\mathcal{B}$ -nek egy olyan  $T$  irreducibilis reprezentációja, amelyre  $T_b \neq 0$ . Mivel  $\phi$  szürjektív, ezért  $T \circ \phi$  egy irreducibilis normált reprezentációja  $\mathcal{A}$ -nak, tehát a korábbiak alapján folytonos. Így  $T$  folytonosságából következik, hogy a  $\{T_{\phi(a_n)}\}_{n \in \mathbb{N}}$  sorozat a nemnulla  $T_b$  operátorhoz tart, de  $T \circ \phi$  folytonosságából kapjuk, hogy  $T_{\phi(a_n)} = (T \circ \phi)(a_n)$  nullához konvergál. Ezzel az ellentmondással beláttuk a tételt.  $\square$

Az alábbiakban bebizonyítjuk Johnson tételét a Ransford-lemmán keresztül is.

3.0.2. Lemma. (Ransford) Legyen  $\mathcal{A}$  egységelemes komplex Banach-algebra, továbbá legyenek  $a_0, a_1, \dots, a_k \in \mathcal{A}$  tetszőlegesek, valamint vezessük be a

$$p(z) := \sum_{j=0}^k z^j a_j, \quad (z \in \mathbb{C})$$

egyenlőséggel értelmezett  $p : \mathbb{C} \rightarrow \mathcal{A}$  függvényt. Ekkor bármely  $R > 0$  szám esetén fennáll, hogy

$$\sup_{t \in [0, 2\pi]} r(p(e^{it}))^2 \leq \sup_{t \in [0, 2\pi]} r(p(Re^{it})) \cdot \sup_{t \in [0, 2\pi]} r(p(R^{-1}e^{it}))$$

*Bizonyítás.* Az  $a_j$  elemek  $e^{it}a_j$ -re való lecserélésével látható, hogy elég a

$$\sup_{t \in [0, 2\pi]} r(p(1))^2 \leq \sup_{t \in [0, 2\pi]} r(p(Re^{it})) \cdot \sup_{t \in [0, 2\pi]} r(p(R^{-1}e^{it}))$$



egyenl tlenséget belátni. A Hahn-Banach-tétel értelmében létezik olyan  $f \in \mathcal{A}^0$ ,  $\|f\| = 1$  folytonos lineáris funkcionál, amelyre  $f(p(1)) = \|p(1)\|$ , valamint vezessük be a

$$q(z) := f(p(z)) = \sum_{j=0}^k \beta_j z^j, \quad (z \in \mathbb{C})$$

komplex együtthatós polinomot, ahol  $\beta_j = f(a_j)$ . Ekkor

$$\|p(1)\|^2 = |f(p(1))|^2 = |q(1)|^2 = \left| \sum_{j=0}^k \beta_j \right|^2.$$

A Cauchy-Schwarz egyenl tlenséget kétszer alkalmazva kapjuk, hogy

$$\begin{aligned} \left| \sum_{j=0}^k \beta_j \cdot 1 \right|^2 &\leq (k+1) \cdot \sum_{j=0}^k |\beta_j|^2 \\ &= (k+1) \cdot \sum_{j=0}^k (R^j |\beta_j|)(R^{-j} |\beta_j|) \\ &\leq (k+1) \cdot \left( \sum_{j=0}^k R^{2j} |\beta_j|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \left( \sum_{j=0}^k R^{-2j} |\beta_j|^2 \right)^{\frac{1}{2}}, \end{aligned}$$

vagyis

$$\|p(1)\|^2 \leq (k+1) \cdot \left( \sum_{j=0}^k R^{2j} |\beta_j|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \left( \sum_{j=0}^k R^{-2j} |\beta_j|^2 \right)^{\frac{1}{2}}$$

Vegyük észre, hogy

$$\begin{aligned} \sum_{j=0}^k |\beta_j|^2 R^{2j} &= \sum_{j=0}^k \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |\beta_j R^j e^{itj}|^2 dt \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \sum_{j=0}^k |\beta_j R^j e^{itj}|^2 dt \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \left| \sum_{j=0}^k \beta_j R^j e^{itj} \right|^2 dt \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |q(Re^{it})|^2 dt, \\ &\leq \sup_{t \in [0, 2\pi]} |q(Re^{it})|^2 \\ &\leq \sup_{t \in [0, 2\pi]} \|p(Re^{it})\|^2 \end{aligned}$$

és hasonlóan megmutatható, hogy

$$\sum_{j=0}^k |\beta_j|^2 R^{-2j} \leq \sup_{t \in [0, 2\pi]} \|p(R^{-1}e^{it})\|^2$$

amiből figyelembe véve az első egyenletenségünket, kapjuk hogy

$$\|p(1)\|^2 \leq (k+1) \sup_{t \in [0, 2\pi]} \|p(Re^{it})\|^2 \cdot \sup_{t \in [0, 2\pi]} \|p(R^{-1}e^{it})\|^2$$

Vegyük észre, hogy a fenti egyenlet tetszőleges  $p: \mathbb{C} \rightarrow \mathcal{A}$   $\mathcal{A}$ -együtthatós polinomra fennáll, így azt  $p$  helyett rögzített pozitív egész  $n$  számra  $p^n$ -re alkalmazva, és figyelembe véve, hogy  $\deg(p^n) = nk$  kapjuk, hogy

$$\|p(1)^n\|^2 \leq (nk+1) \sup_{t \in [0, 2\pi]} \|p^n(Re^{it})\|^2 \cdot \sup_{t \in [0, 2\pi]} \|p^n(R^{-1}e^{it})\|^2$$

Végül vezessük be tetszőleges pozitív  $n$  egész számra az

$$f_n(t) = \|p(Re^{it})^{2n}\|^{\frac{1}{2n}}, \quad (t \in [0, 2\pi])$$

Világos, hogy  $f_n: [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}$  folytonos függvény, melyre  $0 \leq f_{n+1} \leq f_n$ , ugyanis

$$f_{n+1}(t) = (\|p(Re^{it})^{2n} \cdot p(Re^{it})\|)^{\frac{1}{2n+1}}$$

ami a norma szubmultiplikatívitasát használva

$$\begin{aligned} &\leq (\|p(Re^{it})^{2n}\|^{\frac{1}{2n}})^{\frac{1}{2}} \cdot \|p(Re^{it})\|^{\frac{1}{2n+1}} \\ &= f_n(t)^{\frac{1}{2}} \cdot \|p(Re^{it})\|^{\frac{1}{2n+1}} \end{aligned}$$

továbbá a spektrálsugár-tétel szerint  $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$  pontonként tart az

$$f(t) := p(Re^{it}), \quad t \in [0, 2\pi]$$

egyenletiséggel értelmezett  $f: [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}_+$  függvényhez. Mivel  $f$  nem feltétlenül folytonos, így a konvergencia nem feltétlenül egyenletes. Igaz azonban a következő:

$$\|f_n\|_1 \rightarrow \|f\|_1.$$

A  $0 \leq f_{n+1} \leq f_n$  egyenletiség miatt tudjuk, hogy  $\|f\|_1 \leq \alpha := \liminf_{n \rightarrow \infty} \|f_n\|_1$ . Megfordítva, ha  $\epsilon > 0$  tetszőleges valós szám, akkor a

$$K_n := \{f_n \geq \alpha - \epsilon\}$$

jelöléssel  $(K_n)_{n \in \mathbb{N}}$  csupa nem-üres kompakt halmazokból álló sorozat, amelyre  $K_{n+1} \subseteq K_n$ , ezért a Cantor-tétel miatt létezik olyan  $x \in [0, 2\pi]$ , amelyre  $x \in K_n, \forall n \in \mathbb{N}^+$ . Ez azt jelenti, hogy  $f_n(x) \geq \alpha - \epsilon$  minden  $n$ -re, amiből  $\|f\|_1 \geq f(x) \geq \alpha - \epsilon$ , és így  $\|f\|_1 \geq \alpha$  következik. Hasonlóan igazolható, hogy fennáll a

$$g_n(t) = \|p(R^{-1}e^{it})^{2n}\|^{\frac{1}{2n}}, \quad g(t) := r(p(R^{-1}e^{it})), \quad t \in [0, 2\pi]$$

függvényekre a  $\|g_n\|_1 \rightarrow \|g\|_1$  összefüggés. Mivel a

$$\|p(1)^n\|^2 \leq (nk + 1) \sup_{t \in [0, 2\pi]} \|p^n(Re^{it})\|^2 \cdot \sup_{t \in [0, 2\pi]} \|p^n(R^{-1}e^{it})\|^2$$

egyenltlenség  $2^n$ -edik gyökvonás után éppen azt jelenti, hogy

$$\|p(1)^{2^n}\|^{\frac{2}{2^n}} \leq (2^n k + 1)^{\frac{1}{2^n}} \|f_n\|_1 \|g_n\|_1,$$

ezért ebből az  $n \rightarrow \infty$  határátmenettel  $\|f_n\|_1 \rightarrow \|f\|_1$ ,  $\|g_n\|_1 \rightarrow \|g\|_1$  figyelembevételével éppen a bizonyítandó

$$\sup_{t \in [0, 2\pi]} r(p(1))^2 \leq \sup_{t \in [0, 2\pi]} r(p(Re^{it})) \cdot \sup_{t \in [0, 2\pi]} r(p(R^{-1}e^{it}))$$

egyenltlenséget kapjuk. □

3.0.3. Tétel. (Johnson) Legyenek  $\mathcal{A}$  és  $\mathcal{B}$  egységelemes komplex Banach-algebrák,  $\mathcal{B}$  félig-egyszerű. Ekkor minden  $\phi: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$  szürjektív algebra-homomorfizmus folytonos.

*Bizonyítás.* A korábbi bizonyításhoz hasonlóan, elég megmutatni, hogy  $\phi$  zárt leképezés. Tegyük fel tehát, hogy  $a_n \rightarrow 0$  és  $\phi(a_n) \rightarrow b$  valamely  $\mathcal{A}$ -ban haladó  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$  sorozatra és  $b \in \mathcal{B}$ -re. Azt kell megmutatni tehát, hogy  $b = 0$ , vagy ami ezzel ekvivalens, hogy  $b \in \text{Rad}(\mathcal{B})$ . Rögzítsünk egy  $a \in \mathcal{A}$  elemet, hogy  $\phi(a) = b$  és minden  $n \geq 1$  egész mellett vezessük be a következő függvényt:

$$p_n(z) = z\phi(a_n) + (\phi(a) - \phi(a_n)), \quad z \in \mathbb{C}.$$

A normára vonatkozó háromszög-egyenltlenség és az  $r(x) \leq \|x\|$  egyenltlenség adódik, hogy bármely  $z \in \mathbb{C}$  számra

$$r(p_n(z)) \leq |z| \|\phi(a_n)\| + \|\phi(a) - \phi(a_n)\|,$$

vagyis tetszőleges  $R > 0$  szám mellett  $z = R^{-1}e^{it}$  ( $t \in [-\pi, \pi]$ ) választással

$$r(p_n(R^{-1}e^{it})) \leq R^{-1} \|\phi(a_n)\| + \|\phi(a) - \phi(a_n)\|.$$

Másrészt  $\phi$  szürjektívességéből látható, hogy  $\phi$  egységelem tartó. Tegyük fel ugyanis, hogy  $\phi(1) = a$ . Vegyük észre, hogy  $\phi$  szürjektívessége miatt  $a \neq 0$ . Ekkor tetszőleges  $x \in \mathcal{B}$ -re létezik  $y \in \mathcal{B}$  hogy  $x = ay$ . Azonban  $\phi$  szürjektívessége miatt tudjuk, hogy léteznek  $a_1, a_2 \in \mathcal{A}$  elemek, amelyekre  $\phi(a_1) = x, \phi(a_2) = y$ , azaz  $\phi(a_1) = a\phi(a_2) = \phi(a_1) = \phi(1)\phi(a_2)$ , amiből  $x = y$ , amiből könnyen látható, hogy  $a$  bal egység  $\mathcal{B}$ -ben. Hasonlóan belátható, hogy  $a$  jobb egység, azaz  $\phi(1) = 1$ . Mivel  $\phi$  egységelem tartó, ezért bármely  $x \in \mathcal{A}$  elem spektrumára fennáll  $Sp(\phi(x)) \subseteq Sp(x)$  és így  $r(\phi(x)) \leq r(x)$  is. Következésképp

$$r(p_n(z)) = r(\phi(za_n + (a - a_n))) \leq r(za_n + (a - a_n)) \leq |z| \|a_n\| + \|a - a_n\|,$$

így  $R > 0$  mellett  $z = Re^{it}$  ( $t \in [-\pi, \pi]$ ) választással

$$r(p_n(Re^{it})) \leq R \|a_n\| + \|a - a_n\|.$$

Mivel  $p_n(1) = \phi(a) = b$ , ezért a Ransford-lemma valamint az  $r(p_n(Re^{it}))$  és  $r(p_n(R^{-1}e^{it}))$ -re bizonyított egyenlőségekből kapjuk, hogy

$$r(b)^2 \leq (R\|a_n\| + \|a - a_n\|) \cdot (R^{-1}\|\phi(a_n)\| + \|\phi(a) - \phi(a_n)\|)$$

teljesül minden  $n$  természetes számra és  $R$  pozitív valós számra. Mivel  $a_n \rightarrow 0$  és  $\phi(a_n) \rightarrow b$ , ezért az  $n \rightarrow \infty$  határetmenetet véve kapjuk, hogy

$$r(b)^2 \leq R^{-1}\|a\|\|b\|.$$

Mivel ez tetszőleges  $R > 0$  számra fennáll, ebből kapjuk, hogy  $r(b) = 0$ . Megmutatjuk, hogy  $b \in \text{Rad}(\mathcal{B})$ , amihez a korábbiak szerint elég megmutatni, hogy  $r(b^\theta b) = 0 \forall b^\theta \in \mathcal{B}$ -re. Legyen  $a^\theta \in \mathcal{A}$  olyan elem, amelyre  $\phi(a^\theta) = b^\theta$ , akkor  $b^\theta a_n \rightarrow 0$  és  $\phi(a^\theta a_n) \rightarrow b^\theta b$ . Vegyük észre, hogy a bizonyítás első felében megmutattuk, hogy  $r(y) = 0$  minden olyan  $y \in \mathcal{B}$  elemre, amelyhez létezik olyan  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathcal{A}$  sorozat, amelyre  $x_n \rightarrow 0$  és  $\phi(x_n) \rightarrow y$ . Ebből pedig következik, hogy az  $y = b^\theta b$  elemre is  $r(b^\theta b) = 0$  teljesül, amivel megmutattuk, hogy  $b \in \text{Rad}(\mathcal{B}) = \{0\}$ , vagyis a zárt gráf tétel szerint  $\phi$  folytonos.  $\square$

Egy algebra radikálja, és így félig-egyszerősége is tisztán algebrai fogalom. Ezért meglep az alábbi, szintén Johnson-tól származó tétel:

3.0.4. Következmény. *Ha  $\mathcal{A}$  félig-egyszerős komplex egységelemes algebra, akkor ekvivalencia erejéig legfeljebb egy olyan norma létezik  $\mathcal{A}$ -n, amellyel az Banach-algebra.*

*Bizonyítás.* Tegyük fel, hogy  $\|\cdot\|$  és  $\|\cdot\|^\theta$  mindkettőn olyan normák  $\mathcal{A}$ -n, amellyel az Banach-algebra. Ekkor az előző tétel szerint az

$$id : (\mathcal{A}, \|\cdot\|) \rightarrow (\mathcal{A}, \|\cdot\|^\theta)$$

homeomorfizmus (mivel nyilván bijektív algebra-homomorfizmus), ami azt jelenti, hogy a  $\|\cdot\|$  és  $\|\cdot\|^\theta$  normák ekvivalensek.  $\square$

### 3.0.1. Félig-egyszerű kommutatív Banach-algebrák

Az alábbi alfejezetben megmutatjuk Johnson tételének egy kommutatív Banach-algebrákra való élesítését. Világos, hogy ha az  $\mathcal{A}$  algebra kommutatív, akkor  $\mathcal{A}$  minden baloldali ideálja kétoldali ideál, ezért ekkor az  $\mathcal{A}$  Jacobson-radikálja megegyezik az  $\mathcal{A}$  maximális ideáljainak metszetével. A következő tétel kommutatív Banach-algebrák félig-egyszerőségének ekvivalens jellemzését adja:

3.0.5. Tétel. *Legyen  $\mathcal{A}$  kommutatív egységelemes komplex Banach-algebra. Ekkor a következők ekvivalensek:*

1.  $\mathcal{A}$  félig-egyszerű,
2. az  $\mathcal{A}$  Gelfand-reprezentációja injektív,
3. bármely  $a \in \mathcal{A}$  elemre  $r(a) = 0$  pontosan akkor, ha  $a = 0$ ,
4. bármely  $a \in \mathcal{A}$  elemre  $Sp(a) = \{0\}$  pontosan akkor, ha  $a = 0$ ,

5.  $X(\mathcal{A})$  szeparálja  $\mathcal{A}$  pontjait.

*Bizonyítás.* A 3, és 4, kijelentések ekvivalenciája világos. Legyen  $\Gamma$  az  $\mathcal{A}$  Gelfand-reprezentációja, akkor 4, szerint  $\Gamma(a) = 0$  pontosan akkor, ha  $Sp(a) = \{0\}$ , amiből kapjuk 2, és 4, ekvivalenciáját. Az  $\mathcal{A}$  algebra ideáljai éppen az  $\mathcal{A}$  karaktereinek magterei, vagyis  $\text{Rad}(\mathcal{A})$  el áll

$$\text{Rad}(\mathcal{A}) = \bigcap_{\chi \in X(\mathcal{A})} \ker(\chi)$$

alakban, azaz  $a \in \text{Rad}(\mathcal{A})$  pontosan akkor, ha  $\chi(a) = 0$  minden  $\chi \in X(\mathcal{A})$ -re, azaz  $\Gamma(a) = 0$ . Ezzel bebizonyítottuk, hogy

$$\text{Rad}(\mathcal{A}) = \ker \Gamma,$$

amiből az 1,  $\Leftrightarrow$  2, ekvivalencia adódik. Az 5, és 2, ekvivalenciájához tegyük fel először, hogy  $X(\mathcal{A})$  szeparálja  $\mathcal{A}$  pontjait. Ekkor tetszőleges  $a \neq 0$  elemhez létezik  $\chi \in X(\mathcal{A})$  amelyre  $\chi(a) \neq 0$ , azaz  $a \notin \ker \chi$ , vagyis  $\ker \chi = \{0\}$ , vagyis  $\chi$  injektív. Megfordítva, tegyük fel, hogy  $\Gamma$  injektív, és legyenek  $a, b \in \mathcal{A}$  olyan elemek, hogy  $a \neq b$ , akkor  $\Gamma(a) \neq \Gamma(b)$ , következésképp létezik  $\chi \in X(\mathcal{A})$ , hogy  $\Gamma(a)(\chi) \neq \Gamma(b)(\chi)$  azaz  $\chi(a) \neq \chi(b)$  ami éppen azt jelenti, hogy  $X(\mathcal{A})$  szeparálja  $\mathcal{A}$  pontjait.  $\square$

3.0.6. Következmény. *Egy egységelemes komplex Banach-algebra pontosan akkor félig-egyszerű, ha felette a spektrálsugár függvény norma.*

*Bizonyítás.* Tudjuk, hogy kommutatív egységelemes komplex Banach-algebra fölött a spektrálsugár mindig algebra-félnorma. Az előző tétel szerint tehát  $r$  pontosan akkor algebra-norma, ha az algebra félig-egyszerű.  $\square$

3.0.7. Tétel. *Ha  $\mathcal{A}$  egységelemes komplex Banach-algebra,  $\mathcal{B}$  félig-egyszerű kommutatív egységelemes komplex Banach-algebra, akkor minden  $\pi : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$  egységelem tartó algebra-homomorfizmus automatikusan folytonos.*

*Bizonyítás.* A zárt gráf tétel szerint elég megmutatnunk, hogy a

$$\text{graf}(\pi) = \{(a, \pi(a)) \mid a \in \mathcal{A}\} \subseteq \mathcal{A} \times \mathcal{B}$$

zárt az  $\mathcal{A} \times \mathcal{B}$  szorzattérben. Legyen tehát  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$  olyan  $\mathcal{A}$ -ban haladó sorozat, amelyre  $a_n \rightarrow 0$  és  $\pi(a_n) \rightarrow b$  valamilyen  $b \in \mathcal{B}$ -re. Azt kell megmutatnunk, hogy  $b = 0$ . Mivel  $\mathcal{B}$  félig-egyszerű ez azzal ekvivalens, hogy  $\chi(b) = 0$  minden  $\chi \in X(\mathcal{B})$  karakterre. Rögzítsünk egy  $\chi \in X(\mathcal{B})$  karaktert és vezessük be a

$$\psi(a) = \chi(\pi(a)), \quad a \in \mathcal{A}$$

egyenlőséggel értelmezett  $\psi : \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{C}$  függvényt. Világos, hogy  $\psi$  karakter, mivel  $\chi$  karakter,  $\pi$  pedig algebra-homomorfizmus, azaz  $\psi$  multiplikatív és lineáris  $\mathcal{A} \rightarrow \mathbb{C}$  függvény. Mivel  $\psi$  karakter, ennél fogva folytonos, azaz  $a_n \rightarrow 0$  miatt  $\psi(a_n) \rightarrow 0$ , ugyanakkor  $\chi$  folytonossága és  $\pi(a_n) \rightarrow b$  miatt

$$\psi(a_n) = \chi(\pi(a_n)) \rightarrow \chi(b),$$

azaz  $\chi(b) = 0$ .  $\square$

## 4. fejezet

# Eidelheit tétele

Ebben a fejezetben Eidelheit egy tételét tárgyaljuk, amely két Banach-tér standard operátoralgebraja közötti algebra-izomorfizmusok lehetséges alakját karakterizálja.

4.0.1. Lemma. *Legyen  $X$  normált tér, ekkor egy  $T \in \mathcal{B}(X)$  nemnulla operátor pontosan akkor egy-rangú, ha minden  $S \in \mathcal{B}(X)$  operátor esetén  $(ST)^2 = \lambda ST$  teljesül valamely  $\lambda$  szám esetén.*

*Bizonyítás.* Ha  $T \in \mathcal{B}(X)$  egy-rangú akkor létezik  $z \in X$  és  $f \in X^*$  hogy  $T$  el áll  $T = z \otimes f$  alakban, ahol  $z \otimes f$  úgy hat egy tetszőleges  $x \in X$  vektoron, hogy  $(z \otimes f)x = f(x)z$ . Mivel bármely  $S \in \mathcal{B}(X)$  operátor esetén  $ST = (Sz) \otimes f$ , ezért

$$(ST)^2 = STST = (STSz) \otimes f$$

Mivel  $TSz \in \text{ran } T = \mathbb{C}z$ , ezért  $TSz = \lambda z$  valamilyen alkalmas  $\lambda$  komplex számra. Azaz

$$(STSz) \otimes f = (\lambda Sz) \otimes f = \lambda ST,$$

azaz  $(ST)^2 = \lambda ST$ .

Megfordítva, tegyük fel hogy  $T$  rendelkezik a fenti tulajdonsággal és tegyük fel indirekten, hogy  $T$  nem egy-rangú. Ekkor léteznek  $x_1, x_2, y_1, y_2 \in X$  úgy hogy  $Tx_j = y_j$  ( $j = 1, 2$ ) úgy, hogy  $y_1, y_2$  lineárisan függetlenek. Legyenek továbbá  $\varphi_1, \varphi_2 \in X^*$  -beli folytonos lineáris funkcionálok úgy, hogy  $\varphi_2(y_1) = \varphi_1(y_2) = 1$  és  $\varphi_1(y_1) = \varphi_2(y_2) = 0$ , és legyen  $S = x_1 \otimes \varphi_1 + x_2 \otimes \varphi_2$ . Ekkor  $(ST)x_2 = x_1$  és  $(ST)^2x_2 = x_2$ , azaz  $x_2 \in \mathbb{C}x_1$  amiből következik, hogy  $y_2 \in \mathbb{C}y_1$ , ami ellentmondás.

Tehát beláttuk, hogy  $T$  egy-rangú. □

4.0.2. Tétel. (Eidelheit) *Legyenek  $X$  és  $Y$  Banach-terek és legyen  $\Phi : \mathcal{B}(X) \rightarrow \mathcal{B}(Y)$  algebra-izomorfizmus. Ekkor létezik olyan  $T : X \rightarrow Y$  lineáris homeomorfizmus, hogy*

$$\Phi(A) = TAT^{-1}, \quad A \in \mathcal{B}(X).$$

*Bizonyítás.* Rögzítsünk egy  $x_0 \in X$  nemnulla vektort és ehhez egy  $f_0 \in X^*$  funkcionált, amelyre  $f_0(x_0) = 1$ . Ekkor a

$$P_0 := x_0 \otimes f_0$$

egyenl séggel definiált lineáris operátor egy-rangú idempotens. Az egy-rangúság az el bbi lemma következménye, az pedig hogy  $P$  idempotens könnyen látszik abból, hogy  $f_0(x_0) = 1$ , ugyanis tetsz leges  $x \in X$  vektorra

$$P^2x = P(x_0 \otimes f_0)x = P(f_0(x)x_0) = f_0(x) \cdot f_0(x_0) \cdot x_0 = f_0(x) \cdot 1 \cdot x_0 = Px.$$

Világos, hogy a  $Q_0 := \Phi(P_0)$  operátor is idempotens, hiszen algebra-homomorfizmus idempotens elemeket idempotensbe képez. Megmutatjuk, hogy  $Q_0$  is egy-rangú, legyen ugyanis  $S \in \mathcal{B}(Y)$  egy tetsz leges operátor, akkor  $\Phi$  szürjektivitása miatt létezik  $S_0 \in \mathcal{B}(X)$ , hogy  $\Phi(S_0) = S$ . Az el z lemma szerint  $(S_0P_0)^2 = \lambda S_0P_0$  valamely  $\lambda \in \mathbb{C}$  számra, ezért

$$(SQ_0)^2 = \Phi(S_0P_0)^2 = \lambda\Phi(S_0P_0) = \lambda SQ_0,$$

amib l az el z lemmát alkalmazva kapjuk, hogy  $Q_0$  egy-rangú. Emiatt létezik olyan  $y_0 \in Y$  nem-nulla vektor és  $g_0 \in Y^*$   $g_0(y_0) = 1$  funkcionál, hogy

$$Q_0 = y_0 \otimes g_0.$$

Legyen  $x \in X$  tetsz leges vektor és legyen  $U \in \mathcal{B}(X)$  olyan, hogy  $Ux_0 = x$  (ilyen operátor létezik, ugyanis  $x \otimes f_0$  ilyen). Definiáljuk a  $T : X \rightarrow Y$  leképezést a következ képp:

$$Tx := \Phi(U)y_0, \quad x \in X, Ux_0 = 0.$$

Megmutatjuk, hogy  $T$  jóldefiniált, azaz értéke nem függ  $U$  megválasztásától. Legyenek ugyanis  $U_1, U_2 \in \mathcal{B}(X)$  olyanok, hogy  $U_1x_0 = U_2x_0 = x$ , akkor

$$U_1P_0 = U_1x_0 \otimes f_0 = U_2x_0 \otimes f_0 = U_2P_0,$$

ezért  $\Phi(U_1)Q_0 = \Phi(U_1P_0) = \Phi(U_2P_0) = \Phi(U_2)Q_0$ , amib l

$$\Phi(U_1)y_0 = \Phi(U_1)Q_0y_0 = \Phi(U_2)Q_0y_0 = \Phi(U_2)y_0,$$

azaz  $T$  jóldefiniált. A  $\Phi$  leképezés linearitásából nyilvánvaló, hogy  $T$  lineáris. Megmutatjuk, hogy  $T$  injektív: legyen  $x \in X$  olyan, hogy  $Tx = 0$ , azaz

$$\Phi(U)y_0 = 0,$$

ahol  $Ux_0 = x$ . Ekkor  $Q_0$  értelmezése alapján  $0 = \Phi(U)Q_0 = \Phi(UP_0)$ , ezért  $\Phi$  injektivitása miatt  $UP_0 = Ux_0 \otimes f_0 = 0$ , amib l következik, hogy  $Ux_0 = 0$  azaz  $x = 0$ . Megmutatjuk, hogy  $T$  szürjektív is: legyen  $y \in Y$  tetsz leges, és legyen  $V \in \mathcal{B}(Y)$  olyan, hogy  $Vy_0 = y$ . Legyen  $U = \Phi^{-1}(V)$ , akkor  $x = Ux_0$  választással  $T$  definíciója alapján

$$Tx = \Phi(U)y_0 = Vy_0 = y,$$

azaz megmutattuk, hogy  $T$  szürjektív. Végül megmutatjuk, hogy  $T$  lineáris homeomorfizmus, amihez elég megmutatni, hogy  $T$  folytonos. Vegyük észre, hogy mivel  $\mathcal{B}(Y)$  féligegyszerű, ezért  $\Phi$  az el z fejezetben tárgyalt Johnson-tétel alapján folytonos. Legyen

$(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$   $X$ -ben haladó nullsorozat és tekintsük az  $U_n := x_n \otimes f_0$  egyenlőséggel értelmezett operátorsorozatot. Világos, hogy minden  $n \in \mathbb{N}$ -re  $U_n x_0 = x_n$ , továbbá  $\|U_n\| = \|x_n\| \cdot \|f_0\| \rightarrow 0$ , következésképp  $\|\Phi(U_n)\| \rightarrow 0$ . Másfelől minden  $n$ -re  $Tx_n = \Phi(U_n)x_0$ , amiből  $Tx_n \rightarrow 0$ . Ezzel bebizonyítottuk hogy  $T : X \rightarrow Y$  lineáris homeomorfizmus. Végül belátjuk, hogy  $\Phi$  elártható  $\Phi(A) = TAT^{-1}$  alakban. Vegyük észre, hogy a  $T$  definíciója alapján tetszőleges  $U \in \mathcal{B}(X)$  operátor esetén

$$TUx_0 = \Phi(U)y_0$$

Legyen  $A \in \mathcal{B}(X)$  tetszőleges operátor és  $x \in X$  tetszőleges vektor. Ha most  $U \in \mathcal{B}(X)$  ismét olyan, hogy  $Ux_0 = x$ , akkor

$$TAx = TAUx_0 = \Phi(AU)y_0 = \Phi(A)\Phi(U)y_0 = \Phi(A)TUx_0 = \Phi(A)Tx.$$

Mivel a fenti egyenlőség minden  $x \in X$  vektor és  $A \in \mathcal{B}(X)$  operátor esetén igaz, ezért igaz a

$$TA = \Phi(A)T, \quad A \in \mathcal{B}(X)$$

egyenlőség is, amiből  $T$  bijektivitásából következik a

$$\Phi(A) = TAT^{-1}, \quad A \in \mathcal{B}(X)$$

egyenlőség is. □

4.0.3. Következmény. *Ha a  $\mathcal{B}(X)$  és  $\mathcal{B}(Y)$  algebrák izomorfak akkor az  $X$  és  $Y$  Banach-terek lineárisan homeomorfak.*

4.0.4. Következmény. *Ha  $X$  Banach-tér akkor  $\mathcal{B}(X)$  minden automorfizmusa belső.*

*Megjegyzés.* Igaz a tétel egy könnyen ellenőrizhető megfordítása is, nevezetesen ha  $X$  és  $Y$  Banach-terek,  $T : X \rightarrow Y$  lineáris homeomorfizmus, akkor az

$$A \mapsto TAT^{-1} \quad A \in \mathcal{B}(X)$$

hozzárendelés algebra-izomorfizmust definiál.



## 5. fejezet

# Herstein tétele

A következő fejezetben bevezetjük a Jordan-homomorfizmusok fogalmát, megmutatjuk néhány elemi tulajdonságukat, majd bebizonyítjuk Herstein egy tételét. Végül ennek egy alkalmazásaként belátjuk a Gleason-Zelazko-Kahane tételt.

5.0.1. Definíció. Legyenek  $\mathcal{A}$  és  $\mathcal{B}$  valós vagy komplex algebrák, akkor azt mondjuk, hogy a  $\Phi : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$  leképezés Jordan-homomorfizmus, ha  $\Phi$  lineáris és

$$\Phi(ab + ba) = \Phi(a)\Phi(b) + \Phi(b)\Phi(a) \quad a, b \in \mathcal{A}.$$

Felhasználva  $\Phi$  linearitását a  $b = a$  választással világos, hogy  $\Phi(a^2) = \Phi(a)^2$ . Megmutatjuk, hogy ez fordítva is igaz. Legyen ugyanis  $\Phi : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$  olyan lineáris leképezés amelyre  $\Phi(a^2) = \Phi(a)^2$ . Ekkor a

$$\Phi((a + b)^2) = \Phi(a + b)^2$$

azonosság és a linearitás miatt

$$\Phi(a^2) + \Phi(ab + ba) + \Phi(b^2) = \Phi(a)^2 + \Phi(a)\Phi(b) + \Phi(b)\Phi(a) + \Phi(b)^2,$$

amiből felhasználva hogy  $\Phi(x^2) = \Phi(x)^2$  kapjuk, hogy

$$\Phi(ab + ba) = \Phi(a)\Phi(b) + \Phi(b)\Phi(a),$$

azaz  $\Phi$  valóban Jordan-homomorfizmus. Ezzel beláttuk a következőt:

5.0.2. Állítás. Egy  $\Phi : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$  lineáris leképezés pontosan akkor Jordan-homomorfizmus, ha  $\Phi(a^2) = \Phi(a)^2$  minden  $a \in \mathcal{A}$  elemre.

5.0.3. Állítás. Legyen  $\Phi : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$  Jordan-homomorfizmus. Ekkor

$$\Phi(bab) = \Phi(b)\Phi(a)\Phi(b) \quad a, b \in \mathcal{A}.$$

*Bizonyítás.* Legyenek  $a, b \in \mathcal{A}$ , akkor

$$\Phi((ab + ba)b + b(ab + ba)) = \Phi(ab + ba)\Phi(b) + \Phi(b)\Phi(ab + ba)$$

$$\begin{aligned}
&= [\Phi(a)\Phi(b) + \Phi(b)\Phi(a)]\Phi(b) + \Phi(b)[\Phi(a)\Phi(b) + \Phi(b)\Phi(a)] \\
&= \Phi(a)\Phi(b)^2 + \Phi(b)^2\Phi(a) + 2\Phi(b)\Phi(a)\Phi(b)
\end{aligned}$$

másrészt

$$\begin{aligned}
\Phi((ab + ba)b + b(ab + ba)) &= \Phi(ab^2 + 2bab + b^2a) = \Phi(ab^2 + b^2a) + 2\Phi(bab) \\
&= \Phi(a)\Phi(b^2) + \Phi(b^2)\Phi(a) + 2\Phi(b)\Phi(a)\Phi(b).
\end{aligned}$$

A fenti két egyenlőséget összehasonlítva adódik az állítás. □

5.0.4. Következmény. *Bármely  $\Phi(a) : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$  Jordan-homomorfizmus és bármely  $n \in \mathbb{N}^+$  természetes számra fennáll, hogy*

$$\Phi(a^n) = \Phi(a)^n, \quad a \in \mathcal{A}$$

*Bizonyítás.* Az eddigiek alapján a formula igaz az  $n = 1, 2$  esetben, továbbá  $n \geq 3$  esetén az előbbi hármas szorzatra vonatkozó azonosságot felhasználva:

$$\Phi(a^n) = \Phi(aa^{n-2}a) = \Phi(a)\Phi(a^{n-2})\Phi(a)$$

amiből a bizonyítandó állítás teljes indukcióval következik. □

5.0.5. Állítás. *Ha  $\Phi : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$  Jordan-homomorfizmus, akkor*

$$\Phi(abc + cba) = \Phi(a)\Phi(b)\Phi(c) + \Phi(c)\Phi(b)\Phi(a), \quad a, b, c \in \mathcal{A}.$$

*Bizonyítás.* A hármas szorzat formulából adódik, hogy

$$\begin{aligned}
\Phi((a + c)b(a + c)) &= \Phi(a + c)\Phi(b)\Phi(a + c) \\
&= [\Phi(a) + \Phi(c)]\Phi(b)[\Phi(a) + \Phi(c)] \\
&= \Phi(a)\Phi(b)\Phi(a) + \Phi(a)\Phi(b)\Phi(c) \\
&\quad + \Phi(c)\Phi(b)\Phi(a) + \Phi(c)\Phi(b)\Phi(c)
\end{aligned}$$

másrészt

$$\begin{aligned}
\Phi((a + c)b(a + c)) &= \Phi(aba) + \Phi(abc + cba) + \Phi(cbc) \\
&= \Phi(a)\Phi(b)\Phi(a) + \Phi(abc + cba) + \Phi(c)\Phi(b)\Phi(c)
\end{aligned}$$

amit az előző egyenlőséggel összevetve éppen a bizonyítandó állítás adódik. □

5.0.6. Lemma. *Tetszőleges  $\Phi : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$  Jordan-homomorfizmus és  $a, b \in \mathcal{A}$  esetén*

$$[\Phi(ab) - \Phi(a)\Phi(b)][\Phi(ab) - \Phi(b)\Phi(a)] = 0,$$

*illetve*

$$[\Phi(ab) - \Phi(b)\Phi(a)][\Phi(ab) - \Phi(a)\Phi(b)] = 0.$$

*Bizonyítás.* Az el z állítás és a hármas szorzat formula felhasználásával

$$\begin{aligned} & [\Phi(ab) - \Phi(a)\Phi(b)][\Phi(ab) - \Phi(b)\Phi(a)] \\ &= \Phi(ab)^2 - [\Phi(ab)\Phi(b)\Phi(a) + \Phi(a)\Phi(b)\Phi(ab)] + \Phi(a)\Phi(b)^2\Phi(a) \\ &= \Phi(abab - ab^2a - abab + ab^2a) = \Phi(0) = 0. \end{aligned}$$

A második formula hasonlóan bizonyítható.  $\square$

5.0.7. Lemma. Legyen  $\Phi : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$  Jordan-homomorfizmus, és  $a, e \in \mathcal{A}$  úgy, hogy  $e^2 = e$  és  $ae = ea$ . Ekkor  $\Phi(e)^2 = \Phi(e)$  és  $\Phi(ae) = \Phi(a)\Phi(e) = \Phi(e)\Phi(a)$ .

*Bizonyítás.* Az hogy  $\Phi(e)$  idempotens nyilvánvaló a Jordan-homomorfizmusok azon tulajdonságából hogy  $\Phi(a^2) = \Phi(a)^2$ . Másrészt

$$\Phi(ae) = \Phi(aee) = \Phi(eae) = \Phi(a)\Phi(e)\Phi(e) = \Phi(a)\Phi(e).$$

Hasonlóan,

$$\Phi(ea) = \Phi(eea) = \Phi(eae) = \Phi(e)\Phi(e)\Phi(a) = \Phi(e)\Phi(a).$$

$\square$

5.0.8. Következmény. Ha  $\mathcal{A}$  egységelemes algebra akkor minden  $a \in \mathcal{A}$  elemre,  $\mathcal{B}$  egységelemes algebrára és  $\Phi : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$  Jordan-homomorfizmusra  $\Phi(a)\Phi(\mathbf{1}) = \Phi(\mathbf{1})\Phi(a) = \Phi(a)$ . Ha  $\Phi$  szürjektív, akkor  $\Phi(\mathbf{1})$  a  $\mathcal{B}$  egységeleme.

5.0.9. Definíció. Egy  $\mathcal{B}$  algebrát *prím* algebrának nevezünk, ha  $x, y \in \mathcal{B}$  elemekre  $x\mathcal{B}y = \{0\}$  esetén  $x = 0$  vagy  $y = 0$  teljesül.

5.0.10. Lemma. Legyen  $\mathcal{B}$  prím algebra. Ha valamely  $u, v \in \mathcal{B}$  elemekre  $ubv + vbu = 0$  teljesül minden  $b \in \mathcal{B}$  elemre, akkor  $u = 0$  vagy  $v = 0$ .

*Bizonyítás.* Legyenek  $x, y \in \mathcal{B}$  tetsz legesek, ekkor  $b = xuy$  választással a feltételb l kapjuk, hogy

$$uxuyv + vxuyu = 0,$$

ugyanakkor  $vxu = -uxv$  és  $uyv = -vyu$ , amit a fenti egyenl ségbe behelyettesítve kapjuk, hogy

$$0 = -uxvyu - uxvyu,$$

azaz  $uxvyu = 0$  minden  $x, y \in \mathcal{B}$  elem esetén. Rögzítsük le most az  $y$  elemet, ekkor kapjuk, hogy  $u\mathcal{B}vyu = \{0\}$ , és mivel  $\mathcal{B}$  prím algebra, ebb l következik, hogy  $u = 0$  vagy  $vyu = 0$ . Ez utóbbi azonban tetsz leges  $y \in \mathcal{B}$  elemre fenn kell, hogy álljon, ezért  $v\mathcal{B}u = \{0\}$ , ami csak úgy lehet ha  $v = 0$  vagy  $u = 0$ .  $\square$

5.0.11. Definíció. Legyenek  $\mathcal{A}$  és  $\mathcal{B}$  algebrák. Azt mondjuk, hogy a  $\Phi : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$  lineáris leképezés algebra-antihomomorfizmus, ha

$$\Phi(ab) = \Phi(b)\Phi(a), \quad a, b \in \mathcal{A}$$

5.0.12. Tétel. (Herstein) Legyenek  $\mathcal{A}$  és  $\mathcal{B}$  valós vagy komplex algebrák, és tegyük fel, hogy  $\mathcal{B}$  prímalgebra. Ekkor minden  $\Phi : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$  szürjektív Jordan-homomorfizmus algebra homomorfizmus, vagy algebra anti-homomorfizmus.

*Bizonyítás.* Legyenek  $a, b \in \mathcal{A}$  tetszőlegesek. Először megmutatjuk, hogy az  $u = \Phi(ab) - \Phi(a)\Phi(b)$  vagy a  $v = \Phi(ab) - \Phi(b)\Phi(a)$  kifejezések valamelyike 0. Legyen  $c \in \mathcal{B}$  tetszőleges, akkor  $\Phi$  szürjektivitása miatt  $c$  előáll  $c = \Phi(d)$  alakban valamely  $d \in \mathcal{A}$  elemre. A Jordan-homomorfizmusokra bizonyított multilinearitási tulajdonságok alapján kapjuk, hogy

$$\begin{aligned} ucv &= [\Phi(ab) - \Phi(a)\Phi(b)]\Phi(d)[\Phi(ab) - \Phi(b)\Phi(a)] \\ &= \Phi(ab)\Phi(d)\Phi(ab) + \Phi(a)\Phi(b)\Phi(d)\Phi(b)\Phi(a) - \Phi(ab)\Phi(d)\Phi(b)\Phi(a) \\ &\quad - \Phi(a)\Phi(b)\Phi(d)\Phi(ab) \\ &= \Phi(abdab) + \Phi(abdba) - \Phi(ab)\Phi(d)\Phi(b)\Phi(a) - \Phi(a)\Phi(b)\Phi(d)\Phi(ab), \end{aligned}$$

és hasonlóan

$$\begin{aligned} vcu &= [\Phi(ab) - \Phi(b)\Phi(a)]\Phi(d)[\Phi(ab) - \Phi(a)\Phi(b)] \\ &= \Phi(abdab) + \Phi(badab) - \Phi(ab)\Phi(d)\Phi(a)\Phi(b) - \Phi(b)\Phi(a)\Phi(d)\Phi(ab), \end{aligned}$$

és így ezek összegére:

$$\begin{aligned} ucv + vcu &= \Phi(2abdab + badab + abdba) - \Phi(ab)\Phi(d)[\Phi(a)\Phi(b) + \Phi(b)\Phi(a)] \\ &\quad - [\Phi(a)\Phi(b) + \Phi(b)\Phi(a)]\Phi(d)\Phi(ab) \\ &= \Phi(2abdab + badab + abdba) \\ &\quad - [\Phi(ab)\Phi(d)\Phi(ab + ba) + \Phi(ab + ba)\Phi(d)\Phi(ab)] \\ &= \Phi(2abdab + badab + abdba) - \Phi(abd(ab + ba) + (ab + ba)dab) = 0. \end{aligned}$$

Az előző lemma szerint ekkor  $u = 0$  vagy  $v = 0$  teljesül. Ezzel beláttuk, hogy tetszőleges  $a, b \in \mathcal{A}$  elemek esetén  $\Phi(ab) = \Phi(a)\Phi(b)$  vagy  $\Phi(ab) = \Phi(b)\Phi(a)$  teljesül. Rögzített  $a \in \mathcal{A}$  elem mellett jelölje

$$\mathcal{M}_a = \{b \in \mathcal{A} \mid \Phi(ab) = \Phi(a)\Phi(b)\}, \quad \mathcal{N}_a = \{b \in \mathcal{A} \mid \Phi(ab) = \Phi(b)\Phi(a)\}$$

akkor  $\mathcal{M}_a$  és  $\mathcal{N}_a$  az  $\mathcal{A}$  lineáris alterei, legyenek ugyanis  $b_1, b_2 \in \mathcal{M}_a$ ,  $c \in \mathbb{C}$  akkor

$$\begin{aligned} \Phi(a(b_1 + cb_2)) &= \Phi(ab_1) + \Phi(acb_2) = \Phi(a)\Phi(b_1) + \Phi(a)\Phi(cb_2) \\ &= \Phi(a)[\Phi(b_1) + \Phi(cb_2)] = \Phi(a)\Phi(b_1 + cb_2). \end{aligned}$$

Hasonló számolással adódik, hogy  $\mathcal{N}_a$  altér. Az eddigiek alapján  $\mathcal{M}_a \cup \mathcal{N}_a = \mathcal{A}$ , ami csak úgy lehet, ha  $\mathcal{M}_a = \mathcal{A}$  vagy  $\mathcal{N}_a = \mathcal{A}$ . Végül jelölje

$$\mathcal{M} = \{a \in \mathcal{A} \mid \mathcal{M}_a = \mathcal{A}\}, \quad \mathcal{N} = \{a \in \mathcal{A} \mid \mathcal{N}_a = \mathcal{A}\}.$$

Ekkor  $\mathcal{M}$  és  $\mathcal{N}$  lineáris alterei  $\mathcal{A}$ -nak és az előbbihez hasonlóan  $\mathcal{M} \cup \mathcal{N} = \mathcal{A}$ , vagyis  $\mathcal{M} = \mathcal{A}$  vagy  $\mathcal{N} = \mathcal{A}$ . Előbbi esetben  $\Phi$  algebra homomorfizmus, utóbbiban algebra anti-homomorfizmus.  $\square$

*Megjegyzés.* Ha  $X$  normált tér, akkor  $\mathcal{B}(X)$  minden olyan részalgebrája príms, amely tartalmazza az egy-rangú operátorokat. Legyenek ugyanis  $A, B \in \mathcal{B}(X)$  olyanok, hogy

$$A\mathcal{B}(X)B = \{0\},$$

és tegyük fel, hogy  $A \neq 0, B \neq 0$ . Ekkor léteznek  $y, z \in X$  vektorok, hogy  $By \neq 0$  és  $Az \neq 0$  továbbá a Hahn-Banach tétel szerint létezik  $f \in X'$  folytonos lineáris funkcionál, amelyre  $f(By) = 1$ . Definiáljuk a  $T$  operátort a következőképpen:

$$Tx := (z \otimes f)x.$$

Akkor

$$ATBy = Af(By)z = Az \neq 0,$$

ami ellentmondás.

5.0.13. Tétel. (Gleason-Zelazko-Kahane): Legyen  $\mathcal{A}$  egységelemes Banach-algebra, és legyen  $\varphi : \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{C}$  lineáris egységelem-tartó leképezés (azaz  $\varphi(\mathbf{1}) = 1$ ). Ekkor az alábbiak ekvivalensek:

1.  $\varphi(a) = 0$ -ből következik  $\varphi(a^2) = 0$  minden  $a \in \mathcal{A}$ -ra.
2.  $\varphi(a^2) = \varphi(a)^2$  minden  $a \in \mathcal{A}$ -ra.
3. ha  $\varphi(a) = 0$  valamely  $a \in \mathcal{A}$ -ra, akkor minden  $b \in \mathcal{A}$ -ra is  $\varphi(ba) = 0$ , azaz  $\ker(\varphi)$  balideál.
4.  $\varphi$  algebra-homomorfizmus, azaz  $\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b)$  minden  $a, b \in \mathcal{A}$ -ra.
5.  $\ker(\varphi)$  nem tartalmaz invertálható elemet.
6. Minden  $a \in \mathcal{A}$ -ra  $\varphi(a) \in Sp(a)$ .

*Bizonyítás.* 1,  $\implies$  2, :

Mivel  $\varphi(a - \varphi(a)\mathbf{1}) = 0$ , ezért

$$\begin{aligned} 0 &= \varphi((a - \varphi(a)\mathbf{1})^2) = \varphi(a^2 - 2a\varphi(a) + \varphi(a)^2\mathbf{1}) \\ &= \varphi(a^2) - 2\varphi(a)^2 + \varphi(a)^2 \cdot \varphi(\mathbf{1}), \end{aligned}$$

azaz  $\varphi(a^2) = \varphi(a)^2$

2,  $\implies$  3,

Ekkor  $\varphi$  Jordan-homomorfizmus, és így

$$\varphi(bc + cb) = \varphi(b)\varphi(c) + \varphi(c)\varphi(b),$$

azonban  $\varphi(b), \varphi(c) \in \mathbb{C}$ , és így  $\varphi(b)\varphi(c) = \varphi(c)\varphi(b)$ , azaz

$$\varphi(bc + cb) = 2\varphi(b)\varphi(c).$$

Ebből kapjuk, hogy  $\varphi(a) = 0$  esetén  $\varphi(ab + ba) = 0$  minden  $b \in \mathcal{A}$ -ra, és a 2. tulajdonság alapján  $\varphi((ab + ba)^2) = 0$ . Ezután felhasználva a

$$(bc - cb)^2 = 2((bcb)c + c(bcb)) - (bc + cb)^2$$

azonosságot kapjuk, hogy

$$\begin{aligned}(\varphi(ba - ab))^2 &= \varphi((ba - ab)^2) \\ &= 2\varphi((bab)a + a(bab)) = 4\varphi(bab)\varphi(a) = 0.\end{aligned}$$

Ezután  $\varphi(ab + ba)$ -t és  $\varphi(ba - ab)$ -t összeadva nyerjük, hogy

$$2\varphi(ba) = \varphi(ab + ba) + \varphi(ba - ab) = 0.$$

3,  $\implies$  4,

Mivel  $\varphi(a - \varphi(a)\mathbf{1}) = 0$ , ezért a 3. tulajdonságot felhasználva kapjuk, hogy tetsz leges  $a, b \in \mathcal{A}$ -ra

$$0 = \varphi(b(a - \varphi(a)\mathbf{1})) = \varphi(ba) - \varphi(a)\varphi(b).$$

4,  $\implies$  1,

Triviális.

4,  $\implies$  5,

Ha  $a \in \mathcal{A}$  olyan invertálható elem, amelyre  $\varphi(a) = 0$ , akkor a

$$0 = \varphi(a^{-1}a) = \varphi(\mathbf{1}) = 1$$

ellentmondást kapjuk.

5,  $\implies$  6,

Következik abból, hogy

$$\varphi(\varphi(a)\mathbf{1} - a) = 0.$$

6,  $\implies$  5,

Ha  $a$  invertálható, akkor a 0 nincs benne a spektrumában.

6,  $\implies$  1,

Rögzített  $n \in \mathbb{N}$  természetes számra és  $a \in \mathcal{A}$  elemre tekintsük a

$$p(\lambda) = \varphi((\lambda \cdot \mathbf{1} - a)^n)$$

polinomot, és jelölje ennek gyökeit  $\lambda_j$ ,  $1 \leq j \leq n$ . A  $\varphi((\lambda_j \cdot \mathbf{1} - a)^n) = 0$  egyenl ségb l következik, hogy  $(\lambda_j \cdot \mathbf{1} - a)^n$  nem invertálható, és így  $\lambda_j \cdot \mathbf{1} - a$  sem invertálható. Ez azzal ekvivalens, hogy  $\lambda_j \in Sp(a)$  minden  $1 \leq j \leq n$ -re.

Kifejtve

$$p(\lambda) = \prod_{j=1}^n (\lambda - \lambda_j) = \lambda^n - n\varphi(a)\lambda^{n-1} + \binom{n}{2}\varphi(a^2)\lambda^{n-2} - \dots$$

és az együtthatók összehasonlításával kapjuk, hogy

$$\sum_{j=1}^n \lambda_j = n\varphi(a) = 0$$

és

$$\sum_{j < k} \lambda_j \lambda_k = \binom{n}{2} \varphi(a^2).$$

Ugyanakkor

$$0 = \left( \sum_{j=1}^n \lambda_j \right)^2 = \sum_{j=1}^n \lambda_j^2 + 2 \sum_{j < k} \lambda_j \lambda_k$$

miatt kapjuk, hogy

$$n(n-1)|\varphi(a^2)| = 2 \left| \sum_{j < k} \lambda_j \lambda_k \right| = \left| \sum_{j=1}^n \lambda_j^2 \right| \leq \sum_{j=1}^n |\lambda_j^2| \leq n\rho(a)^2.$$

Mivel  $n \in \mathbb{N}$  tetszőleges volt, és  $\rho(a)$  véges, ezért kapjuk, hogy  $\varphi(a^2) = 0$ .

□

## 6. fejezet

# C\*-algebra egységömbjének extremális pontjai

A következő fejezet célja C\*-algebra egységömbjének extremális pontjainak karakterizációja.

6.0.1. Lemma. Legyen  $\mathcal{A}$  egységelemes C\*-algebra, és legyenek  $a, b \in \mathcal{A}_{sa}$  önadjungált elemek, amelyekre  $ab = 0$ . Ekkor  $\|a + b\| \leq \max\{\|a\|, \|b\|\}$ .

*Bizonyítás.* Az  $a, b$  elemek önadjungáltsága miatt teljesül  $ba = (ab)^* = 0$  is, azaz  $a, b$  felcserélhető elemek. Legyen  $\mathcal{B}$  olyan kommutatív egységelemes C\*-részalgebra  $\mathcal{A}$ -ban, amelyre  $a, b \in \mathcal{B}$ . Jelölje  $\Gamma$  a  $\mathcal{B}$  Gelfand-reprezentációját, ez a kommutatív Gelfand-Naimark tétel szerint izometrikus algebra-izomorfizmus. Továbbá fennáll, hogy  $\Gamma(a) \cdot \Gamma(b) = 0$ , amiből következik hogy  $\|\Gamma(a) + \Gamma(b)\| \leq \max\{\|\Gamma(a)\|, \|\Gamma(b)\|\}$  amiből kapjuk, hogy  $\|a + b\| \leq \max\{\|a\|, \|b\|\}$ .  $\square$

6.0.2. Lemma. Legyen  $E$  valós vagy komplex normált tér, és jelölje  $B$  az  $E$  zárt egységömbjét. Legyenek  $x, y \in \partial B$  olyan egységvektorok és  $0 < \alpha < 1$  olyan pozitív valós szám, amelyre  $\alpha x + (1 - \alpha)y \in \partial B$ . Ekkor  $[x, y] \subseteq \partial B$ .

*Bizonyítás.* Először azt mutatjuk meg, hogy ha  $u, v \in E$  olyan vektorok, amelyekre  $\|u + v\| = \|u\| + \|v\|$ , akkor tetszőleges  $s, t \geq 0$  számokra

$$\|su + tv\| = s\|u\| + t\|v\|$$

is fennáll. Világos, hogy elég a fenti egyenlőséget  $0 \leq s \leq t$  esetben belátni.

$$\begin{aligned} \|su + tv\| &= \|t(u + v) - (t - s)u\| \geq |t|\|u + v\| - (t - s)\|u\| \\ &= t\|u\| + t\|v\| - (t - s)\|u\| = s\|u\| + t\|v\|. \end{aligned}$$

A fordított irányú egyenlőség következik a háromszög-egyenlőségből. Tegyük fel, hogy  $x, y$  egységvektorok, és  $0 < \alpha < 1$  olyan szám, amelyre  $\|\alpha x + (1 - \alpha)y\| = 1$ . Ekkor az  $u = \alpha x$  és  $v = (1 - \alpha)y$  jelöléseket bevezetve fennáll, hogy

$$\|u\| + \|v\| = 1 = \|u + v\|,$$



ezért tetszőleges  $0 < \lambda < 1$  szám esetén

$$\|\lambda x + (1 - \lambda)y\| = \left\| \frac{\lambda}{\alpha}u + \frac{1 - \lambda}{1 - \alpha}v \right\| = \frac{\lambda}{\alpha}\|u\| + \frac{1 - \lambda}{1 - \alpha}\|v\| = \lambda + 1 - \lambda = 1,$$

amivel beláttuk, hogy  $[x, y] \subseteq \partial B$ . □

6.0.3. Következmény. Legyen  $E$  valós vagy komplex normált tér, és jelölje  $B$  az  $E$  zárt egységömbjét. Ha  $z \in B$  nem extrémális pontja  $B$ -nek akkor léteznek  $x, y \in B$  különböző pontok, hogy  $z = \frac{1}{2}(x + y)$ .

*Bizonyítás.* Ha  $z \in B \setminus \partial B$  akkor létezik olyan  $u \in E$  nem-nulla vektor, hogy  $z + u \in B$  és  $z - u \in B$ , ekkor  $z$  el áll  $z = \frac{1}{2}[(z + u) + (z - u)]$  alakban. Ha  $z \in \partial B$  és  $z$  el áll  $z = \alpha x + (1 - \alpha)y$  alakban valamely  $x, y \in B$  különböző vektorok és  $0 < \alpha < 1$  szám mellett, akkor  $x, y \in \partial B$ , és így az el  $z$  lemmából kapjuk, hogy  $[x, y] \subseteq \partial B$ . Ebből pedig  $u = x - y$  és elég kicsi  $t > 0$  választással  $z + tu \in [x, y] \subseteq B$ , vagyis  $z = \frac{1}{2}[(z + tu) + (z - tu)]$ . □

6.0.4. Állítás. Legyen  $\mathcal{A}$  egységelemes  $C^*$ -algebra és legyen  $B$  az  $\mathcal{A}$  zárt egységömbje. Ekkor  $\mathbf{1}$  extrémális pont  $B$ -ben. Ha  $e \in \mathcal{A}$  projekció, akkor ha  $B_e$  jelöli az  $e\mathcal{A}e$  redukált  $C^*$ -részalgebra zárt egységömbjét, akkor  $e \in B_e$  extrémális pont.

*Bizonyítás.* Tegyük fel indirekt, hogy  $\mathbf{1}$  nem extrémális pontja  $B$ -nek, akkor az el  $z$  következmény szerint léteznek olyan  $a, b \in B$  különböző elemek, amelyekre  $\mathbf{1}$  el áll  $\frac{a+b}{2}$  alakban. Ekkor  $c = \frac{1}{2}(a + a)$  és  $d = \frac{1}{2}(b + b)$  olyan önadjungált elemek, amelyekre  $\mathbf{1} = \frac{1}{2}(c + d)$ . Ezt átrendezve kapjuk, hogy  $d = 2 \cdot \mathbf{1} - c$ , azaz  $d$  benne van a  $c$  által generált kommutatív egységelem  $C^*$ -részalgebrában. Jelölje  $\Gamma$  ennek a Gelfand-reprezentációját, akkor

$$\mathbf{1} = \Gamma(\mathbf{1}) = \frac{1}{2}(\Gamma(c) + \Gamma(d)).$$

Ha valamely  $\chi$  karakterre  $\Gamma_c(\chi) < 1$  akkor szükségképpen  $\Gamma_d(\chi) > 1$ , ami  $\Gamma$  izometrikus-sága miatt lehetetlen. Emiatt  $\Gamma(c) = \Gamma(d) = \mathbf{1}$  és ezért  $c = d = \mathbf{1}$ . Ebből következik, hogy  $a + a = 2 \cdot \mathbf{1}$ . Az el  $z$  ekkor azonos módon kapjuk, hogy  $a = \mathbf{1}$  és  $b = \mathbf{1}$ , azaz  $\mathbf{1}$  valóban extrémális pont. A második állítás belátásához tekintsük tetszőleges  $e \in \mathcal{A}$  projekció mellett a  $B = e\mathcal{A}e$  redukált  $C^*$ -részalgebrát, akkor  $e$  a  $B$  egységeleme, ezért az el  $z$  érvelés alapján  $e$  a  $B_e$  extrémális eleme. □

6.0.5. Definíció. Legyen  $\mathcal{A}$  egységelemes  $C^*$ -algebra. Ekkor azt mondjuk, hogy az  $a \in \mathcal{A}$  elem parciális izometria ha  $a$  önadjungált idempotens.

6.0.6. Tétel. Legyen  $\mathcal{A}$  egységelemes  $C^*$ -algebra, és jelölje  $B$  az  $\mathcal{A}$  zárt egységömbjét. Ekkor  $x \in B$  pontosan akkor extrémális pont, ha parciális izometria és ha

$$(\mathbf{1} - xx^*)\mathcal{A}(\mathbf{1} - xx^*) = \{0\}. \tag{6.1}$$

*Bizonyítás.* Először tegyük fel, hogy  $x \in B$  extrémális pont. Megmutatjuk, hogy ekkor  $e := xx^* \in \mathcal{A}$  projekció, azaz önadjungált idempotens elem. Mivel  $e$  pozitív elem, ezért ehhez elég megmutatnunk, hogy  $Sp(e) \subseteq \{0, 1\}$ . Mivel  $\|e\| \leq 1$ , ezért  $Sp(e) \subseteq [0, 1]$ , tehát azt kell megmutatni, hogy ha  $0 < \lambda < 1$ , akkor  $\lambda \notin Sp(e)$ . Tegyük fel indirekt ennek ellenkezőjét, azaz hogy valamely  $\lambda \in (0, 1)$ -re  $\lambda \in Sp(e)$ . Jelölje  $C_e$  az  $e$  elemhez tartozó

folytonos függvényszámító operátort. Legyen továbbá  $\varphi : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}_+$  olyan nemnegatív függvény, amelyre  $\varphi(\lambda) > 0$ , ugyanakkor

$$|z \cdot (1 \pm \varphi(z))^2| \leq 1, \quad z \in [0, 1].$$

Tekintsük a  $C_e : \mathcal{C}(Sp(e); \mathbb{C}) \rightarrow \mathcal{A}$  folytonos függvényszámító operátort, akkor  $C_e$  izometrikussága és  $e\varphi(e) = \varphi(e)e$  alapján kapjuk, hogy

$$1 \geq \|e \cdot (\mathbf{1} \pm \varphi(e))^2\| = \|(\mathbf{1} \pm \varphi(e))x x(\mathbf{1} \pm \varphi(e))\| = \|x(\mathbf{1} \pm \varphi(e))\|^2,$$

amiből kapjuk, hogy  $x \pm x\varphi(e) \in B$ . Ebből a  $z = x \pm x\varphi(e)$  jelölés bevezetésével nyerjük az  $x$  extrémális elem  $x = \frac{1}{2}(z_+ + z_-)$  elállítását, amiből  $x$  extrémális voltából következik, hogy  $x = z_+ = z_-$ , azaz  $x\varphi(e) = 0$ , és így egyúttal  $e\varphi(e) = 0$ . Ez azonban lehetetlen, ugyanis  $\lambda\varphi(\lambda) > 0$ ,  $\lambda \in Sp(e)$  így a folytonos függvényszámító operátor injektivitása miatt  $e\varphi(e) \neq 0$ . Ezzel beláttuk, hogy  $x x$  projekció. Ugyanakkor a Jacobson-lemmából tudjuk, hogy  $Sp(xx) = Sp(x x) \cup \{0\} \subseteq \{0, 1\}$ , ezért  $xx$  pozitivitása alapján  $xx$  is projekció, amivel beláttuk, hogy  $x$  parciális izometria. A második állításhoz legyen  $a \in (1 - xx)\mathcal{A}(1 - xx)$ ,  $\|a\| \leq 1$ , megmutatjuk, hogy ekkor  $ax = 0$ . Mivel  $xx$  projekció, ezért  $(1 - xx)x x = 0$ , ezért  $ax x = 0$ , és így a  $C^*$ -azonosság alapján

$$0 = \|ax x a\| = \|x a\|^2 = \|ax\|^2,$$

vagyis  $ax = xa = 0$ . Mivel  $xx$  is projekció, ezért  $xx(1 - xx) = 0$ , és így  $a$  alakja miatt  $xx a = 0$ , azaz  $xx a a = 0$ . A korábbi lemma alapján

$$\begin{aligned} \|x \pm a\|^2 &= \|(x \pm a)(x \pm a)\| = \|xx \pm xa \pm ax + aa\| \\ &= \|xx + aa\| \leq \max\{\|xx\|, \|aa\|\} \leq 1, \end{aligned}$$

azaz  $x \pm a \in B$ . Felhasználva, hogy  $x \in B$  extrémális pont és hogy  $x = \frac{1}{2}[(x+a) + (x-a)]$  kapjuk, hogy  $a = 0$ , amivel beláttuk a (6.1) egyenlőséget. Tegyük fel most, hogy  $x \in B$ -re teljesül a (6.1) egyenlőség, akkor

$$0 = x(1 - xx)x(1 - xx) = (x - xx)x(x - xx)$$

amiből a  $C^*$ -azonosságból  $x - xx x = 0$ , és ezt jobbról illetve balról is  $x$ -gal szorozva adódik hogy  $xx = (xx)^2$  és  $xx = (xx)^2$ , azaz  $x$  parciális izometria. Az  $e := xx$  és  $f := xx$  jelöléseket bevezetve adódik, hogy

$$\begin{aligned} (ex - x)(ex - x) &= (ex - x)(xe - x) \\ &= ex xe - ex x - x xe + x x \\ &= eee - ee - ee + e = e - e - e + e = 0, \end{aligned}$$

amiből kapjuk, hogy  $ex = x$  és  $xe = x$ . Tegyük fel, hogy  $x \in B$  nem extrémális pont, akkor a 6.0.2 Lemma értelmében léteznek olyan  $a, b \in B$ ,  $a \neq b$  vektorok, amelyekre  $x = \frac{a+b}{2}$ . Ekkor

$$e = e^3 = ex xe = ex \frac{a+b}{2} e = \frac{ex ae + ex be}{2}.$$

Jelölje  $B_e$  az  $e\mathcal{A}e$  redukált  $C^*$ -részalgebra zárt egységömbjét, akkor  $ex ae, ex be \in B_e$ , ugyanakkor a 6.0.4 Állítás szerint  $e \in B_e$  extrémális pont, amiből

$$e = ex ae = ex be.$$

Ebb l pedig

$$x = xe = x(ex ae) = (xe)x ae = xx ae = fae,$$

és hasonlóan

$$x = xe = x(ex be) = (xe)x be = xx be = fbe.$$

Kihasználva, hogy  $ae = fae + (\mathbf{1} - f)ae$  és hogy

$$ea fae = x x = e :$$

$$\begin{aligned} 1 &\geq \|ea ae\| = \|[fae + (\mathbf{1} - f)ae] [fae + (\mathbf{1} - f)ae]\| \\ &= \|ea fae + ea (\mathbf{1} - f)ae\| = \|xx + ea (\mathbf{1} - f)ae\| = \|e + ea (\mathbf{1} - f)ae\|, \end{aligned}$$

vagyis  $h = ea (\mathbf{1} - f)ae \in e\mathcal{A}e$  olyan elem, amelyre  $\|e + h\| \leq 1$ . Így tetsz leges  $e\mathcal{A}e$  feletti  $\rho$  állapotra

$$1 \leq 1 + \rho(h) = \rho(e + h) \leq 1$$

vagyis  $\rho(h) = 0$  teljesül, amib l  $h = 0$  következik, azaz  $ea (\mathbf{1} - f)ae = 0$ . Hasonlóan kapjuk, hogy  $eb (\mathbf{1} - f)be = 0$ . Ebb l következik, hogy  $(\mathbf{1} - f)ae = 0 = (\mathbf{1} - f)be$ , azaz

$$ae = fae = x = fbe = be.$$

Ezzel beláttuk tehát, hogy ha  $x \in B$ -re (6.1) teljesül, akkor  $x = \frac{1}{2}(a + b)$   $a, b \in B$  esetén  $ae = be = x$  teljesül, ahol  $e = x x$ . (6.1) mellett ugyanakkor  $(\mathbf{1} - x x)\mathcal{A}(\mathbf{1} - x x) = \{0\}$  is fennáll, továbbá  $x = \frac{1}{2}(a + b)$ , ezért  $a f = b f = x$ , vagyis  $fa = fb = x$ . Végül az  $ae = be = fa = fb$  egyenl ségek és  $(\mathbf{1} - f)\mathcal{A}(\mathbf{1} - e) = \{0\}$  felhasználásával kapjuk, hogy

$$\begin{aligned} a &= [f + (\mathbf{1} - f)]a[e + (\mathbf{1} - e)] \\ &= fa(\mathbf{1} - e) + (\mathbf{1} - f)ae + fae \\ &= fb(\mathbf{1} - e) + (\mathbf{1} - f)be + fbe \\ &= [f + (\mathbf{1} - f)]b[e + (\mathbf{1} - e)] = b \end{aligned}$$

amivel beláttuk,  $x$  extrémális voltát és ezzel a tételt is. □

6.0.7. Következmény. Legyen  $T$  kompakt Hausdor -tér és jelölje  $B$  a  $\mathcal{C}(T; \mathbb{C})$   $C^*$ -algebra zárt egységömbjét. Ekkor egy  $\varphi \in B$  függvény pontosan akkor extrémális pont, ha minden  $t \in T$ -re  $|\varphi(t)| = 1$ , azaz

$$ex B = \{\varphi \in \mathcal{C}(T; \mathbb{C}) \mid |\varphi(t)| = 1 \ (t \in T)\}.$$

*Bizonyítás.* Ha  $|\varphi| = 1$ , akkor  $\mathbf{1} - \varphi \cdot \varphi = 0$  és így az el z tétel figyelembevételével  $\varphi$  extrémális pontja  $B$ -nek. Megfordítva, ha  $\varphi$  extrémális pont, akkor az el z tétel szerint  $(\mathbf{1} - \varphi\varphi)\mathbf{1}(\mathbf{1} - \varphi\varphi) = 0$ , amib l  $|\varphi| = 1$  következik. □

6.0.8. Következmény. Legyen  $\mathcal{A}$  kommutatív egységelemes  $C^*$ -algebra, és jelölje  $B$  az  $\mathcal{A}$  zárt egységömbjét. Ekkor  $B$  extrémális pontjai éppen az unitér elemek, azaz

$$ex B = \{u \in \mathcal{A} \mid u u = \mathbf{1}\}$$

*Bizonyítás.* Jelölje  $\Gamma$  az  $\mathcal{A}$  Gelfand-reprezentációját, akkor a kommutatív Gelfand-Naimark tétel szerint  $\Gamma$  izometrikus  $*$ -algebra izomorfizmus  $\mathcal{A}$  és  $\mathcal{C}(X(\mathcal{A}); \mathbb{C})$  között valamely alkalmas  $X(\mathcal{A})$  kompakt Hausdorff-térre.  $\Gamma$  linearitása és izometrikussága folytán világos, hogy  $\Gamma^{-1}$  a  $\mathcal{C}(X(\mathcal{A}); \mathbb{C})$  zárt egységgyömbjét illetve annak extrémális pontjait  $B$ -re illetve  $ex B$ -re képezi. Ebből és az előző következményből kapjuk, hogy

$$ex B = \{\Gamma^{-1}\varphi \mid \varphi \in \mathcal{C}(X(\mathcal{A}); \mathbb{C}), |\varphi(x)| = 1, (x \in X(\mathcal{A}))\},$$

ami valóban az  $\mathcal{A}$  unitér elemeinek halmaza. □

A következőkben az egy normájú pozitív elemek halmazának extrémális pontjait vizsgáljuk. Ehhez szükségünk lesz a következő állításra:

6.0.9. Állítás. *Legyen  $\mathcal{A}$  egységelemes  $C^*$ -algebra,  $a \in \mathcal{A}_+$  pozitív elem és legyen  $e \in \mathcal{A}$  projekció. Ekkor ha  $a \leq \lambda e$  valamely  $\lambda > 0$  szám mellett, akkor  $a = eae$ .*

*Bizonyítás.* A nemkommutatív Gelfand-Naimark tétel szerint létezik  $\mathcal{A}$ -nak hű ábrázolása egy alkalmas  $\mathcal{H}$  Hilbert-térben, azaz létezik egy  $\pi : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}(\mathcal{H})$  injektív  $*$ -algebra izomorfizmus. Ekkor az  $E = \pi(e)$  és  $A = \pi(a)$  jelölések mellett  $A \leq \lambda E$ , amiből a Douglas-féle faktorizációs tétel szerint  $\text{ran } A \subseteq \text{ran } E$ , vagyis  $A = EA$ , illetve  $\ker A^? \subseteq \text{ran } E$  miatt  $A = AE$  következik. Ebből tehát a  $\pi(a) = \pi(eae)$  összefüggést nyerjük, amiből  $\pi$  injektivitása miatt  $a = eae$ . □

6.0.10. Tétel. *Legyen  $\mathcal{A}$  egységelemes  $C^*$ -algebra és jelölje  $P$  az  $\mathcal{A}$  legfeljebb egy normájú pozitív elemeinek halmazát. Ekkor  $P$  extrémális pontjai éppen a projekciók, azaz fennáll, hogy*

$$ex P = \{e \in \mathcal{A} \mid e = e^2 = e\}.$$

*Bizonyítás.* Először tegyük fel, hogy  $e \in \mathcal{A}$  projekció és  $e = \alpha a + (1 - \alpha)b$  valamely  $a, b \in P$ -re és  $0 < \alpha < 1$  számra, akkor alkalmas  $\lambda > 0$  számra  $a \leq \lambda e$  és  $b \leq \lambda e$ , így az előző állítást felhasználva adódik, hogy  $a = eae$  és  $b = ebe$ . Ebből kapjuk, hogy  $a$  és  $b$  elemei az  $e\mathcal{A}e$  redukált  $C^*$ -részalgebrának, és ha  $B_e$  jelöli ennek zárt egységgyömbjét, akkor  $a, b \in B_e$ , továbbá a 6.0.4. Állítás szerint  $e \in B_e$  extrémális pont, azaz  $a = b = e$ , amiből már következik, hogy  $e$  extrémális pont. Tegyük fel most, hogy  $e \in P$  extrémális pont, tudjuk hogy ekkor  $Sp(e) \subseteq [0, 1]$ . Ha lenne olyan  $\lambda \in Sp(e)$  spektrumpont, amelyre  $0 < \lambda < 1$  akkor az  $e$  által generált kommutatív  $C^*$ -részalgebra Gelfand-reprezentációját véve kapnánk olyan  $x$  pozitív elem létezését, amelyre  $0 \leq \Gamma(e \pm x) \leq \mathbf{1}$ , azaz  $e \pm x \in P$ , ami ellentmond  $e$  extrémálisának. Ezzel beláttuk, hogy  $Sp(e) \subseteq \{0, 1\}$ , vagyis  $e$  projekció. □

A fejezet zárásaként  $C^*$ -algebra legfeljebb egy normájú önadjungált elemeinek halmazának extrémális pontjait vizsgáljuk. Ehhez először bevezetjük a szimmetria fogalmát  $C^*$ -algebra elemei között.

6.0.11. Definíció. Azt mondjuk, hogy az  $\mathcal{A}$  egységelemes  $C^*$ -algebra  $s$  eleme szimmetria, ha önadjungált és unitér, azaz  $s = s^* = s^{-1}$ .

6.0.12. Állítás. Az  $\mathcal{A}$  egységelemes  $C^*$ -algebra egy  $s$  elemére a következ  $k$  ekvivalensek:

1.  $s$  szimmetria, vagyis  $s = s^* = s^{-1}$ ,
2.  $s$  normális és  $Sp(s) \subseteq \{-1, 1\}$ ,
3. létezik olyan  $e \in \mathcal{A}$  projekció, hogy  $s = e - e^*$ , ahol  $e^* = \mathbf{1} - e$ .

*Bizonyítás.* Legyen  $s$  normális elem, akkor az önadjungált és unitér elemek spektrális jellemzése alapján kapjuk, hogy  $s$  pontosan akkor szimmetria, ha  $Sp(s) \subseteq \mathbb{D} \cap \mathbb{R}$ , azaz pontosan akkor, ha  $Sp(s) \subseteq [-1, 1]$ , amivel beláttuk az 1,  $\Leftrightarrow$  2, ekvivalenciát. Tegyük fel, hogy  $s$ -re 2, teljesül, akkor a  $\varphi := \chi_{[-1, 1]}$  és  $\psi := \chi_{\mathbb{R} \setminus [-1, 1]}$  függvények  $Sp(s)$ -re vett megszorításai folytonosak. A

$$\psi(z) = 1 - \varphi(z), \quad \varphi(z) - \psi(z) = z \quad (z \in Sp(s))$$

egyenlőségek figyelembevételével a folytonos függvényszámítás tételéből adódik, hogy  $e := \varphi(s) \in \mathcal{A}$  olyan projekció, amelyre  $e^* = \psi(s)$  és egyúttal  $s = \varphi(s) - \psi(s) = e - e^*$  teljesül, amivel igazoltuk a 2,  $\rightarrow$  3, implikációt. Végül ha  $e \in \mathcal{A}$  projekció, akkor  $s := e - e^*$  nyilvánvalóan önadjungált, továbbá

$$\begin{aligned} s^2 &= (e - e^*)^2 = e^2 - ee^* - e^*e + (e^*)^2 \\ &= e - e + e - e + e^2 + \mathbf{1} - 2e + e^2 = \mathbf{1}, \end{aligned}$$

azaz  $s$  unitér, vagyis szimmetria. □

6.0.13. Tétel. Legyen  $\mathcal{A}$  egységelemes  $C^*$ -algebra, és jelölje  $S$  az  $\mathcal{A}$  zárt egységömbjének önadjungált elemeit, azaz  $S := \mathcal{A}_{sa} \cap B$ , akkor  $S$  extrémális pontjai éppen a szimmetriák, azaz

$$ex S = \{s \in \mathcal{A} \mid s = s^* = s^{-1}\}$$

*Bizonyítás.* Ha  $s$  szimmetria, akkor világos hogy  $(1 - ss^*)\mathcal{A}(1 - s^*s) = \{0\}$  teljesül, így a 6.0.6. Tétel szerint  $s$  extrémális pontja a  $B$  egységömbnek, és így nyilván  $S$ -nek is. Megfordítva tegyük fel, hogy  $s$  extrémális pontja  $S$ -nek. Ekkor léteznek  $s^+, s^-$  egymással felcserélhető pozitív elemek, amelyekre  $\|s\| \leq 1$ ,  $s^+s^- = 0$  és  $s$  el áll  $s^+ - s^-$  alakban. Jelölje  $P$  az  $\mathcal{A}$  legfeljebb egy normájú pozitív elemeinek halmazát, megmutatjuk, hogy  $s$  extrémális pontok  $P$ -ben. Tegyük fel, hogy  $s^+$  el áll  $s^+ = \frac{1}{2}(h + k)$  alakban valamely  $h, k \in P$  elemek mellett, akkor

$$-\mathbf{1} \leq -s \leq h - s \leq h \leq \mathbf{1}$$

figyelembevételével kapjuk, hogy  $\|h - s\| \leq 1$ , vagyis  $h - s \in S$ . Hasonlóan adódik, hogy  $k - s \in S$ , vagyis

$$s = s^+ - s^- = \frac{h - s}{2} + \frac{k - s}{2}$$

és  $s \in ex S$  figyelembevételével kapjuk, hogy  $\frac{h - s^-}{2} = \frac{k - s^-}{2}$ , azaz  $h = k$  adódik, amivel beláttuk, hogy  $s^+ \in P$  extrémális pont. Hasonlóan igazolható, hogy  $s^-$  is extrémális pont. A 6.0.10. Tételből kapjuk, hogy  $s^+$  és  $s^-$  projekciók, ezért a tétel igazolva lesz, ha megmutatjuk, hogy  $s^+ + s^- = \mathbf{1}$ . Jelölje  $\mathcal{B}$  az  $s^+$  és  $s^-$  által generált kommutatív  $C^*$ -algebrát, és legyen  $e = \mathbf{1} - s^+ + s^-$ , továbbá jelölje  $\mathcal{B}$  Gelfand-reprezentációját  $\Gamma$ , akkor  $e$  projekció

és  $se = 0$ , amiből látható hogy a  $\Gamma(s)$  és  $\Gamma(e)$  függvények diszjunkt tartójúak, és ezért  $\|s \pm e\| = \|\Gamma(s \pm e)\| \leq 1$ , azaz  $s \pm e \in S$ . Ebből viszont  $s$  extremitása miatt  $e = 0$ , azaz  $s^+ + s^- = \mathbf{1}$ , amivel igazoltuk a tételt.  $\square$

## 7. fejezet

# Kadison általánosított Schwarz-egyenlőtlensége

7.0.1. Lemma. Legyen  $\mathcal{H}$  komplex Hilbert-tér és legyenek  $A_1, A_2, \dots, A_n \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$  pozitív operátorok. Ekkor tetszőleges  $x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathcal{H}$  vektorok esetén fennáll, hogy

$$\left\| \sum_{j=1}^n A_j x_j \right\|^2 \leq \left\| \sum_{j=1}^n A_j \right\| \cdot \sum_{j=1}^n (A_j x_j | x_j).$$

*Bizonyítás.* Először konstruálunk egy segéd Hilbert-teret minden tetszőleges  $A \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$  pozitív operátorhoz a következő módon: tekintsük  $A$  képterét és lássuk el azt az  $\langle \cdot, \cdot \rangle_A$  skalárszorzattal a következőképpen:

$$\langle Ax, Ay \rangle_A := (Ax | y) \quad x, y \in \mathcal{H}.$$

Megmutatjuk, hogy  $\langle \cdot, \cdot \rangle_A$  jól definiált skalárszorzat  $\text{ran } A$ -n. Legyenek ugyanis  $x_1, x_2, y_1, y_2 \in \mathcal{H}$  olyan vektorok, amelyekre  $Ax_1 = Ax_2$  és  $Ay_1 = Ay_2$ , akkor

$$(Ax_1 | y_1) = (Ax_2 | y_1) = (x_2 | Ay_1) = (x_2 | Ay_2) = (Ax_2 | y_2),$$

amivel megmutattuk, hogy  $\langle \cdot, \cdot \rangle_A$  jól definiált. Legyen továbbá  $x \in \mathcal{H}$  olyan, hogy  $\langle Ax, Ax \rangle_A = 0$ , azaz  $(Ax | x) = 0$ . Ekkor a fél-skalárszorzatokra vonatkozó Cauchy-Schwarz egyenlőtlenség alapján kapjuk, hogy minden  $y \in \mathcal{H}$  vektorra

$$|(Ax | y)|^2 \leq (Ax | x) \cdot (Ay | y),$$

amiből kapjuk, hogy  $Ax = 0$ . Ezzel beláttuk, hogy  $\langle \cdot, \cdot \rangle_A$  pozitív definit, azaz skalárszorzat. Jelölje ezután  $\mathcal{S}_A$  az így nyert  $(\text{ran } A, \langle \cdot, \cdot \rangle_A)$  prehilbert tér teljességi tételét, mely a skalárszorzat  $\mathcal{S}_A$ -ra való kiterjesztésével Hilbert-tér. A  $\mathcal{S}_A$  feletti skalárszorzatot is az  $\langle \cdot, \cdot \rangle_A$  szimbólummal jelöljük, és az  $\mathcal{S}_A$  teret az  $A$  operátorhoz társított segéd Hilbert-térnek nevezzük. Ezután tekintsük az  $A_1, A_2, \dots, A_n$  pozitív operátorok előbbi konstrukcióval kapott segéd Hilbert-tereit, és jelölje ezek direkt összegét  $\mathcal{K}$ , azaz

$$\mathcal{K} := \bigoplus_{k=1}^n \mathcal{H}_{A_k}.$$

Tekintsük az alábbi

$$Vx := (A_1x, A_2x, \dots, A_nx), \quad x \in \mathcal{H}$$

egyenl séggel értelmezett  $V : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{K}$  függvényt, amely lineáris operátor. Továbbá az alábbi

$$((A_1x, A_2x, \dots, A_nx)|(A_1x, A_2x, \dots, A_nx))_{\mathcal{K}} = \sum_{j=1}^n (A_jx|x) \leq \left\| \sum_{j=1}^n A_j \right\| \cdot \|x\|^2$$

egyenl tlenségbl látszik, hogy  $V$  korlátos operátor, és normájára fennáll a  $\|V\|^2 \leq \left\| \sum_{j=1}^n A_j \right\|$  becslés. Tekintsük a  $V$  operátor adjungáltját, azaz a  $V^* : \mathcal{K} \rightarrow \mathcal{H}$  operátort, továbbá legyenek  $x_1, x_2, \dots, x_n$  és  $y$   $\mathcal{H}$ -beli vektorok, akkor

$$\begin{aligned} (V^* (A_1x_1, A_2x_2, \dots, A_nx_n)|y) &= ((A_1x_1, A_2x_2, \dots, A_nx_n)|(A_1y, A_2y, \dots, A_ny))_{\mathcal{K}} \\ &= \sum_{j=1}^n (A_jx_j|y) = \left( \sum_{j=1}^n A_jx_j \middle| y \right), \end{aligned}$$

amib l kapjuk, hogy

$$V^* (A_1x_1, A_2x_2, \dots, A_nx_n) = \sum_{j=1}^n A_jx_j, \quad x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathcal{H}.$$

Végül a  $\|V^*\| = \|V\|$  összefüggés figyelembevételével kapjuk, hogy

$$\begin{aligned} \left\| \sum_{j=1}^n A_jx_j \right\|^2 &= \|V^* (A_1x_1, A_2x_2, \dots, A_nx_n)\|^2 \\ &\leq \|V\|^2 \cdot \|(A_1x_1, A_2x_2, \dots, A_nx_n)\|_{\mathcal{K}}^2 \\ &\leq \left\| \sum_{j=1}^n A_j \right\| \cdot \sum_{j=1}^n (A_jx_j|x_j), \end{aligned}$$

amivel beláttuk a bizonyítandó egyenl tlenséget. □

A következ kben  $\mathcal{B}^1(T; \mathbb{C})$  jelöli a  $T$  kompakt Hausdorff-téren értelmezett komplex érték korlátos Borel-mérhet függvények  $C^*$ -algebráját, amelyen a norma a szokásos

$$\|f\| := \sup_{t \in T} |f(t)|, \quad t \in T$$

egyenl séggel értelmezett szuprémum-norma.

7.0.2. Lemma. Legyen  $T$  kompakt Hausdorff-tér,  $\mathcal{H}$  pedig komplex Hilbert-tér. Legyen továbbá  $\Phi_0 : \mathcal{C}(T; \mathbb{C}) \rightarrow \mathcal{B}(\mathcal{H})$  folytonos lineáris leképezés, amelyre  $\|\Phi_0\| \leq 1$  és amely rendezéstartó abban az értelemben, hogy ha valamely  $\psi, \varphi \in \mathcal{C}(T; \mathbb{R})$  valós érték függvények esetén  $\varphi \leq \psi$  teljesül, akkor  $\Phi_0(\varphi) \leq \Phi_0(\psi)$ . Ekkor létezik  $\Phi_0$ -nak egyetlen  $\Phi : \mathcal{B}^1(T; \mathbb{C}) \rightarrow \mathcal{B}(\mathcal{H})$  folytonos lineáris és rendezéstartó kiterjesztése, amelyre  $\|\Phi\| \leq 1$ .



*Bizonyítás.* Legyenek  $x, y \in \mathcal{H}$  rögzített vektorok, és tekintsük az

$$u_{x,y}(\varphi) := (\Phi_0(\varphi)x|y), \quad \varphi \in \mathcal{C}(T; \mathbb{C})$$

egyenl séggel értelmezett  $u_{x,y} : \mathcal{C}(T; \mathbb{C}) \rightarrow \mathbb{C}$  lineáris funkcionált. Az alábbi

$$|(\Phi_0(\varphi)x|y)| \leq \|\Phi_0(\varphi)\| \|x\| \|y\| \leq \|\varphi\| \cdot \|x\| \|y\|$$

becslés alapján  $u_{x,y}$  folytonos, és normájára fennáll az  $\|u_{x,y}\| \leq \|x\| \|y\|$  becslés. Ezért a Riesz-reprezentációs tétel szerint létezik egy  $\mu_{x,y}$  reguláris Borel-mérték a  $T$  Borel-halmazain, amelyre fennáll, hogy

$$u_{x,y}(\varphi) = \int_T \varphi d\mu_{x,y}, \quad \varphi \in \mathcal{C}(T; \mathbb{C}),$$

továbbá a  $\mu_{x,y}$  teljes változására teljesül, hogy  $|\mu_{x,y}|(T) \leq \|x\| \|y\|$ . Vegyük észre továbbá, hogy ha  $\varphi \in \mathcal{C}(T; \mathbb{C})$  olyan függvény, amelyre  $\varphi \geq 0$ , akkor  $\Phi_0$  rendezéstartó tulajdonsága miatt  $\Phi_0(\varphi) \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$  pozitív operátor. Ekkor minden  $x \in \mathcal{H}$ -ra

$$0 \leq (\Phi_0(\varphi)x|x) = u_{x,x},$$

vagyis  $u_{x,x}$  pozitív funkcionál. Ebből ismét a Riesz-reprezentációs tételből kapjuk, hogy  $u_{x,x}$  mérték minden  $x \in \mathcal{H}$  esetén. Legyen  $f \in \mathcal{B}^1(T; \mathbb{C})$  korlátos Borel-mérhető függvény és tekintsük az

$$F(x, y) := \int_T f d\mu_{x,y} \quad x, y \in \mathcal{H}$$

$F : \mathcal{H} \times \mathcal{H} \rightarrow \mathbb{C}$  függvényt. Vegyük észre, hogy az  $(x, y) \mapsto \mu_{x,y}$  hozzárendelés sesquilineáris, ezért az  $F$  függvény is az, továbbá az

$$\left| \int_T f d\mu_{x,y} \right| \leq \|f\|_1 \cdot |\mu_{x,y}|(T) \leq \|f\|_1 \cdot \|x\| \|y\|$$

becslés alapján  $F$  korlátos, éspedig  $\|F\| \leq \|f\|_1$ , így egyértelműen létezik egy olyan  $\Phi(f) \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$  folytonos lineáris operátor, amelyre

$$(\Phi(f)x|y) = \int_T f d\mu_{x,y} \quad x, y \in \mathcal{H}.$$

Megmutatjuk, hogy a  $\Phi : \mathcal{B}^1(T; \mathbb{C}) \rightarrow \mathcal{B}(\mathcal{H})$  eleget tesz a Lemma állításában szereplő feltételeknek. A definíció alapján világos, hogy  $\Phi$  lineáris, továbbá

$$\|\Phi(f)\| = \|F\| \leq \|f\|_1$$

miatt  $\Phi$  folytonos és  $\|\Phi\| \leq 1$ . Az is könnyen látható, hogy  $\Phi$  kiterjeszti  $\Phi_0$ -t, legyenek ugyanis  $x, y \in \mathcal{H}$  tetszőleges vektorok és  $\varphi \in \mathcal{C}(T; \mathbb{C})$  függvény, akkor

$$(\Phi(\varphi)x|y) = \int_T \varphi d\mu_{x,y} = (\Phi_0(\varphi)x|y),$$

amiből  $\Phi_0(\varphi) = \Phi(\varphi)$  következik. Meg kell mutatnunk még, hogy  $\Phi$  rendezéstartó: ehhez elég megmutatni, hogy tetszőleges  $f \in \mathcal{B}^1(T; \mathbb{C})$ ,  $f \geq 0$  függvény esetén  $\Phi(f) \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$  pozitív operátor, azaz

$$(\Phi(f)x|x) = \int_T f d\mu_{x,x} \geq 0.$$

Ez azonban nyilvánvaló abból, hogy  $\mu_{x,x}$  mérték. □

7.0.3. Tétel. Legyen  $\mathcal{A}$  egységelemes  $C^*$ -algebra,  $\mathcal{H}$  Hilbert-tér, és legyen  $\Phi : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}(\mathcal{H})$  olyan rendezéstartó folytonos lineáris leképezés, amelyre  $\|\Phi\| \leq 1$ . Ekkor minden  $a \in \mathcal{A}_{sa}$  önadjungált elemre fennáll, hogy

$$\Phi(a)^2 \leq \Phi(a^2).$$

*Bizonyítás.* Rögzítsük az  $a \in \mathcal{A}$  önadjungált elemet, és jelölje  $\mathcal{B}$  az  $a$  által generált kommutatív egységelemes  $C^*$ -részalgebrát. Mivel bármely  $b \in \mathcal{B}$  esetén  $Sp_{\mathcal{B}}(b) = Sp_{\mathcal{A}}(b)$ , ezért az  $\mathcal{A}$  önadjungált elemein bevezetett rendezés  $\mathcal{B}$ -re vett megszorítása megegyezik a  $\mathcal{B}$   $C^*$ -algebrabeli pozitivitás által indukált rendezéssel. Ezért ha  $\Psi$  jelöli a  $\Phi$  leképezés  $\mathcal{B}$ -re vett megszorítását, akkor kapjuk, hogy a  $\Phi(a)^2 \leq \Phi(a^2)$  egyenlőség pontosan akkor teljesül, ha  $\Psi(a)^2 \leq \Psi(a^2)$ , vagyis az állítást elegendő kommutatív  $C^*$ -algebrákra belátunk. Ugyanakkor ha  $\mathcal{A}$  kommutatív  $C^*$ -algebra akkor a Gelfand-reprezentációja rendezéstartó izometrikus  $*$ -izomorfizmust létesít az  $\mathcal{A}$  és  $\mathcal{C}(X(\mathcal{A}); \mathbb{C})$   $C^*$ -algebrák között. Ezek alapján látható, hogy a tétel állítását elég abban a speciális esetben igazolnunk, amikor  $\mathcal{A} = \mathcal{C}(T; \mathbb{C})$  alakú valamely  $T$  kompakt Hausdorff-térre. Legyen tehát  $\mathcal{A} = \mathcal{C}(T; \mathbb{C})$  és legyen  $\Phi_0 : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}(\mathcal{H})$  olyan folytonos lineáris rendezéstartó leképezés, amelyre  $\|\Phi_0\| \leq 1$ . Jelölje  $\Phi$  a  $\Phi_0$   $\mathcal{B}^1(T; \mathbb{C})$ -re vett kiterjesztését az előző Lemma értelmében. Először azt mutatjuk meg, hogy bármely  $\varphi : T \rightarrow \mathbb{R}$  mérhető lépcsős függvény esetén

$$\Phi(\varphi)^2 \leq \Phi(\varphi^2).$$

Legyenek  $E_1, E_2, \dots, E_n$  olyan páronként diszjunkt mérhető  $T$ -beli halmazok és  $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$  valós számok, amelyek mellett  $\varphi$  előírható  $\varphi = \sum_{j=1}^n \lambda_j \chi_{E_j}$  alakban. Ekkor  $\Phi$  linearitása és

$\varphi^2 = \sum_{j=1}^n \lambda_j^2 \chi_{E_j}$  figyelembevételével a  $\Phi(\varphi)^2 \leq \Phi(\varphi^2)$  egyenlőség azzal ekvivalens, hogy

$$\left[ \sum_{j=1}^n \lambda_j \Phi(\chi_{E_j}) \right]^2 \leq \sum_{j=1}^n \lambda_j^2 \Phi(\chi_{E_j}),$$

ami az  $A_j := \Phi(\chi_{E_j})$  ( $j = 1, 2, \dots, n$ ) jelölést használva pontosan akkor teljesül, ha minden  $x \in \mathcal{H}$  vektor mellett

$$\left\| \sum_{j=1}^n \lambda_j A_j x \right\|^2 \leq \sum_{j=1}^n (\lambda_j A_j x | \lambda_j x).$$

Mivel  $\chi_{E_j} \leq 0$ , ezért  $\Phi$  rendezéstartó tulajdonsága miatt  $A_j = \Phi(\chi_{E_j})$  pozitív operátor, és az  $E_j$  halmazok diszjunkttsága miatt  $\sum_{j=1}^n \chi_{E_j} \leq \mathbf{1}$ , ezért  $\sum_{j=1}^n A_j \leq \Phi(\mathbf{1})$ , és így egyúttal

$$\left\| \sum_{j=1}^n A_j \right\| \leq \|\Phi(\mathbf{1})\|,$$

így a Lemmát az  $A_j$  pozitív operátorokra és  $x_j := \lambda_j x$  ( $j = 1, 2, \dots, n$ ) vektorokra alkalmazva éppen a  $\left\| \sum_{j=1}^n \lambda_j A_j x \right\|^2 \leq \sum_{j=1}^n (\lambda_j A_j x | \lambda_j x)$  egyenltlenséget nyerjük, amivel a

$\Phi(\varphi)^2 \leq \Phi(\varphi^2)$  egyenltlenséget tetszőleges  $\varphi$  valós lépcsős függvény esetén beláttuk. Legyen most  $\varphi \in \mathcal{C}(T; \mathbb{R})$  tetszőleges valós értékű folytonos függvény, és legyen  $(\varphi_n)_{n \in \mathbb{N}}$  olyan valós lépcsős függvényekből álló sorozat, amely egyenletesen konvergál  $\varphi$ -hez, akkor  $\Phi$  folytonossága miatt  $\Phi(\varphi_n^2) \rightarrow \Phi(\varphi^2)$  és  $\Phi(\varphi_n)^2 \rightarrow \Phi(\varphi)^2$   $\mathcal{B}(\mathcal{H})$  az operátor normában. Ezért ha  $x \in \mathcal{H}$  tetszőleges vektor akkor az előbb igazolt egyenltlenség felhasználásával kapjuk, hogy

$$(\Phi(\varphi)^2 x | x) = \lim_{n \rightarrow \infty} (\Phi(\varphi_n)^2 x | x) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} (\Phi(\varphi_n)^2 x | x) = (\Phi(\varphi^2) x | x),$$

amivel a bizonyítandó állítást beláttuk tetszőleges  $\varphi$  folytonos valós függvény esetén. □

7.0.4. Következmény. Legyenek  $\mathcal{A}$  és  $\mathcal{B}$  egységelemes  $C^*$ -algebrák, és legyen  $\Phi : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$  rendezéstartó folytonos lineáris leképezés, amelyre  $\|\Phi\| \leq 1$ . Ekkor bármely  $a \in \mathcal{A}$  önadjungált elemre teljesül, hogy

$$\Phi(a)^2 \leq \Phi(a^2).$$

*Bizonyítás.* Legyen  $\pi : \mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B}(\mathcal{H})$  a  $\mathcal{B}$   $C^*$ -algebra egy  $\mathcal{H}$  reprezentációja, akkor a  $b \in \mathcal{B}$  elem pontosan akkor pozitív, ha  $\pi(b) \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$  pozitív, és így  $\pi$  és  $\Psi := \pi \circ \Phi : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}(\mathcal{H})$  is rendezéstartó. Legyen  $a \in \mathcal{A}$  önadjungált elem, akkor az általánosított Schwartz-egyenltlenség szerint  $\Psi(a)^2 \leq \Psi(a^2)$ , azaz

$$\pi(\Phi(a)^2) = \pi(\Phi(a))^2 \leq \pi(\Phi(a^2)),$$

azaz  $\Phi(a)^2 \leq \Phi(a^2)$ . □

A következő tétel bizonyításához bizonyítás nélkül hivatkozunk a következő állításra (Russo-Dye tétel).

7.0.5. Állítás. Legyen  $\mathcal{A}$   $C^*$ -algebra, és jelölje  $\mathcal{A}_e$  az

$$\{\exp ih | h = h^*, \quad h \in \mathcal{A}\}$$

halmazt. Ekkor  $\mathcal{A}_e$  norma-zárt konvex burka az  $\mathcal{A}$  egységkörbje.

7.0.6. Tétel. Legyenek  $\mathcal{A}$  és  $\mathcal{B}$  egységelemes  $C^*$ -algebrák, és legyen  $\Phi : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$  olyan egységelemtartó lineáris bijekció, amely mindkét irányban rendezéstartó, azaz

$$a \leq b \Leftrightarrow \Phi(a) \leq \Phi(b), \quad a, b \in \mathcal{A}_{sa}.$$

Ekkor  $\Phi$  Jordan-homomorfizmus, azaz  $\Phi(a^2) = \Phi(a)^2$ ,  $a \in \mathcal{A}$ .

*Bizonyítás.* Megmutatjuk, hogy  $\Phi$  folytonos és  $\|\Phi\| = 1$ . Legyen  $h \in \mathcal{A}_{sa}$  önadjungált elem, akkor  $-\|h\|\mathbf{1} \leq h \leq \|h\|\mathbf{1}$ , és így  $\Phi(\mathbf{1}) = \mathbf{1}$  miatt és  $\Phi$  rendezéstartó tulajdonságát figyelembevéve  $-\|h\|\mathbf{1} \leq \Phi(h) \leq \|h\|\mathbf{1}$ , amiből kapjuk, hogy  $\|\Phi(h)\| \leq \|h\|$ . Legyen most  $a \in \mathcal{A}$  tetszőleges elem, és legyen  $h := \operatorname{Re} a$ ,  $k := \operatorname{Im} a$ , akkor  $\|h\|, \|k\| \leq \|a\|$ . Legyen ugyanis  $f \in \mathcal{A}^0$ ,  $\|f\| = 1$  olyan állapot, amelyre  $|f(h)| = \|h\|$ , akkor  $f(h), f(k) \in \mathbb{R}$  figyelembevételével

$$\|h\|^2 = |f(h)|^2 \leq |f(h)|^2 + |f(k)|^2 = |f(h + ik)|^2 = |f(a)|^2 \leq \|a\|^2,$$

vagyis  $\|h\| \leq \|a\|$ , és hasonlóan adódik, hogy  $\|k\| \leq \|a\|$ . Ebből pedig már adódik, hogy  $\Phi$  folytonos és hogy  $\|\Phi\| \leq 2$ . Legyen ugyanis  $a \in \mathcal{A}$  tetszőleges, akkor

$$\|\Phi(a)\| \leq \|\Phi(h)\| + \|\Phi(k)\| \leq \|h\| + \|k\| \leq 2\|a\|.$$

Az nyilvánvaló, hogy  $\|\Phi(\mathbf{1})\| \leq \|\Phi\|$ , meg kell mutatnunk, hogy

$$\|\Phi(a)\| \leq \|\Phi(\mathbf{1})\|, \quad a \in \mathcal{A} \tag{7.1}$$

Feltehetjük, hogy  $\|\Phi(\mathbf{1})\| = 1$ . A Russo-Dye tétel szerint (7.1) bizonyításához elég az egyenlőséget  $a$  helyett tetszőleges  $u$  unitér elemre megmutatni. Ekkor az általánosított Schwarz-egyenlőségből adódik, hogy

$$\Phi(u) \Phi(u) \leq \Phi(u u) = \Phi(\mathbf{1}) \leq \|\Phi(\mathbf{1})\|\mathbf{1} = \mathbf{1},$$

és így  $\|\Phi(u)\| \leq 1 = \|\Phi(\mathbf{1})\|$ . Ekkor mivel  $\Phi^{-1}$  is rendezéstartó, a Tétel állítása következik a 7.0.4. Következményből.

□

## 8. fejezet

# Kadison izometria tétele

Az alábbi fejezetben belátjuk Kadison tételét.

8.0.1. Tétel. (Kadison) Legyenek  $\mathcal{A}$  és  $\mathcal{B}$  egységelemes  $C^*$ -algebrák, és legyen  $\Phi : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$  olyan bijektív Jordan-homomorfizmus, amely pontosan az önadjungált elemeket képezi önadjungáltakba. Ekkor  $\Phi$  olyan izometria, amely megtartja a kommutativitást, azaz ha  $a, b \in \mathcal{A}$  olyan elemek, amelyekre  $ab = ba$ , akkor  $\Phi(a)\Phi(b) = \Phi(b)\Phi(a)$ .

*Bizonyítás.* Látható, hogy  $\Phi(\mathbf{1}_A) = \Phi(\mathbf{1}_B)$ , különben  $\Phi(\mathbf{1}_A)$  egy projekció, melyre tetszőleges  $a \in \mathcal{A}$  elemre

$$\Phi(a) = \Phi(\mathbf{1}_A a \mathbf{1}_A) = \Phi(\mathbf{1}_A)\Phi(a)\Phi(\mathbf{1}_A),$$

azaz  $\Phi$  az  $\mathcal{A}$   $C^*$ -algebrát a  $\Phi(\mathbf{1}_A)\mathcal{A}\Phi(\mathbf{1}_A)$   $C^*$ -algebrára képezi, amelynek  $\Phi(\mathbf{1}_A)$  az egységeleme, azonban a szürjektivitás miatt tudjuk, hogy  $\Phi(\mathbf{1}_A)\mathcal{A}\Phi(\mathbf{1}_A) = \mathcal{B}$ . Megmutatjuk, hogy  $\Phi$  pontosan a pozitív elemeket képezi pozitív elemekbe. Legyen ugyanis  $a \in \mathcal{A}$  pozitív elem, akkor  $a = b^2$  valamely  $b \in \mathcal{A}_{sa}$  önadjungált elemre, és így  $\Phi(a) = \Phi(b^2) = \Phi(b)^2$  pozitív. Megfordítva tegyük fel, hogy  $\Phi(a)$  pozitív, akkor az  $|a| = \sqrt{a}$  jelöléssel

$$\Phi(|a|)^2 = \Phi(|a|^2) = \Phi(a a) = \Phi(a^2) = \Phi(a)^2,$$

amiből a pozitív elem négyzetgyökének unicitását figyelembevéve kapjuk, hogy  $\Phi(|a|) = \Phi(a)$ , és így  $\Phi$  injektivitása miatt  $a = |a| \geq 0$ . Belátjuk, hogy  $\Phi$  az önadjungált elemeken izometria. Legyen  $a \in \mathcal{A}$  önadjungált elem, akkor a spektrálképezés tétel figyelembevételével és  $Sp(a) \subseteq [-\|a\|, \|a\|]$  miatt

$$Sp(\|a\|\mathbf{1} - a) = \{\|a\| - \lambda \mid \lambda \in Sp(a)\} \subseteq [0, 2\|a\|] \subseteq \mathbb{R}_+,$$

amiből kapjuk, hogy  $\|a\|\mathbf{1} - a \in \mathcal{A}_+$ . Mivel  $\Phi$  pozitívot pozitívba képez, ezért

$$\Phi(\|a\|\mathbf{1} - a) = \|a\|\mathbf{1} - \Phi(a)$$

is pozitív, speciálisan  $Sp(\Phi(\|a\|\mathbf{1} - a)) \subseteq \mathbb{R}_+$ , amiből ismét a spektrálképezés tételt használva kapjuk, hogy

$$\max Sp(\Phi(a)) \leq \|a\|.$$

Cseréljük le ezután az  $a$  elemet  $-a$ -ra, akkor kapjuk, hogy

$$\|a\| \geq \max Sp(\Phi(-a)) = -\min Sp(\Phi(a)).$$

A fenti egyenlőségekben kapjuk, hogy  $\|\Phi(a)\| = r(\Phi(a)) \leq \|a\|$ . Hasonlóan, mivel  $\Phi(a)$  önadjungált, ezért  $\|\Phi(a)\|\mathbf{1} - \Phi(a) \in \mathcal{B}_+$ , ahol

$$\|\Phi(a)\|\mathbf{1} - \Phi(a) = \Phi(\|\Phi(a)\|\mathbf{1} - a).$$

Mivel  $\Phi$  csak pozitív elemet vihet pozitívba, ezért  $\|\Phi(a)\|\mathbf{1} - a \in \mathcal{A}_+$ . Ismét a spektrálleképezés tételét használva kapjuk, hogy

$$\|\Phi(a)\| \geq \max Sp(a),$$

majd ismét lecserélve  $a$ -t  $-a$ -ra és a fenti érvelést megismételve kapjuk, hogy  $\|\Phi(a)\| \geq r(a) = \|a\|$ , vagyis  $\|\Phi(a)\| = \|a\|$ , amivel beláttuk, hogy  $\Phi$  az önadjungált elemeken izometria. Legyen most  $a \in \mathcal{A}$  tetszőleges egységnyi normájú elem. Mivel  $(aa)^n$  és  $(a a)^n$  önadjungáltak fennállnak a következő egyenlőségek:

$$\begin{aligned} 1 &= \|a\|^{4n} = \|aa\|^{2n} = \|(aa)^n\| \\ &= \left\| \frac{1}{2} [(aa)^n + i(a a)^n + ((aa)^n + i(a a)^n)] \right\| \\ &\quad \cdot \left\| \frac{1}{2} [(aa)^n - i(a a)^n + ((aa)^n - i(a a)^n)] \right\| \\ &\leq \|((aa)^n + i(a a)^n)\| \cdot \|((aa)^n - i(a a)^n)\| \\ &= \|((aa)^{2n} + (a a)^{2n} + i((a a)^n(aa)^n - (aa)^n(a a)^n)\| \\ &= \|\Phi((aa)^{2n} + (a a)^{2n}) + i\Phi((a a)^n(aa)^n - (aa)^n(a a)^n)\| \\ &= \|(\Phi(a)\Phi(a))^n + (\Phi(a)\Phi(a))^n + i((\Phi(a)\Phi(a))^n(\Phi(a)\Phi(a))^n - (\Phi(a)\Phi(a))^n(\Phi(a)\Phi(a))^n)\| \\ &\leq \|((aa)^{2n})\| + \|(a a)^{2n}\| + \|(a a)^n(aa)^n\| + \|(aa)^n(a a)^n\| \leq 4\|a\|^{4n} = 4, \end{aligned}$$

amiből nyerjük, hogy

$$4 \leq \|(\Phi(a)\Phi(a))^n + (\Phi(a)\Phi(a))^n + i((\Phi(a)\Phi(a))^n(\Phi(a)\Phi(a))^n - (\Phi(a)\Phi(a))^n(\Phi(a)\Phi(a))^n)\| \leq 4\|\Phi(a)\|^{4n},$$

azaz  $\|\Phi(a)\|^{4n} \geq 1$  minden  $n \in \mathbb{N}$ -re, azaz  $\|\Phi(a)\| \geq 1$ . Hasonló gondolatmenetet követve  $\Phi(a)$ -ra mint  $a$ -ra kapjuk, hogy

$$4\|\Phi(a)\|^{4n} \leq \|(\Phi(a)\Phi(a))^n + (\Phi(a)\Phi(a))^n + i((\Phi(a)\Phi(a))^n(\Phi(a)\Phi(a))^n - (\Phi(a)\Phi(a))^n(\Phi(a)\Phi(a))^n)\| \leq 4,$$

azaz  $\|\Phi(a)\|^{4n} \leq 1$  minden  $n \in \mathbb{N}$ -re, vagyis  $\|\Phi(a)\| \leq 1$ , amivel bebizonyítottuk, hogy ha  $\|a\| = 1$ , akkor  $\|\Phi(a)\| = 1$ , amiből az izometrikusság már következik. Hátra van még a kommutatív struktúra megőrzésének bizonyítása. Elsőként belátjuk, hogy  $\Phi$  megőrzi az  $[[a, b], c]$  Lie-zárójelét, azaz

$$\Phi([a, b], c) = [[\Phi(a), \Phi(b)], \Phi(c)].$$

Valóban, legyenek  $a, b, c \in \mathcal{A}$ , akkor:

$$\begin{aligned} [[\Phi(a), \Phi(b)], \Phi(c)] &= \Phi(a)\Phi(b)\Phi(c) - \Phi(b)\Phi(a)\Phi(c) - \Phi(c)\Phi(a)\Phi(b) + \Phi(c)\Phi(b)\Phi(a) \\ &= \Phi(abc + cba) - \Phi(bac + cab) = \Phi((ab - ba)c - c(ab - ba)) = \Phi([a, b], c). \end{aligned}$$

Hasonlóan egyszer számolással megmutatható, hogy  $\Phi([a, b]^2) = [\Phi(a), \Phi(b)]^2$ . Így ha  $a$  és  $b$  kommutálnak, akkor tetszőleges  $c \in \mathcal{A}$  elemre  $[a, b], c = 0$ , amiből  $[[\Phi(a), \Phi(b)], \Phi(c)] = 0$  és  $[\Phi(a), \Phi(b)]$  benne van a  $\mathcal{B}$  centrumában. Ugyanakkor  $[a, b]^2 = 0$ , és így  $[\Phi(a), \Phi(b)]^2 = 0$ , vagyis  $[\Phi(a), \Phi(b)]$  egy centrumbeli nilpotens, azaz  $[\Phi(a), \Phi(b)] = 0$ , ami ekvivalens azzal, hogy  $\Phi(a)$  és  $\Phi(b)$  kommutálnak.

□

8.0.2. Lemma. *Legyenek  $\mathcal{A}$  és  $\mathcal{B}$  egységelemes  $C^*$ -algebrák, és legyen  $\rho : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$  olyan egységelem tartó leképezés, amely az  $\mathcal{A}$  normális elemein izometria, akkor  $\rho$  involúció tartó, azaz  $\rho(a^*) = \rho(a)^*$ ,  $a \in \mathcal{A}$ .*

*Bizonyítás.* Legyen  $a \in \mathcal{A}$ ,  $\|a\| = 1$  önadjungált elem, és legyen  $\rho(a) = b + ic$  valamely  $b, c \in \mathcal{B}$  önadjungáltakra, és tegyük fel, hogy  $c \neq 0$ , ekkor létezik  $\beta > 0$ ,  $\beta \in Sp(c)$  (ellenkez esetben tekintsük az  $a$  helyett a  $-a$  elemet). Ekkor minden  $n \in \mathbb{N}$  természetes számra a  $C^*$ -tulajdonság figyelembevételével  $\|a + in\mathbf{1}\|^2 = \|a^2 + n^2\mathbf{1}\| \leq 1 + n^2$ , és így  $(1 + n^2)^{\frac{1}{2}} - n \rightarrow 0$  miatt elég nagy  $n$ -re

$$\|a + in\mathbf{1}\| < \beta + n,$$

ahol  $\beta + n \in Sp(c + in\mathbf{1})$  figyelembevételével  $\beta + n \leq \|c + n\mathbf{1}\| = \|ic + in\mathbf{1}\|$ , és így

$$\|a + in\mathbf{1}\| < \|ic + in\mathbf{1}\| \leq \|b + ic + in\mathbf{1}\| = \|\rho(a + in\mathbf{1})\|.$$

Viszont  $a + in\mathbf{1}$  normális elem, és így a feltétel szerint  $\|\rho(a + in\mathbf{1})\| = \|a + in\mathbf{1}\|$ , ami ellentmondás. Ebből kapjuk, hogy  $\rho(a)$  önadjungált, amiből pedig következik, hogy  $\rho$  involúció tartó. Legyen ugyanis  $x \in \mathcal{A}$  önadjungált, akkor

$$\rho(x^*) = \rho(x) = \rho(x)^*.$$

Legyen most  $a \in \mathcal{A}$  tetszőleges, és legyenek  $x, y \in \mathcal{A}$  önadjungáltak, amelyekre  $a = x + iy$ . Ekkor

$$\begin{aligned} \rho(a^*) &= \rho((x + iy)^*) = \rho(x - iy) = \rho(x) - i\rho(y) \\ &= [\rho(x)^* + i\rho(y)^*] = \rho(x + iy) = \rho(a) \end{aligned}$$

□

*Megjegyzés.* Vegyük észre, hogy az előző bizonyításban csak azt használtuk fel, hogy az  $x = a + in\mathbf{1}$  alakú elemeken, ahol  $a$  önadjungált és  $n \in \mathbb{N}$  természetes szám  $\|\rho(x)\| \leq \|x\|$  teljesül, így igaz a következő állítás:

8.0.3. Állítás. Ha  $\mathcal{A}$  és  $\mathcal{B}$  egységelemes  $C^*$ -algebrák, és  $\rho : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$  olyan lineáris leképezés, amelyre  $\rho(\mathbf{1}) = \mathbf{1}$  és

$$\|\rho(a + in\mathbf{1})\| \leq \|a + in\mathbf{1}\|, \quad a \in \mathcal{A}_{sa}, \quad n \in \mathbb{N},$$

akkor  $\rho$  involúció tartó.

8.0.4. Tétel. Legyenek  $\mathcal{A}$  és  $\mathcal{B}$  egységelemes  $C^*$ -algebrák és legyen  $\Phi : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$  olyan lineáris izometrikus bijekció, amely az  $\mathcal{A}$  önadjungált elemeit a  $\mathcal{B}$  önadjungált elemeire képezi. Ekkor létezik olyan  $u \in \mathcal{B}$  önadjungált unitér elem, amely  $\mathcal{B}$  minden elemével felcserélhető, és létezik  $\pi : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$  Jordan \*-izomorfizmus, hogy  $\Phi$  el áll

$$\Phi(a) = u\pi(a), \quad a \in \mathcal{A}$$

alakban.

*Bizonyítás.* Vegyük észre, hogy  $\Phi$  az  $A := \{a \in \mathcal{A} \mid \|a\| \leq 1, a = a\}$  halmazt a  $B := \{b \in \mathcal{B} \mid \|b\| \leq 1, b = b\}$  halmazra képezi, és mivel  $\Phi$  lineáris és izometrikus, ezért  $\Phi$  az  $A$  halmaz extrémális pontjait a  $B$  extrémális pontjaiba képezi, speciálisan  $u := \Phi(\mathbf{1})$  extrémális pontja a  $\mathcal{B}$   $C^*$ -algebra legfeljebb egy normájú önadjungált elemeinek halmazának, ezért a Tétel szerint  $u \in \mathcal{B}$  unitér elem. Definiáljuk a  $\pi : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$  leképezést a következő egyenlőséggel:

$$\pi(a) := u\Phi(a), \quad a \in \mathcal{A},$$

akkor  $\pi$  szintén lineáris bijektív izometria, továbbá  $\pi(\mathbf{1}) = \mathbf{1}$  és  $\|\pi\| = 1$ , ezért az előző lemma szerint  $\pi$  involúció tartó. Továbbá  $\pi(\mathcal{A}_+) = \mathcal{B}_+$ , ugyanis a  $b \in \mathcal{B}$  önadjungált elem pontosan akkor pozitív, ha  $\|b\| \leq \|b - \mathbf{1}\|$ , ez azonban a  $b = \pi(a)$  önadjungált elemre fennáll  $\pi$  izometrikussága és egységelem tartó tulajdonsága miatt. Ebből kapjuk, hogy  $\pi$  rendezéstartó bijekció  $\mathcal{A}$  és  $\mathcal{B}$  között. Hasonlóan belátható, hogy  $\pi^{-1}$  is rendezéstartó, továbbá  $\|\pi\| = 1$ , és így  $\pi$  Jordan-homomorfizmus  $\mathcal{A}$  és  $\mathcal{B}$  között. Végül megmutatjuk, hogy  $u \in \text{Com}(\mathcal{B})$ , amihez elegendő azt igazolni, hogy  $u$   $\mathcal{B}$  minden önadjungált elemével felcserélhető. Legyen tehát  $b \in \mathcal{B}$  egy önadjungált elem, ekkor  $b = \Phi(a)$  valamely  $a \in \mathcal{A}$ ,  $a = a$  elemre, továbbá  $u = u = u^{-1}$  miatt  $u\pi(a) = \Phi(a) = b = b = \pi(a) = u\pi(a)$ , amiből már következik, hogy  $u$  a  $\mathcal{B}$  minden elemével felcserélhető.  $\square$

8.0.5. Tétel. Legyenek  $\mathcal{A}$  és  $\mathcal{B}$   $C^*$ -algebrák. Bármely  $\Phi : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$  izometrikus izomorfizmusra létezik  $\pi : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$  Jordan-izomorfizmus és  $u \in \mathcal{B}$  unitér elem, amelyre

$$\Phi(a) = u\pi(a), \quad a \in \mathcal{A}.$$

*Bizonyítás.* Az előző tétel bizonyításával analóg módon megmutatható, hogy  $\Phi(\mathbf{1})$  unitér, amiből  $u = \Phi(\mathbf{1})$  jelöléssel  $\pi = u\Phi$  izometrikus vektortér izomorfizmus, amelyre  $\Phi(\mathbf{1}) = \mathbf{1}$ . Megmutatjuk, hogy  $\pi$  Jordan-izomorfizmus. Bebizonyítjuk, hogy az olyan  $u$  unitér elemeket, amelyek  $a = \frac{1}{2}(u + u^{-1})$  valós része pozitív és invertálható, a  $\pi$  leképezés unitér elemekbe küldi. Legyen az  $\alpha > 0$  szám az  $a$  spektrumának minimuma, és legyen  $n$  elég nagy, hogy  $2n\alpha > 1$ .

Ekkor

$$\begin{aligned} \|u - n\mathbf{1}\|^2 &= \|(u - n\mathbf{1})(u - n\mathbf{1})\| = \|(n^2 + 1)\mathbf{1} - n(u + u^{-1})\| = \|(n^2 + 1)\mathbf{1} - 2na\| \\ &= r((n^2 + 1)\mathbf{1} - 2na) = \sup_{\lambda \in \text{Sp}(a)} |n^2 + 1 - 2n\lambda| = n^2 + 1 - 2n\alpha, \end{aligned}$$



ahol az utolsó lépésben kihasználtuk, hogy  $\alpha = \min Sp(a) \geq 0$ .

Ekkor  $\|u - n\mathbf{1}\| = \sup\{((n - \lambda^2) + 1 - \lambda^2)^{\frac{1}{2}} | \lambda \in Sp(a)\} = \sup\{(n^2 - 2\lambda n + 1)^{\frac{1}{2}} | \lambda \in Sp(a)\} = (n^2 - 2\alpha n + 1)^{\frac{1}{2}} < n$ . Ha  $\pi(u)$  nem lenne unitér, akkor az egységgömb egy extrémális pontjaként egy nem invertálható parciális izometria lenne. Ekkor  $\|\pi(u) - n\mathbf{1}\| \geq n > \|u - n\mathbf{1}\|$ , ami ellentmond  $\pi$  izometrikusságának, azaz  $\pi(u)$  unitér. Legyen most  $a$  tetsz. leges legfeljebb egységnyi normájú pozitív invertálható elem, akkor az  $a + i(\mathbf{1} - a^2)^{\frac{1}{2}}$  unitér elem valós része pozitív invertálható, és így  $\pi(a) + i\pi((\mathbf{1} - a^2)^{\frac{1}{2}})$  unitér, és így normális elem. Normális elem valós és képzetes része felcserélhető, legyen ugyanis  $b \in \mathcal{A}$  normális, akkor  $b = \operatorname{Re}(b) + i\operatorname{Im}(b)$  és  $b^* = \operatorname{Re}(b) - i\operatorname{Im}(b)$ . Ekkor

$$\begin{aligned} bb^* &= (\operatorname{Re}(b) + i\operatorname{Im}(b))(\operatorname{Re}(b) - i\operatorname{Im}(b)) \\ &= \operatorname{Re}^2(b) - i\operatorname{Re}(b)\operatorname{Im}(b) + i\operatorname{Im}(b)\operatorname{Re}(b) + \operatorname{Im}^2(b) \end{aligned}$$

és

$$\begin{aligned} b^*b &= (\operatorname{Re}(b) - i\operatorname{Im}(b))(\operatorname{Re}(b) + i\operatorname{Im}(b)) \\ &= \operatorname{Re}^2(b) - i\operatorname{Im}(b)\operatorname{Re}(b) + i\operatorname{Re}(b)\operatorname{Im}(b) + \operatorname{Im}^2(b). \end{aligned}$$

A  $b^*b = bb^*$  egyenlőség figyelembevételével pedig adódik, hogy

$$2i\operatorname{Im}(b)\operatorname{Re}(b) = 2i\operatorname{Re}(b)\operatorname{Im}(b),$$

amivel igazoltuk az állítást. Ezért az  $x := \pi(a)$  és  $y := \pi((\mathbf{1} - a^2)^{\frac{1}{2}})$  elemek benne vannak egy kommutatív  $C^*$ -algebrában, ami a kommutatív Gelfand-Naimark tétel szerint tekinthető egy folytonos függvény algebrának. Ugyanakkor  $x$  és  $y$  pozitív elemek (vagyis pozitív folytonos függvények), amelyekre  $\mathbf{1} = (x + iy)(x - iy) = x^2 + y^2$ , ezért  $y^2 = \mathbf{1} - x^2$ . Mivel  $C^*$ -algebrában pozitív elem négyzetgyöke egyértelmű, ezért  $y = (\mathbf{1} - x^2)^{\frac{1}{2}}$ . Hasonló mondható el  $\alpha a$ -ról, ahol  $\alpha$  elég kicsi pozitív szám. Ezután a binomiális tételből kapjuk, hogy

$$(\mathbf{1} - (\alpha a)^2)^{\frac{1}{2}} = \mathbf{1} - \frac{1}{2}\alpha^2 a^2 - \frac{\alpha^4 a^4}{8} - \dots,$$

és

$$(\mathbf{1} - \pi(\alpha a)^2)^{\frac{1}{2}} = \mathbf{1} - \frac{\alpha^2 \pi(a)^2}{2} - \frac{\alpha^4 \pi(a)^4}{8} - \dots.$$

Mivel  $\pi$  izometria és így folytonos, kapjuk, hogy

$$\begin{aligned} \pi(\mathbf{1} - (\alpha a)^2)^{\frac{1}{2}} &= \mathbf{1} - \frac{\alpha^2 \pi(a^2)}{2} - \frac{\alpha^4 \pi(a^4)}{8} - \dots \\ &= (\mathbf{1} - \pi(\alpha a)^2)^{\frac{1}{2}} = \mathbf{1} - \frac{\alpha^2 \pi(a)^2}{2} - \frac{\alpha^4 \pi(a)^4}{8} - \dots. \end{aligned}$$

Amiből

$$-\frac{1}{2}\pi(a^2) - \frac{1}{8}\alpha^4 \pi(a^4) - \dots = -\frac{1}{2}\pi(a)^2 - \frac{1}{8}\alpha^4 \pi(a)^4 - \dots,$$

amiből  $\alpha$ -val nullához tartva kapjuk, hogy  $-\frac{1}{2}\pi(a^2) = -\frac{1}{2}\pi(a)^2$ , azaz  $\pi(a^2) = \pi(a)^2$ . Tetsz. leges normájú pozitív invertálható  $a$  elem esetén hasonló bizonyítás adható az  $\frac{a}{\|a\|}$  esetre. Kommutáló  $a, b$  invertálható pozitív elemek esetén  $a + b$  pozitív és invertálható, ugyanis ha  $ab = ba$ , akkor  $a$  és  $b$  benne van egy kommutatív  $C^*$ -részalgebrában, amire az

els Gelfand-Naimark tétel szerint gondolhatunk folytonos függvényalgebraként. Ekkor ha  $f, g$  pozitív függvények, akkor nyilván  $f + g$  is az, és könnyen látható, hogy létezik  $f + g$  pontonkénti inverze. Így  $\pi((a + b)^2) = \pi(a + b)^2$ , amiből  $2\pi(ab) = \pi(a)\pi(b) + \pi(b)\pi(a)$ . Tetszőleges  $a \in \mathcal{A}$  önadjungáltra  $a = a \vee 0 + \mathbf{1} - (\mathbf{1} - a \wedge 0)$  és jelölje  $b = a \vee \mathbf{1}$  és  $c = \mathbf{1} - a \wedge 0$  pozitív, invertálható elemeket. Ekkor  $\pi(a^2) = \pi(b^2) - 2\pi(bc) + \pi(c^2) = \pi(b)^2 - \pi(b)\pi(c) - \pi(c)\pi(b) + \pi(c)^2 = (\pi(b) - \pi(c))^2 = \pi(a)^2$ , amivel beláttuk, hogy  $\pi$  Jordan-homomorfizmus.  $\square$

# Irodalomjegyzék

- [1] H.G. Dales, Banach algebras and automatic continuity, *London Mathematical Society Monographs* (24), 2000
- [2] R.G. Douglas, On Majorization, Factorization, and Range Inclusion of Operators on Hilbert Space, *Proceedings of the American Mathematical Society* 17, 413-415 (1966)
- [3] M. Eidelheit, On isomorphisms of rings of linear operators, *Studia Mathematica* 9, 97-105 (1940)
- [4] R.V. Kadison, Isometries of operator algebras *Annals of Mathematics* 54, 325-338 (1951)
- [5] R.V. Kadison, A Generalized Schwarz Inequality and Algebraic Invariants for Operator Algebras *Annals of Mathematics* 56, 494-503 (1952)
- [6] R.V. Kadison, J.R. Ringrose, Fundamentals of the Theory of Operator Algebras I-II *Graduate Studies in Mathematics*, (16), (1997)
- [7] T.W. Palmer, Banach Algebras and the General Theory of \*-algebras, *Encyclopedia of Mathematics and its Applications* (49), (1994)
- [8] S. Sakai, C\*-algebras and W\*-algebras *Classics in Mathematics*, (1998)

## NYILATKOZAT

Név: SIMON RICHÁRD

ELTE Természettudományi Kar, szak: MATEMATIKUS MSC

NEPTUN azonosító: D8ABL P

Szakedolgozat címe: OPERÁTORALGEBRÁK ISOMORFIZMUSA I

A szakedolgozat szerzőjeként fegyelmi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a dolgozatom önálló szellemi alkotásom, abban a hivatkozások és idézések standard szabályait következetesen alkalmaztam, mások által írt részeket a megfelelő idézés nélkül nem használtam fel.

Budapest, 20 20 05. 29.

Simon Richard

a hallgató aláírása