

2016. október 17/19.

Lineáris algebra (A, B, C)  
6. előadás  
(vázlat)

Ha  $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$  páronként egymásra merőleges egységvektorok és jobbrendszer alkotnak, akkor  $\mathbf{i} \times \mathbf{j} = \mathbf{k}, \mathbf{j} \times \mathbf{i} = -\mathbf{k}, \mathbf{j} \times \mathbf{k} = \mathbf{i}, \mathbf{k} \times \mathbf{j} = -\mathbf{i}, \mathbf{k} \times \mathbf{i} = \mathbf{j}, \mathbf{i} \times \mathbf{k} = -\mathbf{j}, \mathbf{i} \times \mathbf{i} = \mathbf{0}, \mathbf{j} \times \mathbf{j} = \mathbf{0}, \mathbf{k} \times \mathbf{k} = \mathbf{0}$  mind könnyen ellenőrizhető, és

$$[\mathbf{a}]_{\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}} = \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \end{bmatrix}, \quad [\mathbf{b}]_{\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}} = \begin{bmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \beta_3 \end{bmatrix},$$

azaz

$$\mathbf{a} = \alpha_1 \mathbf{i} + \alpha_2 \mathbf{j} + \alpha_3 \mathbf{k} \text{ és } \mathbf{b} = \beta_1 \mathbf{i} + \beta_2 \mathbf{j} + \beta_3 \mathbf{k}$$

esetén a (több tagra is igazolható) disztributivitás és a skalár kiemelhetőségének felhasználásával

$$\begin{aligned} \mathbf{a} \times \mathbf{b} &= (\alpha_1 \mathbf{i} + \alpha_2 \mathbf{j} + \alpha_3 \mathbf{k}) \times (\beta_1 \mathbf{i} + \beta_2 \mathbf{j} + \beta_3 \mathbf{k}) = \\ &= \alpha_1 \beta_1 (\mathbf{i} \times \mathbf{i}) + \alpha_1 \beta_2 (\mathbf{i} \times \mathbf{j}) + \alpha_1 \beta_3 (\mathbf{i} \times \mathbf{k}) + \\ &+ \alpha_2 \beta_1 (\mathbf{j} \times \mathbf{i}) + \alpha_2 \beta_2 (\mathbf{j} \times \mathbf{j}) + \alpha_2 \beta_3 (\mathbf{j} \times \mathbf{k}) + \\ &+ \alpha_3 \beta_1 (\mathbf{k} \times \mathbf{i}) + \alpha_3 \beta_2 (\mathbf{k} \times \mathbf{j}) + \alpha_3 \beta_3 (\mathbf{k} \times \mathbf{k}) = \\ &= (\alpha_2 \beta_3 - \alpha_3 \beta_2) \mathbf{i} - (\alpha_1 \beta_3 - \alpha_3 \beta_1) \mathbf{j} + (\alpha_1 \beta_2 - \alpha_2 \beta_1) \mathbf{k} \end{aligned}$$

adódik. Ezt felhasználhatjuk pl. a

$$\text{KIFEJTÉSI TÉTEL: } (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \times \mathbf{c} = (\mathbf{ac})\mathbf{b} - (\mathbf{bc})\mathbf{a}$$

és a

$$\text{FELCSERÉLÉSI TÉTEL: } (\mathbf{a} \times \mathbf{b})\mathbf{c} = \mathbf{a}(\mathbf{b} \times \mathbf{c})$$

bizonyítására. Előbbiből ki lehet mutatni, hogy a vektoriális szorzat nem asszociatív! Utóbbiban előfordult vegyesen a vektoriális és a skaláris szorzat, szokás is definiálni (de a jelölés veszélyes):

DEFINÍCIÓ: Az  $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$  geometriai vektorok vegyes szorzata: „ $\mathbf{abc}$ ” =  $(\mathbf{a} \times \mathbf{b})\mathbf{c}$ .

[[Belátható, hogy a nem egysíkú  $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$  geometriai vektorok vegyes szorzata megegyezik az általuk kifeszített paralelepipedon előjeles térfogatával (jobbrendszerrel +, különben – előjellel).]] Érdemes még kiemelni az „elfajuló” esetet:  $(\mathbf{a} \times \mathbf{b})\mathbf{c} = \mathbf{0} \iff \mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$  egysíkú.

Ezek szerint:  $(\mathbf{a} \times \mathbf{b})\mathbf{c} \neq \mathbf{0} \iff \mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$  L. Az  $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$  valós elemű mátrix

oszlopai segítségével definiált  $[\mathbf{a}]_{\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}} = \begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ a_{31} \end{bmatrix}, [\mathbf{b}]_{\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}} = \begin{bmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ a_{32} \end{bmatrix}, [\mathbf{c}]_{\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}} = \begin{bmatrix} a_{13} \\ a_{23} \\ a_{33} \end{bmatrix}$  esetén

az  $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$  geometriai vektorok  $(\mathbf{a} \times \mathbf{b})\mathbf{c}$  vegyes szorzatát kiszámolva, az eredmény:

$$a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33}.$$

Ezt szeretnénk most általánosítani  $n \times n$ -es valós elemű mátrix esetére lehetőleg úgy, hogy nemnulla volta azzal legyen ekvivalens, hogy a rang  $n$ . A szorzatokat úgy rendeztük, hogy mindegyikben az  $\{1, 2, 3\}$  sorindexek szerepeljenek, röviden: 123. Ekkor a következő oszlopindexek találhatók mellettük: 123, 231, 312, 321, 132, 213. Itt éppen az 123 számok összes permutációját írtuk le, melynek az általánosítása kézenfekvő. Az előjelezés megfejtése céljából próbáljuk őket szomszédos cserékkal az 123 alakra hozni: az alkalmas szomszédos cserék száma lehet pl. rendre 0, 2, 2, 3, 1, 1. Ez ugyan nem egyértelmű, de csak az az észrevétel a fontos, hogy az első háromnál páros, a második háromnál páratlan szám adódott.

Adott  $n$  pozitív egész esetén most tekintsük az  $1, 2, \dots, n$  számok összes permutációját, válasszunk ki közülük egy  $i_1, i_2, \dots, i_n$  permutációt (ez az  $1, 2, \dots, n$  valamilyen sorrendben). Azt mondjuk, hogy ebben a permutációban az  $(i_\mu, i_\nu)$  elempár inverzióban van (vagy inverziót alkot), ha  $\mu < \nu$ , de  $i_\mu > i_\nu$ . Jelöljük  $I(i_1, i_2, \dots, i_n)$ -nel az  $i_1, i_2, \dots, i_n$  permutációban az inverziót alkotó elempárok számát. Ezt írva  $(-1)$  kitevőjébe, sikerül az előjelezés általánosítása. Ezek szerint  $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ,  $j[A]_k = a_{jk}$  esetén célszerű képeznünk minden  $i_1, i_2, \dots, i_n$  permutációra az  $a_{1i_1} a_{2i_2} \cdot \dots \cdot a_{ni_n}$  szorzatot, megszorozni  $(-1)^{I(i_1, i_2, \dots, i_n)}$ -nel, majd a kapott kifejezéseket összeadni. Az  $1, 2, \dots, n$  számok összes  $i_1, i_2, \dots, i_n$  permutációjára vonatkozó összegezést úgy fogjuk jelölni, hogy egy szumma jel alá odairjuk az  $i_1, \dots, i_n$  permutációt, alája zárójelben pedig az  $1, \dots, n$ -et.

DEFINÍCIÓ: Az  $A = \begin{bmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{n \times n}$  mátrix **determinánsa** egy alább definiált **szám**, melyet röviden  $|A|$ -val jelölünk, részletesebben kiírhatjuk a mátrix elemeit a szokott módon, de függőleges vonalak közé:

$$(|A| =) \begin{vmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = \sum_{\substack{i_1, \dots, i_n \\ (1, \dots, n)}} (-1)^{I(i_1, i_2, \dots, i_n)} a_{1i_1} a_{2i_2} \cdot \dots \cdot a_{ni_n}.$$

$n = 2$  esetén  $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$ .  $n = 3$  esetén érdemes a már ismert kife-

jezést át is alakítani:  $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} -$

$a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} = a_{11}(a_{22}a_{33} - a_{23}a_{32}) - a_{12}(a_{21}a_{33} - a_{23}a_{31}) + a_{13}(a_{21}a_{32} - a_{22}a_{31})$ . Feltűnő lehet a szerkezeti hasonlóság az  $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$  6/1 oldali kifejezéséhez, ennek memorizálásához segíthet a következő **formális** kiegészítés:

$$(\alpha_1 \mathbf{i} + \alpha_2 \mathbf{j} + \alpha_3 \mathbf{k}) \times (\beta_1 \mathbf{i} + \beta_2 \mathbf{j} + \beta_3 \mathbf{k}) =$$

$$(\alpha_2 \beta_3 - \alpha_3 \beta_2) \mathbf{i} - (\alpha_1 \beta_3 - \alpha_3 \beta_1) \mathbf{j} + (\alpha_1 \beta_2 - \alpha_2 \beta_1) \mathbf{k} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 \\ \beta_1 & \beta_2 & \beta_3 \end{vmatrix}.$$

Az is látszik, hogy nagy  $n$  esetén a definícióval való számolás borzasztóan műveletigényes. Ezért szükségesek a számolást megkönnyítő tételek  $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$  esetére.  $|\mathbf{0}| = 0$ , de a 0 eredményhez az is elég, ha egyetlen sorban végig 0 van. Ha egyetlen sort megszorozunk  $\lambda$ -val, a mátrix determinánsa  $\lambda$ -val szorzódik, így  $|\lambda A| = \lambda^n |A|$ . Bizonyítás nélkül megemlítjük még, hogy  $|A^\top| = |A|$ .

Láttuk már, hogy  $|\lambda A| = \lambda^n |A|$ , így speciálisan  $|2A| = 2^n |A|$  mutatja, hogy az összeadásal is vigyázni kell:  $|A + B| \stackrel{\text{ált}}{\neq} |A| + |B|$ , például  $A = B = I_2$  esetén  $4 = |2I_2| \neq 2|I_2| = 2$ . Ha egyetlen sort szoroztunk  $\lambda$ -val, akkor a mátrix determinánsa  $\lambda$ -val szorzódott. Ennek alapján azzal érdemes próbálkozni, amikor csak egyetlen sorban vannak összegek. Tegyük fel, hogy az  $A$  mátrix  $k$ -adik sorában kéttagú összegek vannak:  $a_{kj} = b_{kj} + c_{kj}$  ( $j = 1, \dots, n$ ). Ekkor a definícióban a  $(-1)$ -hatvány utáni szorzat  $k$ -adik tényezője  $(a_{ki_k})$  helyébe  $b_{ki_k} + c_{ki_k}$  kerül, így az egész szummát két szumma összegére bonthatjuk:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{k1} & a_{k2} & \dots & a_{kn} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{k1} + c_{k1} & b_{k2} + c_{k2} & \dots & b_{kn} + c_{kn} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = \\
= \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{k1} & b_{k2} & \dots & b_{kn} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ c_{k1} & c_{k2} & \dots & c_{kn} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}.$$

Szükségünk lesz az inverziószám változásának ismeretére, amikor a permutációban az elemeket cserélgetjük. Könnyű látni, hogy szomszédos elemek cseréje esetén az inverziószám 1-gyel változik (1-gyel nő, vagy csökken), a távolabbi elemek cseréjét visszavezethetjük szomszédos elemek páratlan számú cseréjére, ebből kideríthetjük sorcserénél a determináns változását, de ezt csak bizonyítás nélkül közöljük:

TÉTEL: Legyen  $n \geq 2$ .

a) Ha az  $1, 2, \dots, n$  számok  $i_1, i_2, \dots, i_n$  permutációjában két elemet felcserélünk, akkor az inverziószám páratlan számmal változik.

b) Ha az  $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$  mátrix valamely két sorát felcseréljük, akkor az így nyert  $B$  mátrix determinánása:  $|B| = -|A|$ , azaz két sor felcserélése esetén a determináns értéke  $(-1)$ -gyel szorzódik.

Részletezzük viszont a fenti tételnek két igen fontos következményét.

TÉTEL: Ha  $n \geq 2$  és az  $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$  mátrixnak van két megegyező sora, akkor  $A$  determinánása 0.

[Biz: a két azonos sor felcserélésétől egyrészt nem változik a mátrix, így a determinánása sem, másrészt a cserétől determinánása  $(-1)$ -gyel szorzódik. Tehát  $|A| = -|A|$ , azaz  $|A| + |A| = 0$ , így  $|A| = 0$ . (Itt számokról van szó, de jegyezzük meg, hogy a legutolsó következtetés más struktúrákban általában nem érvényes, pl.  $1 + 1 \equiv 0 \pmod{2}$ , de  $1 \not\equiv 0 \pmod{2}$ .)]

TÉTEL: Ha  $n \geq 2$ ,  $\lambda \in \mathbb{R}$  esetén az  $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$  mátrix egyik sorához egy **másik** sorának a  $\lambda$ -szorosát hozzáadjuk, akkor az így keletkezett mátrix determinánása is  $|A|$ , tehát az a **rangtartó** átalakítás, amikor egyik sorhoz egy másik sor számszorosát adjuk, egyben **determinánstartó** is!

[Biz: Jelöljük  ${}_k[A]$ -val az  $A$  mátrix  $k$ -adik sorát. Az egyszerűség kedvéért csak azt részletezzük, amikor az első sorhoz adjuk hozzá a második sor  $\lambda$ -szorosát. Ekkor

$$\begin{vmatrix} {}_1[A] + \lambda {}_2[A] \\ {}_2[A] \\ \vdots \\ {}_n[A] \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} {}_1[A] \\ {}_2[A] \\ \vdots \\ {}_n[A] \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} \lambda {}_2[A] \\ {}_2[A] \\ \vdots \\ {}_n[A] \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} {}_1[A] \\ {}_2[A] \\ \vdots \\ {}_n[A] \end{vmatrix} + \lambda \begin{vmatrix} {}_2[A] \\ {}_2[A] \\ \vdots \\ {}_n[A] \end{vmatrix} = |A| + \lambda 0 = |A|.$$

Az általános esetben hasonlóan megy a bizonyítás.]

Ha az  $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$  egy sorában végig 0 van, akkor már tudjuk, hogy 0 a mátrix determinánása. Most vizsgáljuk meg egy egyszerű esetben azt, amikor egy sor majdnem végig

0, pl.  $A$  utolsó sorában az utolsó elem kivételével minden 0. Eme speciális szerkezetű mátrix determinánsára írjuk fel a definíciót részletesen:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & \dots & a_{1,n-1} & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n-1,1} & \dots & a_{n-1,n-1} & a_{n-1,n} \\ 0 & \dots & 0 & a_{nn} \end{vmatrix} = \sum_{\substack{i_1, \dots, i_{n-1}, i_n \\ (1, \dots, n-1, n)}} (-1)^{I(i_1, i_2, \dots, i_{n-1}, i_n)} a_{1i_1} a_{2i_2} \cdot \dots \cdot a_{n-1, i_{n-1}} a_{ni_n}.$$

Tekintsük az összeg azon tagjait, amelyekben az  $i_n < n$ . Ezeknél a szorzat utolsó tényezője:  $a_{ni_n} = 0$ , s az összeg vizsgált tagja is 0. Eszerint az összegnek sok tagja [pontosan  $(n-1) \cdot (n-1)! = n! - (n-1)!$  darab] 0, ezeket el is hagyhatjuk. Maradnak azok a tagok, ahol  $i_n = n$  [ilyen van  $(n-1)!$  darab], speciális mátrixunk determinánsa tehát

$$= \sum_{\substack{i_1, \dots, i_{n-1}, n \\ (1, \dots, n-1, n)}} (-1)^{I(i_1, i_2, \dots, i_{n-1}, n)} a_{1i_1} a_{2i_2} \cdot \dots \cdot a_{n-1, i_{n-1}} a_{nn}.$$

Az összegezés most úgy értendő, hogy az  $1, 2, \dots, n$  azon permutációira összegezzünk, ahol az utolsó helyen  $n$  áll. Ekkor az előtte lévő  $i_1, \dots, i_{n-1}$  befutja az  $1, 2, \dots, n-1$  összes permutációját, ennek megfelelően módosítjuk a szumma alatti részt. Örömmel látjuk, hogy  $I(i_1, \dots, i_{n-1}, n) = I(i_1, \dots, i_{n-1})$ , mert az  $n$  leghátul állt, s az előtte lévőknel nagyobb, így egyikkel sem alkotott inverziót. Ezután  $a_{nn}$  kiemelésével

$$a_{nn} \sum_{\substack{i_1, \dots, i_{n-1} \\ (1, \dots, n-1)}} (-1)^{I(i_1, i_2, \dots, i_{n-1})} a_{1i_1} a_{2i_2} \cdot \dots \cdot a_{n-1, i_{n-1}}$$

adódik, ahol az összegben felismerhetjük az  $A$  bal felső sarkában lévő  $(n-1) \times (n-1)$ -es rész determinánsát, s nyertük a következőt:

**TÉTEL:**

$$\begin{vmatrix} a_{11} & \dots & a_{1,n-1} & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n-1,1} & \dots & a_{n-1,n-1} & a_{n-1,n} \\ 0 & \dots & 0 & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{nn} \begin{vmatrix} a_{11} & \dots & a_{1,n-1} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n-1,1} & \dots & a_{n-1,n-1} \end{vmatrix}.$$

**KÖVETKEZMÉNY:** Felső háromszög mátrix (5/2) determinánsa a főátlóban lévő elemek szorzata.

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1,n-1} & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \dots & a_{2,n-1} & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & a_{n-1,n-1} & a_{n-1,n} \\ 0 & 0 & \dots & 0 & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{11} a_{22} \cdot \dots \cdot a_{n-1,n-1} a_{nn}.$$

Így persze diagonális mátrixok determinánsa is a főátlóban lévő elemek szorzata, például  $|I_n| = 1$ . Szerepelt már (bizonyítás nélkül), hogy  $|A^T| = |A|$ , így a sorokra megfogalmazott állítások oszlopokra is érvényesek, tehát pl. alsó háromszög mátrix determinánsa is a főátlóban lévő elemek szorzata.